This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ *Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden* We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ *Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit* Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn.

+ *Laat de eigendomsverklaring staan* Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ *Houd u aan de wet* Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via `http://books.google.com`

3 3433 06640600 4

HANDLEIDING

TOT DE

KENNIS EN HET GEBRUIK

DER

HEMEL- EN AARD-GLOBEN,

BEVATTENDE TEVENS DE BESCHRYVING VAN DE CONSTRUCTIE, EN HET GEBRUIK VAN EENE GEHEEL NIEUWE

AARD-GLOBE,

WELKE IN ZICH HET GEBRUIK DER HEMEL- EN AARD-GLOBEN VEREENIGT;

DOOR

CORNELIS CÓVENS,

MET PLAATEN.

TE AMSTELDAM, BY
MORTIER, CÓVENS EN ZOON.
1803.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
154044A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS

AAN DEN

LEZER.

Zedert eenigen tyd bezitters geworden zynde van de in ons Vaderland zeer bekende Globenmakery van L. VALK, *waren wy al ras bedacht om deze Globen met de nieuwere ontdekkingen, welken in de laatſte Jaaren in de Aardryks- en Sterrekunde gedaan, zyn te vermeerderen, en de nieuwe Conſtructie van den Heer* ADAMS *op dezelven toetepaſſen: dit denkbeeld ontwikkelende, de d ons, in overweging nemende, welke verbazende veranderingen de kennis van onzen Aardbol, door de reizen van eenen* COOK, LA PÉROUSE *en anderen, ondergaan had, beſluiten tot het doen vervaardigen van eene geheel nieuwe* Aard-Globe, *in eene grootte, welke niet te klein was om met de vereischt wordende naauwkeurigheid de nieuw ontdekte Landen, Eilanden, enz. op dezelve te kunnen brengen, en ook niet te groot om door derzelver omſlagtigheid het gewoone gebruik te kunnen hinderen; wy verkozen daartoe eene diameter van* 12 *duim Rhynlandſche maat, de gewoone maat van de Globen van* VALK, *en zyn thans met dezen onzen arbeid zoo verre gevorderd, dat wy in*

ſtaat zullen zyn binnen weinig tyd deze onze nieuwe Aard-Globe onze Landgenooten aantebieden: zy mogen dan oordeelen of wy in ons oogmerk om dezelve dien graad van naauwkeurigheid en uitvoerigheid te geeven, als derzelver beſtek maar eenigzins vorderde, geſlaagd zyn; zoo veel is zeker, wy hebben ons in het vervaardigen derzelve van alle die hulpmiddelen bedient, welken de nieuwſte ontdekkingen in alle de deelen van onzen Aardbol ons aan de hand gaven, en ten opzichte der gravure gezorgd, dat wy, duidelykheid en netheid te zamen paarende, een geheel leverden, dat, zoo wy vertrouwen, tegen de in andere landen nieuwst uitgegeeven Globen veilig kan monſteren.

Schoon de Globen van VALK *allen in het Latyn zyn uitgegeeven, verkozen wy dit echter niet naartevolgen, maar deeden deze nieuwe Aard-Globe in de Franſche taal vervaardigen, welke by het zich in de Aardrykskunde oefenende gedeelte onzer Landgenooten vry algemeen bekend is, en welke het gebruik dezer Globe elders meer algemeen kon maaken; daarenboven kan het hen, welke deze taal al niet magtig zyn, weinig moeite baaren, daar de meeste eigen naamen veelal dezelvde blyven, en zo*

ook de Meridiaan *van* Amſteldam *op dezelve aangeteekend: het is van dezen laatſten dat de telling der* Lengte *in tyd een' aanvang neemt, 't geen in het gebruik der Globe voor ons Land veel gemak verſchaft.*

Ook de Hemel-Globe *had eene verbetering nodig; dan deze was van een' geheel anderen aart, alle de Sterrebeelden, van welken de ouden zich reeds bedienden, ten einde de vaste Sterren te onderſcheiden, zyn dezelvde gebleven; eene vermeerdering van Sterrenbeelden, door de meerdere vorderingen in de kennis van den ſtand der vaste Sterren, was ſlechts noodzaakelyk geworden; en het was om deze reden, gevoegd by de naauwkeurigheid waarmede de Hemel-Globen van* VALK *vervaardigd zyn, dat wy beſloten alle de nieuwere Sterrenbeelden op dezelve te brengen, die Sterren welke op dezelve ontbraken 'er bytevoegen, en tevens de letters van het* Griekſche Alphabet, *door hetwelk men gewoon is de byzondere Sterren van elk beeld te onderſcheiden, op de plaaten te laaten brengen, om alzoo ook de* Hemel-Globe *in dien ſtaat te brengen, welken de meerdere vorderingen in de Sterrekunde thans vorderen. Wy leveren dan door dezen weg een paar Globen, welken in alles naar de nieuwſte waarnemingen vervaardigd zyn, en die, van dezelvde grootte zynde als de ouden, gelegenheid geeven aan hen, welke bezitters zyn van oude Globen van* VALK *van denzelvden diameter, (van* 12 *duim namelyk,) door het doen overplakken van de hunnen met deze nieuwe kaarten, zich op eene niet zeer kostbaare wyze in 't bezit van dezelven te ſtellen.*

Mogelyk zou het nuttig kunnen zyn, ter bevordering van de kennis des Sterrenhemels, eene Hemel-Globe *te vervaardigen, op welke in 't geheel geene Sterrebeelden waare afgeteekend, maar op welke alleen de vaste Sterren, met de liemieten van elk beeld, waren aangewezen, eene zaak waaromtrent wy mogelyk nog een nader voorſtel aan de Liefhebbers der Sterrekunde doen zullen.*

Na het verbeteren der Globe zelve kwam nu ook derzelver Conſtructie *in aanmerking; natuurlyker wyze moesten wy aan die van* Adams *de voorkeur geeven: de algemeene byval, welken dezelve gevonden heeft, het gemak en voordeel, 't welk dezelve boven de oude heeft, was ons hieromtrent ter verzekering dat ook dit de goedkeuring van het algemeen zou wegdragen; dan, voldoet deze* Conſtructie *in alles aan het oogmerk waartoe men de Globen behoort te gebruiken? was eene vraag, welke wy onszelven doende, bevonden dat hieromtrent nog wel iets anders te wenſchen overbleef.*

Men onderſcheid te recht de ſchynbaare beweging *des Hemels van de* waare beweging *onzer Aarde, welke de oorzaak der eerſte is: deze wordt zeer goed door de* Hemel-Globe *afgebeeld; dan wordt nu ook de*



de Aarde geplaatst is, zoo is het zeker, dat hy in dat geval niet de ſchynbaare beweging des Hemels, *maar de* waare beweging der Aarde *zou waarnemen; dan 'er is meer: 'er is een natuurlyk verband tusſchen de Aardryks- en Sterrekunde, maar waar wordt dit verband op de Globe vertoond? beiden zyn afgeſcheiden, en de vereeniging der beide Globen alleen, tot de oplosſing van hetzelvde Vraagſtuk, kan ons dit verband leeren kennen.*

Dit een en ander deed ons beſluiten, te beproeven, of het niet mogelyk waare de Aard-Globe *zoodanig eene inrichting te geeven, dat alle de* Problema's *op dezelve wierden opgelost, niet zo als ze ons toeſchynen plaats te hebben, maar zo als ze werklyk voorvallen, en of niet even daardoor het gebruik der Hemel- en Aard-Globen in één werktuig te vereenigen ware. Wy ſlaagden in deze onze poging zoo gelukkig, dat dezelve de goedkeuring van verſcheiden Liefhebbers der Sterrekunde wegdroeg, en dat wy, daar wy oordeelden dat dezelve ter bevordering dezer ſchoone wetenſchap ſtrekken kon, beſloten dezelve by de uitgave onzer nieuwe* Aard-Globe *publiek te maaken.*

Het wierdt dus nodig eene beſchryving van deze onze nieuwe Conſtructie der Aard-Globe te vervaardigen, en zie daar de eerſte aanleidende oorzaak van dit ons geſchryf; eene voorleezing over dit zelvde onderwerp, door ons in den winter van het voorige Jaar in de Maatſchappy Felix Meritis *gedaan, wierdt daartoe ten grondſlage gelegd; dan wy veranderden, onder het ſchikken van deze Beſchryving voor de drukpers, in zoo verre van Plan, dat wy beſloten, niet enkel eene Beſchryving van deze onze nieuwe Con-*

ſtructie der Aard Globe te vervaardigen, maar eene Handleiding tot de kennis en het gebruik der Hemel- en Aard-Globen *in het algemeen uittegeeven: daardoor toch kregen wy gelegenheid over veele zaaken te ſpreeken, welken anders minder tot ons doel konde gerekend worden te behooren; wy konden daardoor almede het voor- en nadeel van de oude en nieuwe Conſtructie beter leeren kennen, en verkregen aanleiding om het gebruik der Globen uit een ander oogpunt, dan wel in andere werken, over dit onderwerp uitgegeeven geſchiedde, te leeren beſchouwen; gevende wy, door ſteeds het verband van Aardryks- en Sterrekunde in het oog te houden eene Handleiding tot de gemeenſchappelyke beoefening van twee weetenſchappen, welken elkanderen altoos onderling den grootſten dienst bewezen hebben.*

Wy zeiden, zo even, dat wy het gebruik der Globe uit een ander oogpunt, dan wel gewoonlyk, wilden leeren beſchouwen: immers is het niet genoeg dat men de Globen weete te gebruiken tot de oplosſing van deze of geene voorſtellen; neen, maar zy moeten ook dienen om ons de betrekking, in welke onze Aarde zich tot andere Hemel-ligchaamen bevindt, en die, welke andere Hemellichten tot onze Aarde hebben, te



de algemeene beginſelen van den loop der Planeeten bevat, reeds was afgedrukt, kwam de ontdekking eener zedert lang door de Sterrekundige vermoedde Planeet, tuſſchen Mars *en* Jupiter, *eerst ter onzer kennis: dit is de reden dat wy van deze Planeet in dat Hoofdſtuk niet geſproken hebben; zie hier dus, ter verbetering van dit gebrek, het geene men tot hiertoe van deze nieuw ontdekte Planeet zeggen kan.*

Deze tusſchen *Mars* en *Jupiter* zich bewegende Planeet, *Hera* genaamd, ſtaat op ongeveer 60 millioenen Duitſchen Mylen van de *Zon* af, en volbrengt haaren loop om de *Zon* in 5 jaar en 138 dagen, in eene loopbaan, welke ruim $7\frac{1}{2}^{o}$ op het vlak der Ecliptica helt; den afſtand der Aarde van de Zon dus gelyk 10 ſtellende, is de afſtand van *Hera* van de Zon 28.

Mogelyk verwondert zich deze of geene dat wy in deze Handleiding eenen aanvang maaken met de waare *beweging der Aarde, daar toch de* ſchynbaare *beweging des Hemels het eerſte is, dat zich aan onze zinnen voordoet; dan dezulke bedenke, dat het eerſte oogmerk van dit geſchryf was, onzen Lezer met de nieuwe inrichting onzer Aard-Globe bekend te maaken, en dat deze natuurlyker wyze eene beſchouwing van de* waare *beweging der Aarde vorderde; ten anderen is het by ons nog niet bewezen, dat het beter zy eenen Leerling te doen aanvangen met hem de* ſchynbaare *beweging des Hemels te verklaaren, vooral dan wanneer men niet in de gelegenheid is dadelyke waarnemingen aan den Hemelzelven te doen, maar zich bepaalt tot het onderwys*

door middel eener Globe; want hy moet in dat geval toch altoos vooronderſtellingen op het gezag van zynen Leermeester aannemen; en waarom hem dan niet terſtond gezegd, zoo en zoo heeft de ondervinding, door menigvuldige waarnemingen bevestigd, ons geleeraard dat de geſteldheid van ons Zonnegeſtelzel is? dezen en die zyn de wetten, naar welken alle deze Hemelligchaamen zich bewegen, en welken de verſchynſelen veroorzaaken, welken wy dagelyks kunnen waarnemen? dat hy dit niet terſtond zal bevatten, ſtemmen wy zeer gaarne toe; maar zal hem ook de ſtand, dien wy aan de Hemel-Globe geeven om ze met onzen ſtand op deze Aarde te doen overeenkomen, by voorbeeld, terſtond duidelyk zyn? en is het dan niet veel beter hem waarheden te zeggen, die hy op het gezag zyns Meester gaarne zal aannemen, dan hem ſchynbaare verſchynſelen voortehouden, die hy even-op dat zelvde gezag moet aannemen, en die hem dikwyls, daar toch de eerſte denkbeelden, welken 'er door de voorſtellingen van anderen in onzen geest gevormd worden, den meesten indruk op denzelven maken, naderhand zouden kunnen belemmeren?

Is het niet noodzakelyk, dat men alle Sterrekundig

ſtandvastig vlak, dat altoos dezelvde betrekking tot de vaste Sterren behoud, dan van het vlak van den Horiſon, *dat geduurig verandert, zodra men maar één ſtap verder op onze Aarde doet, beſchouw? zoo veel althans is zeker dat de verwarde denkbeelden, welken veele hebben, by voorb., van de verwisſeling der Saiſoenen, van het lengen en korten der Dagen, enz., onzes erachtens, hunnen oorſprong daarin vinden dat ze dezelven uit de* ſchynbaare *beweging des Hemels, waarmede hun onderwys begonnen is, verklaaren willen.*

Heeft men eenig denkbeeld verkregen van de waare *beweging onzer Aarde, en wil men ook den ſtand der vaste Sterren aan den Hemel leeren kennen, het is zeker dat men zich dan in de vrye lucht moet oefenen, dat men den Sterrenhemel zelven in zyne ſchoonheid moet beſchouwen, wanneer men van zelven de* ſchynbaare *beweging waarneemt; en vraagt men dan: hoe zyn nu die waarheden, welken ik te voren geleerd heb, uit de verſchynſelen, die ik thans zie, afteleiden, te verklaaren? dan vertrouwen wy dat, zo eene kundige hand hem geleid, hy geen vergeefſche pogingen zal doen om in de waarheid van het eerſte geleerde bevestigd te worden, en uit eigen overtuiging te geloven 't geen hy eerst op het gezag van een' ander' aannam: hiertoe hebben wy eene Handleiding willen geven in het IV Hoofdſtuk van het II Boek; en het is by deze Beſchouwing dat men niet van de* Aard-Globe, *maar van de* Hemel-Globe *alleen zich bedienen moet; intusſchen daar het zeker is dat het zyn grootſte nuttigheid heeft alle zaaken, die eenigzins moeijelyk zyn, van verſchillende kan-*

ten

ten te bezien, vertrouwen wy althans dit, dat men het ons niet betwisten zal als wy beweeren, dat het noodzaakelyk zy, zyne leerlingen zoo wel de waare *als de* ſchynbaare *beweging te leeren kennen; wy vermeeten ons niet hier wetten voorteſchryven, en laaten het daarom gaarne een' ieder' aan zyne eigen keus zich van die order te bedienen, welke hy goedvind, kunnende hy, zich van deze Handleiding bedienende, dat Hoofdſtuk den voorrang geeven, 't welk hem tot den aanvang zyner leſſen het geſchikſte voorkomt.*

Tot meerder gemak in het gebruik dezer Handleiding, en van onze nieuwe Aard-Globe *zelve, welke toch, wat het gebruik betreft,* Hemel- *en* Aard-Globe *in zich verëénigt, hebben wy achter dit Werkje eene* Catalogus *gevoegd,* van de Ascentio recta *en* Declinatie der 600 voornaamſte Sterren, *welken te* Parys, *en dus ook te* Amſteldam, *voor het grootſte gedeelte zigtbaar zyn; gelyk wy, tot dat zelvde einde, behalve eene Alphabetiſche Bladwyzer achter aan, den geheelen Inhoud van dit werk achter deze Voorrede laaten volgen, 't welk laatſte wy daarom des te meer verkozen hebben, omdat alle de op de Globen optelosſen voorſtellen zich niet gemakkelyk op het Alphabet laaten brengen.*



INHOUD.

I. Boek. Algemeene voorbereidende Beginselen. . . . . § 1-68

I. Hoofdstuk. *Algemeene beginſelen der Spheer.* . . . § 1-45

II. Hoofdst. *Algemeene beginſelen van den loop der Planeeten.* . § 46-68

II. Boek. Beschryving der Constructie van de Globen en Sphæra Armillaris. § 69-266

I. Hoofdst. *Beſchryving van de nieuwe Conſtructie der Aard-Globe, afgeleid uit de waare beweging der Aarde.* § 69-132

Van de Ecliptica en de Jaarlykſche beweging der Aarde. . § 69-86

Over de dagelykſche beweging der Aarde. 87- 92

Van den Equator en Declinatie-Cirkel. 93-105

Van den Horiſon. . 106-116

Van den Meridiaan. . 117-128

Van den Uurcirkel. . 129-130

Van den Uurwyzer. . 131-132

II. Hoofdst. *Algemeene beginſelen van den loop der Maan.* . § 133-200

Over den loop der Maan. § 133-142

Van den Almanak. . 143-167

Van de Eclipſen. . . 168-193

Van de Eb en Vloed der Zee. 194-200

III. Hoofdst. *Vergelyking van de nieuwe Conſtructie der Aard-Globe met de oude.* . . § 201-207

IV.

IV. Hoofdst. *Beſchryving van de Hemel-Globe, afgeleid uit de ſchynbaare beweging des Hemels.* . . § 208-260
V. Hoofdst. *Beſchryving van de Sphæra Armillaris.* . . . § 261-266
III. Boek. Gebruik der Globen. § 267-546
I. Hoofdst. *Gebruik der Aard-Globe naar de nieuwe Conſtructie.* . § 267-421
NB. Daar de *Problema's* in dit en het volgende Hoofdſtuk dezelvde zyn, wyst de eerſte § aan de oplosſingen zoo als dezelve in dit Hoofdſt. zyn opgegeven, en de tweede die van het volgende Hoofdſtuk.
I. Problema. Den Meridiaan, Uurcirkel en Uurwyzer te ſtellen overeenkomſtig een' gegeeven Plaats en Dag. . . § 269-423
II. Prob. Te vinden hoe laat het op eene gegeeven plaats zy, als het op eene andere Middag is. 275-424
III. Prob. Hoe laat is het te Peking, als het te Weenen 7 u. 30′ voormiddag is? 277-426
IV. Prob. Waar is het Middernacht, als het te Peking Middag is? 278-247

VIII. PROB. Den Horiſon te ſtellen op eene bepaalde Breedte . . § 291-431
IX. PROB. De Geographiſche Lengte en Breedte eener plaats op de Globe te vinden. . . . 293-432
X. PROB. Den beweegbaaren Meridiaan en Horiſon te ſtellen overeenkomſtig de Lengte en Breedte van eene zekere plaats. 294-433
XI. PROB. Den Tyd van den Op- en Ondergang der Zon, voor eene gegeeven plaats, op zekeren Dag des Jaars te vinden. . . 295-434
XII. PROB. De ſtreek des Winds te vinden in dewelke de Zon Op- of Ondergaat, alsmede derzelver Azimuth by haaren Op- en Ondergang. . . . 297-435
XIII. PROB. Door middel van den Breedte-Cirkel den Tyd van den Op- en Ondergang der Zon voor een' zekeren Dag en Plaats te vinden. . . 298-436
XIV. PROB. Te vinden welke plaatſen de Zon te gelyk met Amſteldam zien Opgaan op den 5 May. . . 301-437.
XV. PROB. Te vinden voor welke plaatſen de Zon Ondergaat, als op den 5 May te Amſteldam de Zon Opgaat. . 302-438
XVI. PROB. Te vinden voor welke plaatſen de Zon Op- en Ondergaat, als het Middag is te Amſteldam op den 5 May. 303-439
XVII. PROB. Te vinden voor welke plaatſen de Zon Op- en Ondergaat, op een' gegeven Dag en Tyd buiten den Middag. 304-440

XVIII.

XVIII. Prob. Te vinden hoe laat het is te Amſteldam, als den 24 Aug. te Mexico de Zon Opgaat. . . 305-441
XIX. Prob. De Lengte van Dag en Nacht te vinden op een' zekeren datum voor eene gegeeven Plaats. . . 307-442
XX. Prob. De Aard-Globe als een Tellurium te gebruiken, om de verwisſeling der Saiſoenen, en het lengen en korten der dagen aan te wyzen. . . 308-443
XXI. Prob Te vinden den dag, op welken de Zon het eerst Op- en voor het laatst Ondergaat voor elke plaats, welker Noorder Breedte grooter dan $66\frac{1}{2}^{\circ}$ is . 315 446
XXII. Prob. Den dag te vinden, op welken de Zon voor het eerst niet Ondergaat, benevens den tyd dat dezelve beſtendig boven den Horiſon blyft, voor elke plaats wier N. Breedte grooter is dan $66\frac{1}{2}^{\circ}$ 322-447
XXIII. Prob. De Hoogte der Zon boven den Horiſon op, en buiten den Middag te vinden. . . . 323-448
XXIV. Prob. Het begin en einde der Morgen- en Avondſchemering te vinden. . . 325-449

Zon, Maan en van alle de Planeeten voor eene gegeeven Plaats en Dag te vinden; of den ſtand der Zon, Maan en van alle de Planeeten voor eenen geheelen Dag, op eene gegeeven plaats, door middel der Globe te kunnen aanwyzen. 331-452

XXVIII. Prob. Ten allen tyde van den Dag te vinden de plaats in welker Zenith de Zon ſtaat. 335-457

XXIX. Prob. Den juisten tyd van den Op- en Ondergang der Maan te vinden, op den 31 Augustus 1801, te Amſteldam 337-454

XXX. Prob. De Plaats eener vaste Ster op de Globe aantewyzen. 339-455

XXXI. Prob. Den Op- en Ondergang eener vaste Ster op de Globe te vinden. 342-456

XXXII. Prob. Te vinden alle Sterren, die op eene gegeeven Plaats niet ondergaan. 343-457

XXXIII. Te vinden alle Sterren, welken op eene zekere Plaats nooit opgaan, of altoos onzigtbaar zyn. 345-457

XXXIV. Prob. Den Tyd van 't Jaar te vinden, op welken eene Ster Cosmice of Acronice Op- of Ondergaat. 347-458

XXXV. Prob. Den Tyd van den Heliaſchen Op- en Ondergang eener Ster te vinden 350-459

XXXVI. Prob. De Plaats te vinden, welke eene Ster in 't Zenith heeft, op een' gegeeven Dag en Uur. 353-460

XXXVII. Prob. Den Correspondent van eene zekere plaats te vinden. 354-463

XXXVIII. Prob. Te vinden hoe laat het is te Amſteldam, als eene der § 355 opgenoemde Sterren in het Zenith is der Plaats, van welke zy Correspondent is. 358-464

XXXIX. Prob. Welke Ster ſtaat 'er boven de ſtraat van Gibraltar, als het 5 uuren 35' 's avonds, op den 15 November, te Amſteldam is? . . . 359-465

XL. Prob. Het punt des Hemels te vinden, onder het welk eene zekere plaats op een' gegeeven Dag en Tyd gelegen zy, dat is dat punt des Hemels, 't welk op den bepaalden Tyd met het Zenith van de gegeeven Plaats overeenkomt. . . 360-466

XLI. Prob. Eene Ster te vinden, welke op een' gegeeven tyd in denzelvden Verticaalen Boog met eene zekere Plaats van ons gelegen is. . . . 361-466

XLII. Prob. De Hoogte te vinden, boven den Horiſon, van een zeker punt des Hemels, dat met eene zekere plaats overéénkomt. . 364-466

XLV. Prob. Door middel van de Declinatie der Zon, of van eenige Ster, de Breedte der plaats te vinden. 369-469
XLVI. Prob. Den tyd te vinden van den doorgang eener Ster door den Meridiaan op een' zekeren Dag. 372-470
XLVII. Prob. Te vinden den tyd van den doorgang van het 1e punt van Aries door den Meridiaan. . . . 375-471
XLVIII. Prob. Te vinden hoe laat is op zekere plaats, wanneer eene bekende Ster eene bepaalde hoogte bereikt heeft. 377-472
XLIX. Prob. De Lengte eener Plaats door Sterrekundige waarnemingen te vinden. 379-473
L. Prob. De Amplitudo der Zon of Sterren te vinden. . . . 384-474
LI. Prob. De Ascenſio en Descenſio Obliqua, en de Differentia Ascenſionalis eener Ster te vinden. . 386-474
LII. Prob. Den afſtand te vinden tusſchen twee gegeeven Plaatſen. . 387-475
LIII. Prob. Den Angulus Poſitionis te vinden. . . . 390-476
LIV. Prob. De Rechte, Schuine en Paralelle Spheer door middel der Globe te vertoonen. . . . 392-477
LV. Prob. Die twee dagen te vinden, op welken de Zon loodlynig zal zyn boven zekere Plaats, tusſchen de keerkringen. 397-478
LVI. Prob. Te vinden de Lengte van den kortſten en langſten Dag, op eene bepaalde Breedte. . 401-479

LVII. Prob. Te vinden de Breedte van eene Plaats, alwaar de Langſte Dag van eene gegeeven lengte is. . . 404-480
LVIII. Prob. Die twee Dagen te vinden, op welken de Zon op een gegeeven Uur op eene zekere Plaats opgaat. . . 405-481
LIX. Prob. De Aſcenſio recta van 't midden des Hemels voor een' zekeren Dag en Uur te vinden. . . . 406-482
LX. Prob. Te vinden hoe laat het is te Parys, wanneer men op den 9 September de hoogte der Zon aldaar voordemiddag heeft waargenomen te zyn 30 graaden. 407-483
LXI. Prob. Den Tyd te vinden, dat de Zon een zeker Azimuth moet hebben, op een' gegeeven Dag en Plaats. . 408-484
LXII. Prob. De Declinatie der Zon gegeeven zynde te zyn 15° Noordelyk, te vinden de Lengte der Zon in de Ecliptica, en den Dag van 't Jaar. . 409-485
LXIII. Prob. Te vinden of de Planeet Venus Morgen- of Avondſter is. . 410-486
LXIV. Prob. De Tegenvoeters van eene zekere Plaats te vinden. . 412-487

LXVII. PROB. Den Tyd van het Hoogſte Water voor eene zekere Plaats op een' gegeeven Dag te vinden. . 417-490

LXVIII. PROB. Te toonen het groote nut, dat de Bewooners der Noorder Poollanden van de Maan trekken kunnen. 420-491

LXIX. PROB. Uuren en Minuten tyds te brengen tot Graaden en Minuten van den Equator; of Graaden en Minuten van den Equator te brengen tot Uuren en Minuten tyds. . . 421-492

II. HOOFDSTUK. *Gebruik der Hemel- en Aard-Globen naar de Conſtructie van* ADAMS. . . § 422-492

De Problema's in dit Hoofdſtuk vervat zyn dezelvde als in het vorige, waar ook de §§, alwaar dezelve in dit Hoofdſt. te vinden zyn, zyn aangeteekend; dan, behalven dezen, worden nog de drie volgenden alhier verklaard.

I. Den Uurwyzer te ſtellen voor een' gegeeven Dag. . . § 430

II. De Globe te ſtellen op de Poolshoogte van eene zekere Plaats. . 433

III. De Ascenſio Recta en Declinatie der Sterren door middel der Hemel-Globe te vinden. . . 455

III. HOOFDSTUK. *Gebruik der Sphæra Armillaris.* . . § 493-499

IV. HOOFDSTUK. *De Toepaſſing van de Klootſche Driehoeksmeting op de Sterrekunde gemakkelyk gemaakt, door het gebruik der Globen.* . § 500-519

I. Voorstel. Den tyd te vinden van den Opgang en Ondergang van eenig Hemellicht, op eene gegeeven Breedte. . . § 502
II. Voorstel. De Amplitudo van eenig Hemellicht te vinden. . . . 503
III. Voors. Te vinden welke de Lengte zy eener Plaats op eene gegeeven Breedte, op welke de Zon op een' zekeren Dag te gelyk opgaat met eene andere plaats op eene gegeeven Lengte en Breedte geleegen. 504
IV. Voors. De Breedte der Plaats — de Declinatie der Zon — en de Hoogte der Zon *gegeeven zynde — te vinden* het Uur van den Dag. . . . 505
V. Voors. *Gegeeven zynde:* De Breedte der Plaats — de Declinatie der Zon — en derzelver Azimuth — *te vinden* het Uur van den Dag. . . . 507
VI. Voors. De Declinatie en Ascenſio recta der Zon *gegeeven zynde*, derzelver Lengte *te vinden*; of omgekeerd. . . . 508
VII. Voors. Ten allen tyde den hoek te vinden, welken de Ecliptica met den Meridiaan maakt. . . . 509

Ecliptica, in welken de Zon ſtaat als zy een zeker getal graaden onder den Horiſon ſtaat, terwyl de Ster Op- of Ondergaat. 514

X. VOORSTEL. *Gegeeven zynde:* De Breedte der Plaats — de hoek, welken een zekere Verticaal met den Meridiaan maakt — en de Dag en het Uur — *te vinden:* de Ascenſio recta en Declinatie van alle de Sterren, welken in dien Verticaal ſtaan. . . . . § 515

XI. VOORS. *Gegeeven zynde:* De Ascenſio recta en Declinatie van twee Sterren, welken op hetzelfde oogenblik in denzelfden Verticaal waargenomen zyn — *te vinden:* de Breedte der Plaats. 516

XII. VOOR. *Gegeeven zynde:* De Ascenſio recta en Declinatie van twee Sterren, in denzelvden Verticaal ſtaande — en de Breedte der Plaats — het Uur hoe laat het is *te vinden.* 518

XIII. VOORS. Ten allen tyde den graad des Equators, welke in de Meridiaan ſtaat, door berekening te vinden; of, deze gegeeven zynde, het Uur hoe laat het is te vinden. 519

V. HOOFDSTUK. *Gebruik der Globe in de Zonnewyzerskunde.* . . § 520-546

Grondbeginſelen waarop de ſamenſtelling der Zonnewyzers rusten. . . § 522

Byzondere ſoorten van Zonnewyzers. 525

Een' Equinoctiaalen Zonnewyzer te beſchryven. 526

Horiſontaale Zonnewyzers te beſchryven. 529

Verticaale Zonnewyzers tegen 't Noorden of Zuiden te beſchryven. . 530

Van

Van het Zuiden afwykende Verticaale Zonnewyzers te beſchryven. . . . 531
Agter- of vooroverhellende Verticaale Zonnewyzers te beſchryven. . . . 533
Verticaale Zonnewyzers door *Horiſontaale* te beſchryven. . . . 534
Agter of vooroverhangende Zonnewyzers door *Horiſontaale* te beſchryven. . . 538
Meridiaan Wyzers te maaken. . . . 541
Polaire Zonnewyzers te beſchryven. . 542
Algemeene aanmerkingen omtrent het maaken van Zonnewyzers door middel der Globen. 543
Catalogus van Sterren.
Bladwyzer.

HANDLEIDING

TOT DE

KENNIS EN HET GEBRUIK

DER

HEMEL- EN AARD-GLOBEN.

I. BOEK.

ALGEMEENE VOOR-BEREIDENDE BEGINSELEN.

I. HOOFDSTUK.

ALGEMEENE BEGINSELEN DER SPHEER.

§ 1. De door kunst gemaakte HEMEL- EN AARD-GLOBEN vertonen ons op derzelver oppervlakte den betrekkelyken ſtand der vaste Sterren in *Conſtellatien* of Sterrebeelden afgedeeld — en de onderſcheidene ligging der Landen, Eilanden, Zeeën en Rivieren op het oppervlak der Aarde; en wanneer deze Globen behoorlyk gemonteerd, dat is door zoodanige Cirkels omringd zyn, van dewelken men zich in de Sterrekunde pleeg te bedienen, dan vertoonen zy ons de waare en ſchynbaare beweging der Aarde en des Sterren-

hemels, en worden alzoo geſchikte werktuigen tot het oplosſen van alle zulke Sterrekundige voorſtellen, welken ons de verſchynſelen, die wy omtrent de Hemelſche Ligchaamen op onze Aarde waarnemen, doen kennen, en vooraf berekenen.

2. Daar het ons oogmerk in deze Handleiding bepaaldelyk is, onze Lezeren met de *kennis* en het *gebruik* der *Hemel- en Aard-Globen* bekend te maaken, en wel inzonderheid met die *Aard-Globe*, welke, ingevolge eene door ons nieuw uitgedagte conſtructie vervaardigd, de *Hemel- en Aard-Globen* als het waare vereenigd, gaan wy hier voorby over de verdeeling der byzondere Landen des Aardbodems, 't welk meer opzettelyk tot de *Aardrykskunde* zelve, en over de te zamenvoeging der Sterren in Sterrenbeelden, 't welk meer byzonder tot de *Sterrekunde* behoort, te ſpreeken, en bepaalen ons dus alleen tot de Globen zelven, zoo als zy, met alle de Cirkelen, die dezelven omringen, voor het gebruik geſchikt zyn.

3. Vooraf egter zal het noodzakelyk zyn, van die algemeene kundigheden, welken tot de kennis der Spheer en de beweging der Planeeten betrek-

dat het middenpunt D van den halven Cirkel het middenpunt van den *Bol* is, en dat de omtrek van den halven Cirkel ABC de oppervlakte van den *Bol* beſchryft, waarom dus ook alle de punten van de oppervlakte van den *Bol* ABCEA allen even verre van het middenpunt D verwyderd zyn, omdat de *radien* van den halven Cirkel ABC allen even groot zyn.

5. Elke *regte lyn* AC, BE, FG, die van de eene oppervlakte van den *Bol* tot de andere door het middenpunt D getrokken wordt, wordt *middenlyn* van den *Bol* genaamd, en de $\frac{1}{2}$ van deze middenlyn AD, BD of DE noemt men de *radius* of *ſtraal*.

6. De middenlyn AC, rondom welke de $\frac{1}{2}$ Cirkel ABC verondersteld wordt bewogen te worden, wordt de *As* des *Bols*, en de beide uiteinden van dezen *As*, aan de oppervlakte A en C, worden de *Poolen* des *Bols* genaamd; — alle de middenlynen eens *Bols* zyn dus even groot, zyn gelyk aan den *As*, en kunnen derhalven voor den *As* genomen worden.

7. De lynen HI, KL, MN, OP, *rechthoekig* op den *As* getrokken, worden *ordinaaten* genaamd, en elk van deze *ordinaaten* beſchryft, wanneer de *Bol* om zynen *As* ronddraait, een' Cirkel; zoo beſchryft de ordinaat HI, den Cirkel HSITH, de ordinaat KL den Cirkel KQLRK, de ordinaat MN den Cirkel MXNYM, de ordinaat OP den Cirkel OZPaO; en daar men elke middenlyn voor *As* kan neemen, en dus ook op elke derzelve wederom *ordinaaten* trekken, zoo volgt hier

en QLR *Fig.* 1. zyn even groot, omdat de hoeken KbQ en RbL, ſtrikshoeken zynde, even groot zyn, en in *Fig.* 2., waar de *groote* Cirkel PGQIP den *kleinen* ABCDA en EBFDE ſnyd, *deelt* dezelve deze kleine Cirkels midden door, omdat de middenlynen AC en EF der beide kleine Cirkels in het vlak van den Cirkel PGQIP gelegen zyn, en dus ook de middenpunten en Poolen dier kleine Cirkels; dan zoo dra eene groote Cirkel niet door de Poolen van een' kleinen Cirkel gaat, deelt hy denzelven ook niet midden door, gelyk om deze rede de groote Cirkel PaQfP den kleinen EBFDE niet midden door deelt; ook kunnen 'er twee of meer kleine Cirkels, gelyk GHIKG, LMNOL *Fig.* 2., in eene Spheer getrokken worden, welken elkander in 't geheel niet ſnyden, doch twee groote Cirkels ſnyden elkander altoos in twee recht tegenoverſtaande punten; derhalve kunnen ook geen twee groote Cirkels *paralel* aan elkander getrokken worden, maar wel twee of meer kleine Cirkels *paralel* aan één' *grooten* of aan elkander.

13. Alle Cirkels, zoo wel de *kleine Cirkels* als de *groote*, is men gewoon in 360° te verdeelen; dan in de Sterrekundige berekeningen maakt men

die door de beide ¼ Cirkelboogen AE en BE in E gemaakt wordt; de maat van den klootſchen hoek E wordt gemeeten op eenen Cirkel ABCDA, welke 90° van den hoek E afſtaat, en van welken Cirkel dus E de Pool is § 6, zoo is dan de boog AB de maat van den hoek E.

15. Wy zeiden boven §. 6. dat de beide uiteinden van den *As* eens *Bols* deszelvs Poolen genaamd worden: daar nu de *As* eens Cirkels altoos loodregt of rechthoekig op zyne middenlyn ſtaat, zoo zyn dan ook de beide uiteinden van de lyn, welke rechthoekig op de middenlyn eens grooten Cirkels getrokken wordt, deszelvs Poolen; de lyn AC is de middenlyn van den Cirkel ABCDA, derhalve is EIF zyn *As*, en E en F zyn de *Poolen* van denzelven Cirkel.

16. Wanneer de boog AB de maat is van den klootſche hoek AEB, zoo zal de boog BC de maat zyn van den hoek BEC, en deze boog BC wordt het *ſupplement* van den boog AB genaamd, omdat zy te zaamen ¼ Cirkel of 180° maaken; dus is dan ook de hoek BEC het *ſupplement* van den hoek AEB.

17. Wanneer op 90° afſtand van het punt A door de beide Poolen EF van den Cirkel ABCDA de Cirkel EGFHE getrokken wordt, dan is de hoek BEG het *compliment* van den hoek AEB, en de boog BG het *compliment* van den boog AB, omdat deze beiden te zamen 90° maaken.

18. Het *compliment* van een' hoek, of boog, noemt men dus het getal der graaden, welken men by dezelven moet tellen om 90° te maaken, en

en het *ſupplement* van een' hoek of boog noemt men het getal graaden, het welke men by dezelven moet tellen om 180° te maaken.

19. Een *klootſche hoek* van 90° noemt men een' rechten hoek, omdat de beide middenlynen der Cirkels, die denzelven vormen, rechthoekig op elkander ſtaan, en dus ook die Cirkels zelven; elke hoek die minder dan 90° is, gelyk de hoek AEB *Fig.* 4. noemt men een *ſcherpe* hoek en elke hoek die meer als 90° is, gelyk de hoek AED *Fig.* 4., noemt men een' *ſtompen* hoek; even zoo noemt men ook de zyde AB van den driehoek AEB Fig. 3. *ſcherp*, omdat zy minder als 90° is, en de zyde BC van den driehoek BEC *ſtomp*, omdat zy meer als 90° is.

20. Twee *klootſche* hoeken AEB en DEC, of AED en BEC *Fig.* 4., welken regt tegen elkander overſtaan, zyn altoos gelyk, wyl de middenlynen van derzelver Cirkels aan beide zyde van den Cirkel, op welken die hoek gemeeten wordt, een gelyk getal graaden afſnyden: dus is de hoek AEB *Fig.* 3. gelyk aan den hoek CED, omdat de boog AB gelyk is aan den boog CD, alzoo de hoeken AIB en DIC, die door derzelver midden-

Ax, Nc, Rd, gelykvormig zyn, dat is, zy zullen allen evenveel graaden bevatten, alzoo alle de middenlynen EG, IL, AC, NP en RT alle paralel zyn, en dus de hoeken EFa, IKb, AeX, NOc, RSd gelyk zyn.

22. Even gelyk in eene platte figuur elke Cirkel uit zyn middenpunt beſchreven wordt, omdat het middenpunt overal even verre van deszelvs omtrek ſtaat, zoo wordt in een' bol of kloot elke Cirkel uit zyne Poolen beſchreven, omdat de As VW des Cirkels, welks uiteinden V en W de Poolen zyn, rechthoekig op de middenlyn ſtaat, en dus ook de Poolen V en W overal even verre van den omtrek des Cirkels afſtaan, waaruit verder volgt dat de Poolen V en W van den Cirkel ABCDA ook Poolen zyn van alle de kleine Cirkels, welken paralel aan den grooten Cirkel ABCDA getrokken worden, wyl de As VW mede regthoekig op de middenlyn EG en IL enz. ſtaat, weshalve ook elke groote Cirkel, die regthoekig op een' kleinen Cirkel ſtaat, dien kleinen Cirkel midden door deelt. §. 12.

23. Twee kleine Cirkels, die even verre van het middenpunt des bols afſtaan, zyn even groot, dewyl de koorden EG en RT, op een' gelyken afſtand eF en eS van het middenpunt E getrokken, even groot zyn.

24. Alle groote Cirkels *Fig.* 6., die door de Poolen van een' anderen grooten Cirkel getrokken worden, ſtaan rechthoekig op dezen laatſten, omdat de punten V en W gemeen zijn aan alle deze Cirkels, en dat de As VNW mede aan allen gemeen

is, en alzoo de As VNW regthoekig op AC ſtaat, zoo ſtaan ook de Cirkels VBWHV, VDWGV, VEWFV, regthoekig op den Cirkel AICKA, en gevolgelyk alle Cirkels, die door de Poolen V en W getrokken worden, waaruit omgekeert volgt, dat alle Cirkels, die elkander rechthoekig doorſnyden, door elkanders Poolen gaan.

25. Als twee groote Cirkels AICKA en LIMKL elkander ſnyden, zal de klootſche hoek MIC, dat is de hoek, dien deze Cirkels met elkander maaken, gelyk zyn aan den boog NV, dat is aan den afſtand van derzelver Poolen; want het punt V is de Pool van den Cirkel AICKA, en de boog VC is dus = 90°. — Zoo is N de Pool van den Cirkel LIMKL, en de boog NM is dus ook 90°, derhalve is de boog NM = de boog VC, nu is VM = VC — MC en NM — NV = VM dus VC — MC = NM — NV, maar VC is = NM dus NM — MC = NM — NV en derhalve MC = NV.

26. Na dus in het algemeen de eigenſchappen van de Cirkels der Spheer behandeld te hebben, zullen wy overgaan, om meer in 't byzonder van die Cirkels te ſpreeken, welken tot de Aardryks-

kennen, zyn *de Horiſon — de Meridiaan — de Equator — de Ecliptica — de Coulueren van de Nacht-Eveningen* en *van de Zonneſtanden — de Declinatie-Cirkels — Cirkels van Breette — de Keerkring van de Kreeft — de Keerkring van den Steenbok — de Noorder Pool-Cirkel* — en *Zuider Pool-Cirkel.*

28. Wanneer men deze Cirkels in hunnen betrekkelyken ſtand, van koper of carton gemaakt zynde, plaatst, verkrygt men daardoor een werktuig, 't welk men eene *Sphera armillaris* of Ringſpheer gewoon is te noemen: eene zoodanige Spheer ziet men op de II Pl. afgebeeld, waarnit men alle deze Cirkels, door de daar bygevoegde naamen, in hunnen betrekkelyken ſtand zeer gemakkelyk zal leeren kennen.

29. Wanneer men deze figuur naauwkeurig beziet, en dezelve vergelykt met onze boven opgegeevene algemeene beginſelen der Spheer, dan zal men daaruit ligt kunnen opmaken, welke de *groote* en welke de *kleine* Cirkels der Spheer zyn; de *grootte* Cirkels toch zyn, *de Horiſon — de Meridiaan — de Equator — de Ecliptica — de beide Coulueren — de Declinatie Cirkels* en *de Cirkels van Breette — kleine* Cirkels zyn die allen, welken *Paralel* aan den eenen of anderen der groote Cirkels getrokken worden, gelyk de beide *Keerkringen* — de beide *Pool-Cirkels*, en allen die *Paralel* aan den *Equator*, *Ecliptica* of *Horiſon* getrokken worden.

30. *Paralellen aan den Equator*, zyn de beide *Keerkringen — de Pool-Cirkels* en allen zoo veelen

als

als 'er tusſchen dezen in op elken graad kunnen getrokken worden; dat gedeelte dezer *Paralellen*, 't welk tusſchen den *Horiſon* en den *Meridiaan* gelegen is, noemt men $\frac{1}{8}$ *Dagbogen*; het andere gedeelte, onder den *Horiſon* gelegen, tot aan den *Meridiaan*, zyn $\frac{1}{8}$ *Nagthogen*.

31. *Paralellen* aan den *Ecliptica*, ziet men in deze Afb: twee getrokken, één benoorden en één bezuiden den Ecliptica, op 8 graden afſtand van de Ecliptica, welke tusſchenwytte eene zoort van band vormt, die men den *Zodiak* of *Dierenriem* gewoon is te noemen.

32. *Paralelle* Cirkels aan den *Horiſon*, noemt men *Almicantarath*; van deze is 'er één op deze Afbeelding getrokken — één Paralel getrokken aan den Horiſon, op 18° afſtand bezuiden den Horiſon, bepaalt het begin en einde der morgen- en avondſchemering.

33. Cirkels *rechthoekig* op den Horiſon getrokken, noemt men *Verticaalen*; van dezen gebruikt men doorgaans maar $\frac{1}{4}$ gedeelte of een quadrant: zy dienen om de hoogte S A der Ster S boven den Horiſon te bepaalen.

34. Behalven deze Cirkels, moet men nog ken-



meene grondbeginſelen, de navolgende gevolgen af.

1. Dat de hoek BDC, welken de *Equator* mede *Horiſon* maakt, gemeeten wordt door den boog BC op den Meridiaan § 14.

2. Dat deze hoek gelyk is aan den afſtand van het *Zenith* tot de *Noordpool*, en dus de afſtand van den *Equator* tot het *Zenith* gelyk aan den afſtand van de *Noordpool* tot den Horiſon, § 26. en deze wederom het compliment van den hoek, dien de Equator met den Horiſon maakt.

3. Dat de hoek FDE, welken de *Ecliptica* met den *Equator* maakt, gemeeten wordt op de Coulure der Zonneſtanden. § 14.

4. Dat deze hoek wederom gelyk is aan den afſtand van de Pool *der Ecliptica* tot de Pool der *Waereld* of *des Equators*, en dus de afſtand van de Pool der *Ecliptica* tot den *Equator* het compliment is van den hoek, welken de *Equator* met de *Ecliptica* maaken.

5. Dat de *Meridiaan*, door de Poolen des *Equators* gaande, regthoekig op den *Equator* ſtaat.

6. Dat de *Meridiaan*, mede door het *Zenith* en *Nadir*, dat is door de Poolen van den *Horiſon* gaande, ook rechthoekig op den *Horiſon* ſtaat.

7. Dat de *Declinatie*-Cirkels, door de Poolen des *Equators* gaande, ook rechthoekig op den *Equator* ſtaan.

8. Dat de *Breette-Cirkels*, door de Poolen der *Ecliptica* gaande, rechthoekig op de *Ecliptica* ſtaan.

9. Dat

9. Dat de *Vertikaalen*, door het *Zenith*, dat is door de Pool van den *Horiſon* gaande, ook rechthoekig op den *Horiſon* ſtaan § 25.

Alle deze gevolgen kunnen uit het te voren behandelde bewezen worden, en moeten dus ook by het dadelyk onderwys door den leerling zelven daaruit worden bewoogd.

36. De hoek, welken de *Horiſon* met den *Equator* maakt, moet egter geenzints als ſtandvastig beſchouwd worden: zy is grooter of kleiner, naarmate de afſtand van het *Zenith* tot de Pool der *Waereld* grooter is, dat is naarmate de afſtand van de Pool tot den Horiſon verſchilt, of wel naarmate de Poolshoogte groot is; de Poolshoogte hangt af van den afſtand eener plaats van den Equator, en de Horiſon is dus betrekkelyk tot de *breette* der plaats; want men noemt den afſtand eener plaats van den Equator zyne *breette*; om deze rede is ook in deze Afbeelding de Spheer als hangende in den Meridiaan en Horiſon verbeeld, omdat men zich dezelve als in deze kunnende draaien moet voorſtellen.

37. Deze verſchillende ſtand van den *Horiſon*, met

betekend de Cirkel ABCD de *Horiſon*; ÆQR de *Equator*; N de *Noord* en Z de *Zuidpool*, — abc, def, ghi, klm zyn paralellen aan den *Equator*.

39. De *regte Spheer*, dus genoemd omdat de *Equator* en alle Cirkels, die aan dezelve paralel zyn, in dezelve *rechthoekig* op den Horiſon ſtaan, heeft plaats voor alle *die* bewooners der Aarde, welken onder den *Equator* woonen; de beide Poolen N en Z leggen in derzelver Horiſon; dag en nacht is altoos even lang, en derzelver bewooners zien *alle* de Sterren op- en ondergaan; het Zenith dezer Spheer valt in Q in den *Equator*.

40. De tweede zoort van Spheer, *ſchuine Spheer* genaamd, omdat den *Equator* ÆQR, een' zekeren hoek met den *Horiſon* maakende, *ſchuin* op dezelve ſtaat, gelyk ook alle *paralellen* aan den Equator, heeft plaats voor alle landen gelegen tuſſchen den *Equator* en *Pool der Waereld*; in dezelve is altoos één der beide Poolen N, zynde deze de *Noordpool* voor de bewooners der Aarde *benoorden* den Equator, en de *Zuidpool* voor de bewooners *bezuiden* den Equator, een zeker getal graaden boven den Horiſon verheven; de dagen en nachten zyn in dezelve ongelyk van lengte; zommigen Sterren gaan in dezelve nooit *onder*, andere beurtelings *op* en *onder*, en andere nooit *op* en zyn dus geheel onzigtbaar; het Zenith van deze Spheer valt in Z op een' afſtand ZN van de Pool, die gelyk is aan het compliment van den boog EN § 35. — deze Spheer egter kan meer of min ſchuin zyn, naar dat de boog EN of de Pools-

Poolshoogte meer of minder groot is; is deze boog klein, dan heeft de *ſchuine* Spheer meer van de eigenſchappen van de *regte*, dat is de dagen zyn minder ongelyk van lengte, 'er zyn meer Sterren zigtbaar, enz.; is deze boog EN groot, dan nadert de *ſchuine* Spheer meer aan de *paralellen*, en heeft dus meer van haare eigenſchappen; de dagen en nachten worden ongelyker van lengte, 'er zyn minder Sterren zigtbaar, enz.; dit moet bewezen worden uit § 35, 2 gevolg.

41. De *Paralellen-Speer* Fig. 10 wordt dus genoemd, omdat alle Cirkels, die *Paralel* aan den *Equator* zyn, ook *Paralel* aan den *Horiſon* zyn, wyl de Equator ÆQR en Horiſon ABCD coincideeren; in dezelve zyn de Dagen en Nagten zeer ongelyk, dat is 'er is maar één Dag en maar ééne Nagt in 't geheele jaar, die elk $\frac{1}{2}$ jaar duurt; de Sterren die *benoorden* den Equator ſtaan, zyn altoos zigtbaar, die *bezuiden* den Equator ſtaan, altoos onzigtbaar, en het *Zenith* dezer Spheer is de Pool N zelve; deze Spheer heeft plaats voor de bewooners der Aarde juist onder de Pool, zoo 'er eenigen zyn.

42. Wy zeiden dat het *Zenith* der *regte Spheer*



inderdaad in *Fig.* 9. is NZ, dat is de afstand van het *Zenith* tot de *Pool*, gelyk aan het compliment van QZ, dat is de afstand van het *Zenith* tot den *Equator*, welke de Breedte eener plaats bepaald, gelyk zulks in 't vervolg nader zal aangetoond worden.

43. Na deze algemeene denkbeelden van de Cirkels der Spheer gegeven te hebben, zullen wy nog kortlyk aantoonen, welke de namen zyn der Cirkels, die men op de *Hemel* en *Aard-Globen* gewoonlyk vindt afgetekend.

44. In de 11 Fig. wordt eene *Hemel-Globe* verbeeld, met alle die Cirkels, welken gewoonlyk op dezelve getrokken worden; in dezelve is S de *Noord* en T de *Zuidpool der Ecliptica* — N de *Noordpool*, en Z de *Zuidpool der Aarde* — EQP de *Ecliptica* — SaT, SbT, ScT, SdT, SeT, SfT, SgT, ShT, SiT, SkT, SlT, SmT, SnT, zyn alle *Cirkels van Breedte*, *rechthoekig* op de *Ecliptica* getrokken — 1, 16, 24 — 2, 15, 23 — 3, 14, 22 — 4, 13, 21 — 5, 12, 20 — 6, 11, 19 — 7, 10, 18 — 8, 9, 17, alle *paralellen aan de Ecliptica* — SPTES de *Coulure van de Zonneſtanden* — NQZ de *Coulure van de Nacht-Eveningen* — ÆQR de *Equator* — EC de *Keerkring van de Kreeft* — DP de *Keerkring van den Steenbok* — AS de *Noorder Pool-Cirkel* — en TB de *Zuider Pool-Cirkel*.

45. De *Aard-Globe*, met alle de Cirkels, die men gewoon is op dezelve te trekken, wordt in de 12 Fig. afgebeeld: in dezelve zyn N en Z de Poolen der Aarde — ÆQR de *Equator* — EC de

Keerkring van de Kreeft — DP de *Keerkring van den Steenbok* — AS de *Noorder Pool-Cirkel* — TB de *Zuider Pool-Cirkel* — NPZÆN, NaZ, NbZ, NcZ, NdZ, NeZ, NfZ, NgZ, NhZ, NiZ, NkZ, NlZ, NmZ, NnZ, NoZ, NpZ alle *Meridiaanen* — en 11, 10, 17 — 1, 9, 16 — 2, 8, 15 — 3, 7, 14 — 4, 6, 13 — 5, 12, alle *Paralellen* aan den *Equator*, gewoonlyk eenvoudig *Paralellen* genaamd — EQP de *Ecliptica*, die hoezeer zy eigentlyk niet tot de *Aard-Globe* behoort, echter gewoonlyk op dezelve getekend wordt.

II. HOOFDSTUK.

ALGEMEENE BEGINSELEN VAN DEN LOOP DER PLANEETEN.

46. Zal men in het regte gebruik der Globen eenige vorderingen maaken, dan is het nodig iets van de beweging der Planeeten te kennen, en dat men de kunsttermen, welken men met betrekking tot haare verscheiden ſtanden gebruikt, behoorlyk

zelfde plaats en denzelfden onderlingen ſtand ziet behouden, terwijl de laatſten, het gantſche ruim des Hemels als doorwandelende, dan op deze, dan op geene plaats door ons oog worden waargenomen, terwijl zij door ons, dan van de *regter* naar de *linker* hand, dan van de *linker* naar de *regter* hand zich bewegende, beſchouwd worden, waarom men dan ook haar den naam van *Dwaalſterren* gegeeven heeft; hoewel nu deze haare beweging voor ons oog zoo onregelmatig moge ſchynen, zoo leert ons egter de Sterrekunde, dat niets minder dan dit de waare aart van haaren loop zij; door de Sterrekunde worden wij onderrigt, dat zij haaren loop om de ZON in bepaalde tijdperken volbrengen, in loopkringen, welken eene *Elliptiſche* gedaante hebben, en in het eene brandpunt van welke Ellips de ZON zich bevindt.

48. Wanneer wij op deze wijs den waaren loop der Planeeten beſchouwen, en ons met onze verbeelding als buiten onze Aarde verplaatzen, om den loop der Hemelſche ligchaamen, tot ons Zonneſtelzel behoorende, te beſpieden, dan moeten wij onze AARDE mede in den rang der Planeeten plaatzen, en het zelfde, dat wij zoo even van de Planeeten zeiden en daar nog vervolgens van zullen zeggen, ook op onze *Aarde* toepaſſen.

49. De loopkringen der Planeeten zijn *vlakken*, welken allen door het middenpunt der *Zon* gaan, alſchoon zy nogthands verſchillende hellingen tot elkander hebben, en zich naar verſchillende gewesten des Hemels uitſtrekken.

50. Het denkbeeld van *een vlak* toetepasſen op de loopkringen der Planeeten, en in 't gemeen op alle die Cirkels, welken wy in het vorige Hoofdſtuk als Cirkels van de Spheer hebben leeren kennen, is zeer noodzakelyk, omdat men zonder dit te doen zich geene juiste denkbeelden van het gebruik derzelven, van derzelver grootte en van derzelver onderlinge betrekkingen kan vormen; waarom het nodig zyn zal dit, duidelijkheidshalve, eenigzins nader te ontwikkelen.

51. Een VLAK in 't algemeen is eene oppervlakte, op welke men in allerlei richtingen eene rechte lijn kan trekken; dit is de naauwkeurigſte bepaaling, welke men van hetzelve kan geven; want eene oppervlakte is geen vlak meer, indien eene rechte lijn dezelve niet in alle haare punten en in allerlei richtingen aanraakt, en zich met dezelve vereenigt.

52. In de Sterrekunde verbeeld men zich alle vlakken oneindig in de onbepaalde ruimte des Hemels verlengd; en daar men zich dezelven in de Spheer als Cirkels voorſtelt, zoo beſtaat dan het *vlak* van een' Cirkel in de verzameling aller middenlijnen van dien Cirkel, onbepaald buiten



zoo te ſpreeken, de Sterren als zoo veele lichten ſchitteren, en in welke kloot men zich de Cirkels, waarvan men zich in de Sterrekunde bedient, verbeeld getrokken te zyn; daar ondertusſchen de voorſtelling des Sterrenhemels, onder de gedaante van eene kloot, louter denkbeeldig is, gemerkt de afſtanden der vaste Sterren van ons zeer zeker verbazend onderſcheiden zyn, zoo volgt daar uit tevens, dat zich de Cirkels der Spheer als bloote Cirkels voorteſtellen een denkbeeld is, dat veel te bekrompen en geenzins overeenkomſtig is met de verbazende uitgeſtrektheid des Hemels; een Cirkel toch heeft zyne bepaalde diameter en dus zyne bepaalde uitgeſtrektheid, maar zich geduurig het vlak der Cirkels als oneindig in de onbepaalde ruimte des hemels verlengd voorteſtellen, geeft ons het waare denkbeeld aan de hand, 't geen met de verhevendheid dezer wetenſchap overeenkomſtig is.

54. Laat ons onderſtellen, dat DBAH, *Fig.* 13. de uitgeſtrektſte zij van den Equator der Aarde, die door de grootte der Aarde zelve bepaald is, zoo moet men zich het vlak van denzelven zonder paalen verbeelden: een Ster O op eenigen afſtand van de Aarde, welke ook, zal altoos in het vlak van den Equator zyn, wanneer ſlegts één der middenlynen van den Equator door de Ster gaat, en men zegt alsdan, die Ster is in den Equator. —— Indien men zich verbeeld dat die Ster O, in plaats van in de oppervlakte zelve van dit papier te zyn, een duim of meer

boven hetzelve verheven ware, dan zou de middenlyn D A O niet meer door deze Ster kunnen gaan, en de Ster O niet meer gezegd kunnen worden in het vlak van den Equator te zyn.

55. Wanneer men dus in de Sterrekunde zegt, dat een Hemellicht in den *Equator* — in de *Ecliptica* — in den *Horiſon* — in den *Meridiaan* is, moet men altoos de vlakken van die Cirkels daar door verſtaan; de *Zon* en *Maan*, by voorbeeld, gezegt wordende te gelyk in den Horiſon te zyn, geeft men daar mede te kennen, dat dezelven gelyktydig in het zelvde vlak zyn, alſchoon ook op eenen verbazenden afſtand van elkander verwyderd zynde, —— want zyn zy dit niet, zyn zy niet in het zelvde vlak, zoo kunnen zy ook niet beiden tegelyk in den Horiſon zyn; een Ster P dus, door welke eene der verlengde middenlynen van den Cirkel A B D H kan getrokken worden, is in het zelvde vlak met de Ster O, ſchoon ook verre van dezelve verwyderd.

56. Van dezen regel moeten nogthans alle de kleine Cirkels der Spheer worden uitgezonderd, wier vlakken in de Sterrekunde niet op gelyke wyze kunnen verlengd worden, en welken, in-

ven dus door haaren loop om de Zon eene kromme lyn gelyk aan de Ellips ABPC, *Fig.* 14. (die zeeker hier te ſterk Elliptisch getrokken is, doch hetgeen niet wel anders kan zyn, omdat men de juiste verhouding van de diameters der Ellips waarnemende, in eene figuur als deze, te na den Cirkel bykomen zou); de Zon S ſtaat niet in het middenpunt M der Ellips, maar in het eene brandpunt derzelve in S; de afſtand AS der Planeet van de Zon is niet gelyk aan den afſtand SP, en dus zyn de Planeeten, in haaren loop om de Zon, niet altoos even verre van dezelve verwyderd.

58. Het punt A van derzelver loopkring, het punt, dat het verſte van de Zon afſtaat, wordt het *Aphelium*, en het punt P, het naaste punt by de Zon, het *Periphelium* genaamd; de lyn ASP noemt men de lyn der *Apſidien*, en de punten B en C de middelbaare afſtanden —— MS is de uit middelpuntigheid der Planeet; deze lyn der *Apſidien* is niet altoos naar het zelvde gewest des Hemels gekeerd: dezelve heeft haare eigen beweging, welke men by naauwkeurige berekeningen behoort te kennen.

59. De afſtand der Planeet AH van derzelver *Aphelium* noemt men de *Anomalie* der Planeet; deze onderſcheid men in eene *waare* en *middelbaare*; de *middelbaare* is die, welke de Planeet zou hebben, wanneer haare beweging eenpaarig was, dat is, wanneer zy in gelyke tyden gelyke boogen doorliep; en de *waare* is die, welke zy werkelyk heeft, omdat de Planeeten, in haar

Aphelium veel traager loopende dan in haar *Periphelium*, geene gelyke boogen in gelyke tyden doorlopen.

60. Laat ons onderſtellen, dat Fig. 15. ARPQ wederom de loopkring van eene Planeet zy, en ABPCA een Cirkel om dezelve getrokken, in denwelken wy zullen onderſtellen dat eene zekere Planeet eene eenpaarige beweging heeft, zoo dat zy in denzelvden tyd even veel graaden van dezen Cirkel doorloopt; wy zullen deze Planeet de *middelbaare* Planeet noemen, om dezelve te onderſcheiden van de *waare*, die haaren omloop in de Ellips volbrengt; dan zal, wanneer de beide Planeeten (dat is de *middelbaare*, welke wy haaren loopkring in den Cirkel ABPCA vooronderſtellen te volbrengen, en de *waare*, welke haaren loop in de Ellips ARPQ heeft), haaren loop in A of het *Aphelium* beginnen, de *middelbaare* Planeet de *waare* Planeet vooruitlopen, wyl de beweging der *waare* Planeet in het *Aphelium* trager is; deze afſtand tuſſchen de *waare* en *middelbaare* Planeet zal geſtadig toenemen, tot dat de *waare* Planeet in R derzelver middelbaaren afſtand gekomen zynde, dit verſchil het grootſte zyn zal; vervolgends zullen



door hetwelk de Planeet gaan moet om ten *Noorden* van het vlak van den loopkring der Aarde te komen; noemt men de *Noorder-knoop*, en wordt aldus getekend ☊, en het punt D, door hetwelk paſſeerende de Planeet weder ten *Zuiden* van het vlak van den loopkring der Aarde komt, noemt men de *Zuider-knoop*, en tekend hetzelve aldus ☋; de afwyking e f der Planeet van het vlak van den loopkring der Aarde noemt men *de Breedte* der Planeet, welke het grootſte is in g. op 90° afſtand van den knoop, wanneer de Breedte A g gelyk is aan den hoek A D E, welken de beide vlakken met elkander maaken; de richting van de lyn der knoopen D B der byzondere Planeeten is zeer onderſcheiden, en zy hebben ieder weder haare afzonderlyke beweging.

65. Men telt thands 7 Planeeten tot ons Zonneſtelſel behoorende, waarvan ſommigen één of meer By-Planeeten of Maanen hebben: deze 7 Planeeten loopen ieder op bepaalde afſtanden en in vastgeſtelde tydperken rondom de Zon, welke afſtanden weder met de omloopstyden in verband ſtaan, zoo dat *de vierkanten der omloopstyden zyn als de Teerlingen der afſtanden.*

66. De Planeet MERCURIUS, welke de naaſte aan de Zon haaren omloop volbrengt, ſtaat in haaren middelbaaren afſtand 8,073,722 *duitſche Mylen* van de Zon af, en volbrengt haaren geheelen loop om de Zon in 87 dagen, 23 uuren, 15 minuten, 57 ſeconden.

VENUS, welke in haaren middelbaaren afſtand 15,086,550

15,086,550 *duitſche Mylen* van de Zon afſtaat, loopt in 224 d. 16 u. 49′ 12″ om dezelve.

Hierop volgt onze AARDE op eenen afſtand van 20,857,008 *duitſche Mylen*, in haare middelbaare ſtanden van de Zon, en volbrengt haaren omloop om dezelve, verzeld van ééne Byplaneet, de MAAN, in 365 d. 6 u. 9′ 11″

Na deze komt MARS, wiens gemiddelde afſtand op 31,779,673 *duitſche Mylen* berekent wordt; zyn omloopstyd is 1 jaar, 321 d. 22 u. 18′ 27″

Vervolgends JUPITER, op den veel grooteren afſtand van 108,476,874 *duitſche Mylen*, en loopt om de Zon, verzeld van vier Satellieten, in 11 jaar, 315 d. 8 u. 58′ 27″

Voorts SATURNUS, welke in zynen middelbaaren afſtand 198,962,702 *duitſche Mylen* van de Zon afſtaat, en zynen omloop in 29 jaar, 164 d. 7 u. 21′ 50″, verzeld van zeven Maanen, volbrengt, omringd zynde van eenen Ring, die in eenen ſchuinen ſtand met betrekking tot den loopkring der Planeet ſtaat.

Eindelyk volbrengt de Planeet HERCHEL of URANUS op den verbazenden afſtand van 400



deelen — en *Herchel* 1908180(*), waaruit men, als men de vier laatſte cyffer-letteren weglaat, voor de eenvouwigſte getallen, die ons de betrekkelyke afſtanden der Planeeten voor het geheugen gemakkelyk maaken, deze getallen bekomt 4, 7, 10, 15, 52, 95, 190. — Ons Zonneſtelzel, met de betrekkelyke afſtanden der Planeeten, zoo verre eene afbeelding van deze grootte dit toeliet, ziet men in de V Plaat afgebeeld.

68. Even gelyk de afſtanden der Planeeten van de Zon, en haare omloopstyden zeer onderſcheiden zyn, zoo zyn ook haare grootten onderling zeer verſcheiden. — Men berekent de grootte der middenlynen aldus, die van de *Zon* op 319,397 *Lieues* ieder, van 2283 *Toiſes* of $\frac{1}{2}$ Rhynlandſche Roeden — van *Mercurius* 1166 *L.* — van *Venus* 2748 *L.* — van de *Aarde* 2865 *L.* van de *Maan* 773 *L.* — van *Mars* 1899 *L.* — van *Jupiter* 32264 *L.* — van *Saturnus* 28600 *L.* — en van *Herchel* 12410 *L.* — zoo dat de *Zon* veertien honderd duizend maal grooter is dan onze Aarde — *Mercurius* het één vyftiende deel der Aarde beſlaat — *Venus* een negende deel kleiner is dan de Aarde — *Mars* het drie tiende deel van de Aarde bevat — *Jupiter* veertien honderd maal grooter dan de Aarde — *Saturnus* omtrent duizend maal grooter dan de Aarde — en *Herchel* tachtig maal grooter dan de Aarde is — terwyl de *Maan* maar het een vyftigſte deel der Aarde beſlaat.

(*) De getallen gevoegd agter deze opgave van de afſtanden der Planeeten in § 67. zyn *decimecale* of tiende en honderſte deelen, zoo dat 38709,88 de afſtand van *Mercurius* zoo veel beteken, als $38709\frac{88}{100}$.

II. BOEK.

BESCHRYVING DER CONSTRUCTIE VAN DE GLOBE EN SPHÆRA ARMILLARIS.

I. HOOFDSTUK.

BESCHRYVING VAN DE NIEUWE CONSTRUCTIE DER AARD-GLOBE, AFGELEID UIT DE WAARE BEWEGING DER AARDE.

§ 69. Wy moeten in dit Hoofdſtuk onze beſchouwing van den loop der Planeeten voortzetten, en tevens, daar wy inzonderheid over den *loop van de Aarde om de Zon*, en derzelver eigenlyke beweging om haaren As moeten ſpreeken, gelegenheid hebben de beweging der Planeeten, uit onze Aarde gezien, naar te gaan, en derzelver plaats, uit dezelve gezien, te bepaalen, ten einde derzelver verſchyning en weder verdwyning voor ons oog daar door bevattelyker te

beweging der Aarde zelve afgeleid moeten worden. — Wy hebben, in het 1. Hoofdſtuk van het I. Boek, een algemeen denkbeeld van de Cirkels der Spheer gegeeven; wy moeten dezelven thands op onze nieuwe Aard-Globe toepaſſen: deze toch vereenigt als 't waare de *Hemel- en Aard-Globen*, en bevat dus zoo wel die Cirkels, die meer bepaald tot de *Hemel-Globe* behooren, als die, welken tot de *Aard-Globe* betrekkelyk zyn. — In de VIII Pl. ziet men eene afbeelding der nieuwe Aard-Globe, en men moet in deze beſchryving dezelve geduurig voor zich hebben, om onze beſchryving derzelver zoo veel te gemakkelyker te bevatten.

Van de Ecliptica.

70. Even gelyk alle de andere Planeeten beweegt zich de *Aarde* om de *Zon*, in een vlak, 't welk door het middenpunt der Zon gaat, en volbrengt haaren loop in een Elliptiſche gedaante in den tyd van 365 dagen, 6 uuren, 9′ 11″; dit vlak noemt men de ECLIPTICA, omdat in en naar by hetzelve de *Zon* en *Maan-Eclipſen* voorvallen; men is gewoon in de Sterrekunde tot hetzelve de beweeging van alle de Planeeten over te brengen, en derzelver plaats op hetzelve te bepaalen §. 83, omdat de *Zon* dit vlak in een jaar ſchynbaar doorloopt § 72., en deze het voor ons aanmerkelykſte Hemellicht is, om met hetzelve den ſtand der overige Planeeten te vergelyken; waarom het vlak der *Ecliptica*, van alle de vlakken van de Cirkels der Spheer, het eerſte is, dat wy moe-

moeten kennen, als het ſtandpunt onzer beſchouwing uitmaakende, wanneer wy de waare beweging der Aarde naarſpooren.

71. Het is om deze reden dat hetzelve in deze nieuwe Conſtructie der Aard-Globe *Horiſontaal* geplaatst is; het wordt door den breeden rand ABC Pl. VIII., die de Globe omringt, verbeeld; wy moeten dit vlak nader in derzelver verdeeling en gebruik leeren kennen, om ons van hetzelve een recht denkbeeld te vormen.

72. Wanneer *Fig.* 18 Pl. IV ABÇD den *loopkring der Aarde*, in het vlak der *Ecliptica*, 't welk hier het papier zelve is, getrokken, verbeeld, en S de Zon zy, dan zal, wanneer de Aarde, in haaren jaarlykſchen loop om de Zon, den Cirkel ABCD beſchryft, dezelve de *Zon* den grooteren Cirkel EFGH zien beſchryven, welken deze in een jaar ſchynbaar zal doorlopen; dezen grooten Cirkel EFGH moeten wy ons voorſtellen te verbeelden den Sterrenhemel, die ons omringt en zich in de gedaante van eene holle kloot aan ons oog vertoont; wy zullen jaarlyks de Zon tot elke Ster in denzelven geplaatst zien naderen, en na één jaar tot denzelven weder keeren; laat A de plaats der Aarde zyn, op een' zeekeren tyd, wanneer zy de Zon langs de lyn ASZ ziet, en deze zich dus uit de Aarde gezien by Z vertoont, dan zal de Aarde, tot in B in haaren loopkring gevorderd zynde, de *Zon* langs de lyn BSDW zien, en de *Zon* zal zich aan den Sterrenhemel by W vertoonen; zy zal den boog ZW ſchynen te hebben

den doorlopen, in den tyd dat de Aarde werkelyk den boog AB doorlopen heeft.

73. Ten einde nu met meer naauwkeurigheid de plaats der Zon in den Cirkel EFGH, dat is in de *Ecliptica* te kunnen bepaalen, heeft men dezelve, even als men gewoon is alle Cirkels te doen, in 360° verdeeld, welken men egter niet van één tot 360 graaden doortelt, maar flegts tot 30° toe, zoo dat 30°, of een twaalvde deel van de *Ecliptica*, één *Teken* uitmaken, aan welke Tekens men ieder een' afzonderlyken naam, ontleend van dat Sterrenbeeld des Dierenriems, dat oudstyds aan het begin van elk dezer Tekens ſtondt, gegeeven heeft; de namen dezer Tekens zyn: Het Teken van *Aries* of den *Ram* — van *Taurus* of den *Stier* — van *Gemini* of den *Tweeling* — van *Cancer* of de *Kreeft* — van *Leo* of den *Leeuw* — van *Virgo* of de *Maagd* — van *Libra* of de *Weegſchaal* — van *Scorpius* of de *Schorpioen* — van *Sagittarius* of den *Boogſchutter* — van *Capricornius* of den *Steenbok* — van *Aquarius* of den *Waterman* — en van *Pisces* of de *Viſſchen*; gemakshalve onderſcheid men deze Tekens met de volgende Caracters, met welken zij ook in de 18 Fig. zyn aangetekend, ♈ — ♉ — ♊ — ♋ — ♌ — ♍ — ♎ — ♏ — ♐ — ♑ — ♒ — ♓.

74. Dan daar, door den teruggang der *Nachteeveningen*, van dewelken wy in de 95 §. ſpreken zullen, de Sterrenbeelden, naar welken de twaalf Tekens der *Ecliptica* genoemd zyn, niet meer aan het begin van die Tekens ſtaan, van

welke zy den naam voeren, maar omtrent 30° verder; en daar de *Zon* dus niet meer in het *Sterrenbeeld* van den Ram of Stier ſtaat, wanneer dezelve in het *Teken* van den Ram of Stier ſtaat, (het *Sterrenbeeld van den Ram* is eene verzameling van vaste Sterren, welke dezen naam voert, daar het *Teken van den Ram* niet anders is, dan het 1e twaalvde deel van de Ecliptica) om deze reden is men thands gewoon de plaats der Zon in de Ecliptica, niet door de *Naamen* der Tekens, maar door derzelver tal-letter te bepaalen, te weeten: men begint de telling van het 1e punt van *Aries*; dit punt noemt men 0 en telt van het zelve 30 graaden tot aan het 1e punt van *Taurus*; alhier een Teken vol zynde, zegt men I. Teken, en telt vervolgends weder by graaden, tellende voort, tot het 1e punt van *Gemini*, waar het 2e Teken vol zynde, men telt II Tekens 1° — II Tekens 2° enz., dus de *Zon* by voorbeeld aan den Sterrenhemel by a Fig. 18. gezien wordende, zegt men dat haare *lengte* is 0t 20°, om dat de boog ♈ a juist 20° bevat, — ſtond de Zon by I, men zou zeggen dat haare lengte was 9t 25° omdat



met aan den Sterrenhemel overeenkomt. § 83.

75. Even gelyk als de Cirkel EFGH, Fig. 18. de *Ecliptica* verbeeld, zoo verbeeld ook de *breede rand der Globe* ABC Pl. VIII, het vlak der *Ecliptica*; hij wordt van ons nooit voor eenig ander vlak gebruikt; de verdeeling, welke men op denzelven aantreft, is tweeledig, zynde deze tweeërlei verdeeling door een' breeden zwarten Cirkel afgeſcheiden; de *binnenſte* is voor den loop der *Zon*, en de *buitenſte* is voor die der *Maan*; — de *binnenſte* bevat 1°. de verdeeling der *Ecliptica* in Tekens en Graaden. 2°. Eene verdeeling van de 12 *Maanden* des jaars, ieder van welke weder in zoo veele deelen is afgedeeld, als elke Maand *dagen* telt; deze verdeeling der *Maanden*, welke overeenkomt met het *Teken* in het welke de Zon ieder Maand ſtaat, dient, om de plaats der *Zon* voor elken Dag des jaars gemakkelyk te kunnen vinden, en ten einde dit met te meer naauwkeurigheid te doen, zoo treft men op deze *Ecliptica* der Globe *vier* verſchillende verdeelingen voor de *Dagen* der Maanden aan, de 1e. of binnenſte, dient voor het 1e. jaar na het ſchrikkeljaar, de 2e. voor het 2e. jaar na het ſchrikkeljaar, de 3e. voor het 3e. jaar na het ſchrikkeljaar, en de 4e. voor het ſchrikkeljaar zelven; een zeker Teken, 't welk wy de *artificieele Zon* zullen noemen, dus op een' zekeren dag des jaars op dezen breeden rand der Globe geplaatst, wyst ons, op de correſpondeerende verdeeling der *Tekens* en *Graaden* de plaats der Zon in de *Ecliptica* op dien dag aan. — De *Buitenſte* verdeeling heeft meede

eene verdeeling der Tekens en Graaden van de Ecliptica, en ter wederzyde van dezelve nog eene andere, zynde de eene geſchikt voor de *Beweging der Maan in Lengte*; *of de Lengte der Maan op elken dag van haar' ouderdom*; de Lengte der Maan in het oogenblik der Conjunctie geſteld op ♈ 0°, en de verdeeling, ter andere zyde van de verdeeling der Tekens en Graaden van de Ecliptica, is geſchikt voor de *Breedte der Maan*, op elken graad afſtands der Maan van haare *klimmende knoop*, de lengte der knoop mede geſteld zynde te zyn ♈ 0°; wy zullen van deze laatſte verdeeling van den breeden rand der Globe nader ſpreeken, als wy in het volgende Hoofdſtuk over den Loop der Maan zullen handelen.

76. Dan daar de verdeeling van de *Ecliptica* der Globe op Cirkels getekend is, welken uit het middenpunt derzelve en dus uit het middenpunt der Aarde getrokken zyn, en de verdeeling der Tekens en Graaden in de 18 Fig. op eenen Cirkel geſchied is, die uit het middenpunt der *Zon* getrokken is, zou men welligt zich kunnen verbeelden, dat hier uit eenige verandering in het aanwyzen van de *Lengte der Zon* op de *Ecliptica*



Cirkel e f g h, welke ons de *Ecliptica der Globe* aanwyst, en welken men zich dus even als de grooten Cirkel E F G H in Tekens en Graaden verdeeld, moet voorſtellen, dan zal de plaats der Zon, welke op den grooten Cirkel E F G H, door de lyn A S Z, in Z of het 1e. punt van ♎ wordt aangewezen, ook op de kleine Cirkel e f g h, dat is op de *Ecliptica der Globe* in ♎ worden aangeweezen; de lyn A S, welke den ſtraal der Zon verbeeld, die loodrecht tot de Aarde komt, zal zoo wel op de *Ecliptica der Globe*, als aan den Sterrenhemel dezelvde plaats des Hemels aanwyzen; dit zelvde heeft plaats in den ſtand B der Aarde; verbeelden wy ons de Globe met derzelver *Ecliptica* in B verplaatst te zyn, dan zal immers de lyn B S W zoo wel in den grooten Cirkel E F G H als in den kleine e f g h het 1e. punt van ♑ voor de plaats der Zon aanwyzen, omdat, ſchoon de Globe verplaatst wordt, de verdeeling van de Tekens van derzelver *Ecliptica* ſteeds dezelvde betrekking tot de vaste Sterren moet onderſteld worden te behouden; dit zal ons duidelyker worden, wanneer wy over het vinden van de plaats der Planeeten op de *Ecliptica* der Globe, zullen ſpreeken.

77. Laat L de plaats van eene Planeet zyn, in haar' loopkring L M N O, welke uit de Zon gezien wordt, langs de lyn S L E; haare lengte uit de Zon gezien, zal gelyk zyn aan den boog ♈ E, welken men dus de *Heliocentriſche lengte* gewoon is te noemen; uit de Aarde daarentegen zal dezelve Planeet gezien worden langs de lyn A L X; de boog h i, op de *Ecliptica der Globe*, drukt uit

de *Geocentrische lengte* der Planeet, doch deze is nu niet meer gelyk aan den boog ♈X, op de grooten Cirkel E F G H, en deze wyst ons dus de *Geocentrische lengte* der Planeet *niet* aan; maar de *Geocentrische lengte* der Planeet L wordt op den grooten Cirkel E F G H aangeweezen door den boog ♈Y, welke bepaald wordt door de lyn S Y paralel getrokken aan de lyn A X; de boog ♈Y op den grooten Cirkel E F G H, is dus gelyk aan den boog h i op den kleinen Cirkel e f g h, en het punt i wyst ons dus op de *Ecliptica der Globe* de plaats aan van den Sterrenheme', waar de Planeet L uit de Aarde gezien wordt. — De reden dat in den grooten Cirkel E F G H die plaats niet direct door de lyn A X maar door S Y, die aan A X *paralel* getrokken is, wordt aangeweezen, is, omdat de afstand der vaste Sterren van onze *Aarde*, in vergelyking van den afstand der *Aarde* tot de *Zon* zoo verbazend groot is, dat deze laatste in vergelyking van de eerste byna gelyk *nul* wordt, zoo dat de tusschenwydte S A in de 18 Fig., indien dezelve na proportie getekend was, oneindig klein zou moeten zyn, wanneer dus de lynen A X en S Y volmaakt dezelvden zouden zyn,

[redacted]

Cirkel PQRT aangeweezen, en wanneer zy zich in haaren loopkring in T bevindt, dan zal zy uit de Aarde langs de lyn A T ♐ gezien worden; haare lengte op de *Ecliptica der Globe* zal door den boog h e f g k worden aangeweezen: k is dus het punt van de *Ecliptica der Globe*, waarin de *Maan* aan den Sterrenhemel uit de *Aarde* gezien wordt, gelyk V het punt is, dat door de lyn S V parallel aan A ♐ getrokken is, wordt aangeweezen, alwaar de *Maan* zich vertoont en de boog ♈ ♋ ♎ ♑ V op den grooten Cirkel E F G H is dus weder gelyk aan den boog h e f g k op den kleinen Cirkel e f g h, zie § 77.

79. Na dit alles gezegt te hebben, kan het geene zwarigheid meer maaken, dat wy den grooten Cirkel E F G H Fig. 18. *Ecliptica* noemen, zoo wel als den breeden rand der Globe; schoon zy beiden eigentlyk gesproken geen gemeen middenpunt hebben, zy moeten beiden veronderstelt worden, in 't *zelvde vlak* gelegen te zyn, en dragen dus beiden den naam van het vlak, hetwelk hen gemeen is.

80. Hoe zeer ook de afstanden der Hemelsche Ligchaamen van onze Aarde zeer aanmerkelyk verschillen, zoo worden dezelven echter door ons allen, als waaren zy op gelyken afstand van ons in eene holle kloot geplaatst, gezien, en hun stand kan daarom zeer gevoeglyk op eene kloot of Spheer worden afgebeeld: C Fig. 19. zy onze *Aarde*, van welke op zeer verschillende afstanden de Maan D, de Planeet F en de vaste Sterren E en G geplaatst zyn, dan zullen dezen allen langs de lynen

CE, CF, CD en CG, in de punten AHIK in den omtrek des Cirkels AB, dewelke hier een gedeelte van de hollen kloot des Hemels verbeeld, van ons gezien worden, zonder dat wy in dit opzicht eenig verſchil van afſtand gewaar worden, en onderſteld zynde dat deze Sterren allen in 't vlak der *Ecliptica* geplaatst waaren, zoo zal haar ſtand op het gedeelte AB van de *Ecliptica der Globe*, dus ook door de punten AHI en K worden aangeweezen; hetzelvde dat wy hieromtrent de plaatzing der Sterren in de *Ecliptica* gezegt hebben, is toepaſſelyk op elken anderen Cirkel der Spheer; hoedanig ook de plaatzing der Sterren is, zy worden alle van ons, als in boogen van groote Cirkels geplaatst, gezien, zonder opzicht van haaren afſtand van ons.

81. Wy zeiden boven § 63 en 64. dat de *Loopkringen der Planeeten* niet in hetzelvde vlak met den *Loopkring der Aarde* vallen, maar op hetzelve met zekere hoeken hellen, waarom men dan ook de afwyking der Planeeten van de *Ecliptica* of den boog ef Fig. 17. de *Breedte* eener Planeet gewoon is te noemen; deze *Breedte* nu der Planeet verſchilt even als de *Lengte* of zy uit

den Loopkring der Aarde verbeeld) verheven is, en het gedeelte DFB beneden die Fig. geplaatst zy, dan zal DB de *lyn der Knoopen*; B de *klimmende* en D de *daalende Knoop zyn*; ef zal de *breedte* der Planeet, en de hoek fSe de *Heliocentrifche Breedte*, en de hoek fTe de *Geocentrifche Breedte* zyn; het is deze *Geocentrifche Breedte* welke wy op de Globe moeten kunnen aanwyzen, om de juiste plaats eener Planeet te bepaalen.

82. Wy moeten ons verbeelden dat de Cirkelboog ef regthoekig op de 20 Fig. ftaat, want de Breedte eener Planeet, wordt gemeeten op een' Cirkel, welke regthoekig op de *Ecliptica* ftaat, en dus door de Poolen der Ecliptica gaat § 24. twee zoodanige *Cirkels van Breedte* ziet men op de nieuwe Aard-Globe: de eene is de breede koperen Cirkel FGHIF, Pl. VIII. welke de geheele Globe draagt, en in welken de Poolen der Globe ronddraaijen; deze is te gelyk de *Coulure der Zonneftanden*; LMN is een andere *Breedte-Cirkel* van koperdraad, beweegbaar om de beide *Poolen* L en N *der Ecliptica*; dezelve kan dus op elken graad van de *Ecliptica* geplaatst worden, en aan dezelven zyn twee beweegbaare Sterretjes geplaatst, welken men door verfchuiving op den begeerden graad van *Breedte* kan plaatfen.

83. De boog Df, dat is de afftand der Planeet van de knoop D gemeeten op den *loopkring der Planeet*, is niet gelyk aan den boog De, dat is de afftand der Planeet van de knoop D, gemeeten op de *Ecliptica*, wyl de beide zyden fD en eD van den rechthoekigen Driehoek efD niet even

groot zyn, omdat de hoek e recht zynde, fD de *Hypotenuſa* is, welke dus grooter is als de rechthoekszyde eD, en het is dit verſchil, 't geen men de *Reductie tot de Ecliptica* noemt, en waarvan men de hoe grootheid moet kennen, om de lengte der Planeeten, welken in de Astronomiſche Tafelen, op het vlak haarer loopkringen berekend zyn, tot het vlak der *Ecliptica* over te brengen, gelyk men, zoo als wy § 70. zeiden gewoon is te doen; De tot de *Ecliptica overgebragte lengte eener Planeet*, is dus de afſtand ♈e, van het 1. punt van ♈ tot het punt e, het punt waarin de perpendiculair fe, die rechthoekig op de *Ecliptica* ſtaande, door de Planeet f getrokken is, te ſtaan komt.

84. Men onderſcheid drieërlei ſtanden der Planeeten ten opzigte der Aarde; de *Conjunctie*, de *Oppoſitie* en de *Quadratuuren*; — de *Conjunctie* eener Planeet heeft plaats, wanneer dezelve in *zamenſtand* met de *Zon* is, dat is wanneer de Aarde in haaren loopkring Fig. 21. in T ſtaat en de Planeet in P; zy ſtaat dan in eene rechte lyn met de *Zon*, en de *Zon* ſtaat tusſchen de Planeet en de *Aarde* in; de Planeet gaat 's middags ten

ten 12 uuren door de Meridiaan. — Men zegt dat eene Planeet in haare *Quadratuuren* is, wanneer zy in de ſtanden C of D is, op 90° afſtand in lengte van de *Zon*, en zy gaat alsdan 's morgens of 's avonds ten 6 uuren door den Meridiaan.

85. De *Oppoſitie* der Planeeten heeft alleen plaats voor die Planeeten, welken verder dan onze *Aarde* van de *Zon* verwyderd zyn, en welken men *boven Planeeten* noemt, in onderſcheiding van die, welken tusſchen de *Zon* en onze *Aarde* in, zich bewegen, en welken men *beneden Planeeten* noemt; deze laatſten kunnen nooit agter onze *Aarde* komen, dat is de *Aarde* kan nooit tusſchen haar en de *Zon* in te ſtaan komen; daarentegen hebben dezen weder tweeërlei ſoort van *Conjunctie*: de beneden Planeeten zyn in *Conjunctie* in de ſtanden A en B; in beide gevallen hebben zy dezelvde *Lengte* met de *Zon*, doch in de ſtand A, welken men de *bovenſte Conjunctie* noemt, ſtaan zy veel verder van ons af; de *Zon* ſtaat dan tusſchen haar en de *Aarde* in, daar in de *benedenſte Conjunctie*, in B, de Planeet tusſchen de *Zon* en de *Aarde* inſtaat.

86. De dubbele beweging der *Aarde* en der *Planeeten* om de *Zon*, is oorzaak van haare ſchynbaare onregelmaatige beweging, die haar dan eens doet *voorwaards*, dan weder *agterwaards* gaan, en ſomts zelfs ſchynbaar doet *ſtilſtaan*; gelyk men dit uit eene vergelyking van haare *Geocentriſche Lengte* op verſchillende Tyden zeer ligt kan nagaan; laat T Fig. 21. de *Aarde* en O eene *Planeet* zyn, die volgends het te vooren gezegde in haare *Oppoſitie* is, en welke uit de Aarde langs de lyn TO

in

in ♈ gezien wordt; de *Aarde*, welke nader by de *Zon* ſtaat, loopt ſnelder dan de Planeet O, zy loopt dus de *Planeet* vooruit, en tot in a in haaren loopkring gevorderd zynde, zal de Planeet in b zyn, en de *Aarde* haar aan den Sterrenhemel in c zien, § 77. de Planeet is dus den boog ♈c ſchynbaar terug gegaan. — Vervolgends de *Aarde* van a tot in d gevorderd zynde, zal de *Planeet* den boog be doorlopen hebben, en uit de *Aarde* aan den Sterrenhemel in f gezien worden, zoo dat nu nog haare beweeging agterwaards is, wyl zy den boog cf weder ſchynbaar is terug gegaan — laat nu de *Aarde* verder tot in g en de *Planeet* tot in h gekomen zyn, dan zal de *Planeet* uit de Aarde aan den Sterrenhemel in i gezien worden, haare beweging zal dus weder voorwaards zyn, wyl zy den boog fi ſchynbaar vooruit geloopen is; — voorts zy de *Aarde* tot in k en de *Planeet* tot in l gevorderd, en zy zal, uit de *Aarde* gezien, weder dezelve lengte hebben, als toen zy in *Oppoſitie* met de *Aarde* was, namentlyk zy zal uit de *Aarde* by ♈ gezien worden; tuſſchen het punt d en g in zal de *Aarde* in haaren loop de *Planeet* als ſtilſtaande beſchouwen, voor zy

[redacted]

Over de dagelykſche beweging der Aarde.

87. Alle de verſchynſelen, welken wy tot hiertoe beſchouwd hebben, hangen af van de *jaarlykſche beweging der Aarde* om de *Zon*; dan behalve dezen jaarlykſchen loop der *Aarde*, heeft dezelve nog eene andere beweeging, welke men moet kennen, omdat zy alle de verſchynſelen van beurtelingſchen *Op-* en *Ondergang* der Hemelſche Ligchaamen veroorzaakt, en die ons bijzonder door de Globe wordt afgebeeld.

88. Wanneer wy een' Bol tusſchen onze beide vingers aan twee recht tegen elkander overſtaande punten van deszelfs oppervlakte vasthoudende ronddraaijen, noemt men deze punten de *Poolen* van den Bol, en een lyn denkbeeldig door den Bol van de eene Pool tot de andere getrokken, noemt men de As der Bol § 6; een' Bol dusdanig eene beweging gevende, wordt gezegd *om zyn' As te draajen*, en het is zoodanig eene beweeging, welke men ook aan onze *Aarde* moet toekennen, en welke men, omdat zy in één' dag of 24 uuren volbragt wordt, *de dagelykſche beweging der Aarde* noemt; door deze beweging is het dat men, gelyk wy zoo even zeiden, de *Zon*, *Maan* en *Sterren* ziet *Op-* en *Ondergaan*, en na verloop van 24 uuren ten naasten by weder aan dezelfde plaats des Hemels komen; deze beweging der *Aarde* geſchied van het *Weſten* naar het *Oosten*, en het is dezelfde beweging, welke men aan deze *Aard-Globe* geeft, als men dezelve van de linker naar

de

de rechte hand om haare Poolen FK Pl. VIII. doet rondraaſen.

89. De Aarde draait zich van het *Weſten* naar het *Oosten* in den tyd van 24 uuren eenmaal om zyn' *As*; dan, wy kunnen volgends § 6. elke middenlyn eens Bols voor As aanneemen; iedere middenlyn heeft niet dezelfde betrekking met het vlak van den jaarlykſchen loopkring der Aarde, en hieruit volgt dus van zelven, dat ook de *As der Aarde* een' verſchillenden ſtand met betrekking tot het vlak der *Ecliptica* hebben kan; deze ſtand kan in 't *zelfde vlak vallen*, met de *Ecliptica* — zy kan *rechthoekig* zyn op het vlak der *Ecliptica* — en *ſchuins* ſtaan op de *Ecliptica*, dat is met dezelve een' zekeren hoek maaken.

90. NRZÆN Fig. 8. zy het vlak der *Ecliptica*, N en Z de beide Poolen der Aarde — NZ derzelver *As*, welke hier verbeeld wordt in het vlak der *Ecliptica* te leggen; — NQZ de $\frac{1}{2}$ omtrek der Aarde. — Wanneer wy nu onderſtellen dat de *As der Aarde* in dezen ſtand geplaatst was, zou de *Ecliptica*, de Aarde beſtendig in twee gelyke deelen doorſnyden, welke doorſnede door de beide Poolen der Aarde gaan zou, en daar de

der Aarde Aad ÆgkD de Zon *ſucceſſievelyk* in het tydverloop van één jaar in haar *Zenith* moeten hebben, en wanneer de Noord of Zuid-Pool de Zon beſtendig in haar Zenith had, zoo zou de geheele tegenovergeſtelde helft der Aarde beſtendig Nacht hebben, 't geen tegen de ondervinding rechtſtreeks ſtryd.

91. Even min voldoet een rechthoekige ſtand van den As der Aarde op het vlak der Ecliptica: laat ÆBCRQÆ, Fig. 10. wederom de *Ecliptica* en Nh den *As der Aarde* rechthoekig op dezelve geplaatst verbeelden, dan zullen, welke ook de ſtand der Zon in de Ecliptica zyn moge, de Dagen en Nachten altoos even lang zyn, omdat de *Zon*, altoos recht boven den *Equator*, welke in dit geval met de *Ecliptica* het zelfde vlak zou uitmaaken, ſtaan zou § 39. 't geen wy niet zien gebeuren.

92. 'Er is dus geen ſtand, welke voldoet aan de waarnemingen dan de ſchuine ſtand, welke in de 9. Fig. wordt afgebeeld; de As der Aarde maakt met het vlak van de Ecliptica een' zekeren hoek, welke door naauwkeurige waarnemingen gebleken is nagenoeg te zyn van $66\frac{1}{2}^{\circ}$, 'er zyn zeker kleine oneffenheden in denzelven, dan wy veronderſtellen hier dat deze helling dezelvde zy; de *As der Aarde* maakt dus met de *Ecliptica* een' hoek NRE, Fig. 9. van $66\frac{1}{2}^{\circ}$ en de *Noord-Pool* N blyft beſtendig naar het zelfde punt des Hemels, dat is naar het 1e. punt van het Teken der *Kreeft* gekeerd; wy zullen in 't vervolg gelegendheid hebben te zien dat deze ſtand

van

van den As der Aarde oorzaak is van de verwisseling der Saisoenen, en die lengte van Dagen en Nachten voortbrengt, welke wy gewoon zyn waartenemen, en het is deze stand, welken wy ook op deze onze nieuwe constructie der Aard-Globe zien in acht genomen: de As R T Pl. VIII. der Globe, houd bestendig dezelfde richting ten opzichte van het vlak A B C des breeden rands, welke de Ecliptica verbeeld.

Van den Equator en Declinatie-Cirkel.

93. Wanneer men op de oppervlakte eener kloot op gelyke afstanden van derzelver Poolen en *rechthoekig* op den *As*, een' Cirkel trekt, dan noemt men dezen Cirkel *Equator*, om dat hij den Bol in twee gelyke deelen verdeelt; zoodanig een' Cirkel verbeeld men zich ook op de oppervlakte van onze Aarde getrokken te zyn; de *Equator* der Aarde verdeelt dus de *Aarde* in twee gelyke deelen, en ieder van deze deelen heeft eene der Poolen tot Centrum; dat gedeelte waarin de *Noord-Pool* gelegen is, noemt men het *Noorder Halfrond*, en het andere gedeelte waarin de *Zuid-*

94. Daar nu § 92. de As der Aarde met het Vlak der Ecliptica een' hoek maakt van $66\frac{1}{2}°$, en de *Equator* rechthoekig op den As der Aarde ſtaat, zoo moet de *Equator* met de *Ecliptica* een' hoek maaken, die gelyk is aan het compliment van den hoek, dien de *As der Aarde* met de *Ecliptica* maakt, § 35. 4e gevolg: en het is deze hoek, welken men de *ſchuinheid der Ecliptica* gewoon is te noemen.

95. De Equator, als Cirkel beſchouwd, behoort eigentlyk tot de *Aardryksкunde*: om deze reden vindt men denzelven op alle *Aard-Globen* afgeteekend; dan als een Vlak beſchouwd, behoort hy ook tot de *Sterrekunde*, en wy zullen weldra zien welk gebruik men in dezelve van hem maakt, § 101. Hy wordt op onze nieuwe Globe door den dunnen koperen Cirkel D B E, afgebeeld; men ziet in Pl. VIII. en nog duidelyker op de Globe zelve, den hoek E B C, dien de *Equator* met de *Ecliptica* maakt, en dien wy zoo even aantoonde dat men de *ſchuinheid der Ecliptica* gewoon is te noemen.

96. De *Equator* ſnyd dus de *Ecliptica* in twee regt tegen elkander over ſtaande punten, § 64. en het zyn deze punten, welke men de *Nachtevenings-punten* noemt, omdat de Zon in deze punten ſtaande, Dag en Nacht over de geheele Aarde even lang is, § 91. het is van den doorgang der Zon door dezelven, dat men het begin der *Lente* en *Herfſt* bepaalt. — Het *Nachtevenings-punt van de Lente* ſnyd de *Ecliptica* in het 1e. punt van *Aries*, en van hetzelve be-

ginnt men de telling der Lengte op de *Ecliptica*, § 74. gelyk men ook de graaden des *Equators*, wat de Sterrekunde betreft, van hetzelve begint te tellen; het tegenoverſtaande punt wordt het *Nacht-evenings-punt van den Herfst* genaamd, en ſnyd de *Ecliptica* in het 1e. punt van *Libra*; deze punten ondergaan door de aantrekkingskragt der Zon en Maan eene kleine verandering, § 74. zoo dat zy niet altoos met het zelfde punt des Hemels overeenkomen, en het is deze verandering, welke men de *teruggang der Nacht-eveningen* noemt, omdat deszelvs beweging tegen de orde der Tekens van de Ecliptica geſchiedt, dezelve bedraagt $50''\frac{1}{3}$ in één Jaar.

97. In deze beide punten der *Nacht-eveningen* gaat dus het Vlak des *Equators* door de Zon, Dag en Nacht zyn als dan even lang en de *Zon* ſtaat in het vlak zelf van den *Equator*, dat is, heeft geene *Declinatie*, dan in alle andere ſtanden wykt de Zon ten Noorden of ten Zuiden van den *Equator* af, en het is deze afwyking der Zon van den Equator, welke men de *Declinatie der Zon* noemt; deze *Declinatie* der Zon wordt *Noordelyk*, zoodra de Zon het 1e. punt van ♈ gepasſeerd is,



men de Tekens des Dierenriems onderſcheid in *klimmende* en *daalende* Tekens: de klimmende Tekens zyn, die van den *Steenbok*, den *Waterman*, de *Viſchen*, den *Ram*, den *Stier* en den *Tweeling*; men noemt dezelven *klimmende*, omdat de *Zon* in dezelven zynde, tot de N. Pool, die voor onze gewesten de naaste is, nadert; de *daalende* zyn, die van de *Kreeft*, den *Leeuw*, de *Maagd*, de *Weegſchaal*, den *Scherpioen*, en den *Boogſchutter*; *daalende* worden dezen genaamd, omdat de *Zon*, in dezelven zynde, zich meer en meer van de N. Pool verwydert; van deze onderſcheiding in klimmende en daalende Tekens, maakt men veel gebruik in de Sterrekunde; de beſchouwing der Globe zelve kan hier zeer veel duidelykheid byzetten; het is genoeg dat wy het hebben aangeweezen, te meer, daar het gebruik der Globe dit alles veel zal moeten ophelderen.

98. Even nu gelyk de Zon, in twee tegen elkander overſtaande punten van zynen jaarlykſchen ſchynbaaren loop, geen *Declinatie* heeft, zoo heeft zy ook in twee andere recht tegen elkander overſtaande punten haare grootſte *Declinatie*; deze twee punten, in dewelke zy haare grootſte *Declinatie* heeft, noemt men de *Zonneſtanden*, omdat de *Zon* als 't waare op dien tyd ſchynt ſtil te ſtaan, dat is weinig te vermeerderen of te verminderen van Declinatie, en inderdaad wanneer AB Fig. 22. de *Equator* en ACB de *Ecliptica* zy, zoo zien wy duidelyk dat de boog df, naarby den *Zonneſtand* C rechthoekig op den *Equator* getrokken, weinig kleinder is dan de boog Cg,

die gelyk is aan de *Declinatie der Zon*, in den *Zonneſtand zelven*, en dat dus de Zon digt by de Zonneſtanden weinig in *Declinatie* toe- of afneemt, daar deze toeneming naarby de *Nacht-evening*en zeer aanmerkelyk is, gelyk men ziet, wanneer men de boogen a b en e h te zamen vergelykt; de *Zonneſtanden* vallen voor wanneer de Zon in het 1e. punt van ♋ en van ♑ is; die in *Cancer*, noemt men *Zomer-Zonneſtand*, omdat voor onze Noordelyke gewesten als dan de *Zomer* begint, en die van *Capricornus* de *Winter-Zonneſtand*, om het begin van den *Winter* op dien tyd.

99. Het is door deze twee punten der *Zonneſtanden*, dat men zich twee evenwydig aan den *Equator* getrokkene Cirkels verbeeld, welken men de *Keerkringen* noemt, wyl de *Zon* tot den Equator wederkeert, wanneer zy tot deze Cirkels geraderd is; den *Noordelyken* keerkring noemt men de *keerkring van de Kreeft*, omdat dezelve door het 1e. punt van het Teken van de *Kreeft* gaat, en den *Zuidelyken* noemt men de *keerkring van den Steenbok*, omdat dezelve door het 1e. punt van den *Steenbok* gaat; deze *Keerkringen* hebben wy in de onze nieuwe Aard-Globe omringende Cirkels weggelaaten, omdat ze in de Sterrekunde van weinig gebruik zyn; op de Aard-Globe zelve zyn zy getrokken, en bepaalen aldaar de landen, boven welken de *Zon* één' of twee dagen in het jaar op den Middag *rechtlynig* ſtaat, welke ſtreek lands, tusſchen beide de *Keerkringen* gelegen, men om die reden de *verzengde luchtſtreek* noemt, uit hoofde van de hitte, welke aldaar

daar doorgaands, en vooral op dien dag, dat de *Zon* door het *Zenith* gaat, heerscht; derzelver bewooners noemt men *Schaduwloozen* (Ascii), omdat zy op den Middag van dien dag, dat de *Zon* in hun *Zenith* ſtaat, geen ſchaduw geeven, of ook wel *Tweezyds ſchaduwgevenden* (Amphiscii), omdat derzelver middagſchaduw zich dan eens naar het *Noorden*, en dan weder naar het *Zuiden* ſtrekt.

100. Op $23\frac{1}{2}^{\circ}$ afſtand van beide de Poolen der Aarde, ziet men op de Aard-Globe ook eenen Cirkel, paralel aan den Equator getrokken, welken men de *Poolcirkel* noemt: deze bepaalt de landen, welker langſte Dag langer is dan 24 uuren; de landen tuſſchen dezen Cirkel en de Pool in gelegen, zegt men onder de *bevroozen luchtſtreek* te zyn, wyl aldaar een eeuwigduurend ys gevonden wordt, en hunne bewooners worden genoemd *Rondom ſchaduwgevenden* (Periscii), alzoo hunne ſchaduw geduurende den Dag zich naar alle ſtreeken des Hemels uitſtrekt. — De Luchtſtreek tuſſchen de *Poolcirkels* en *Keerkringen*, noemt men de *Gemaatigde Luchtſtreek*, en hunne bewooners *Eenzyds ſchaduwgevenden* (Heteroscii), wyl derzelver ſchaduw altoos van het *Weſten* door het *Noorden* naar het *Oosten* gaat.

101. Tot het vlak van den *Equator* is men gewoon, in de Sterrekunde, den ſtand der *vaste Sterren* over te brengen, waarom wy haar Sterrekundig gebruik in dezen wat nader moeten beſchryven, het geen ons tevens nog eenen anderen Cirkel zal doen kennen, welke mede van veel gebruik in de Sterrekunde is; dan vooraf moeten

wy nog aanmerken, dat, gelyk de *Poolen des Equators* dezelvden zyn met de *Poolen der Aarde*, welken dus eigentlyk tot de Aardryksknnde behooren, zoo ook de Poolen des Equators tot de Sterrekunde behooren, en men dezelven aan den Sterrenhemel moet weeten te onderſcheiden; wy hebben § 6. gezegd, dat de *Poolen* eens Cirkels de uiteinden zyn van derzelver *As*, die gelyk is aan den *diameter* des Cirkels, dan wanneer wy den Cirkel als een vlak beſchouwen, welks *diameter* eene onbepaalde uitgeſtrektheid heeft, zoo wordt ook de *As* diens Cirkels onbepaald van groote; de *As* van het *vlak des Equators*, dus in de onbepaalde ruimte des Sterrenhemels verlengt, wyst ons de plaats van deszelvs *Poolen* aan, en het is in dien zin, dat men de uiterſte Ster van den *ſtaart van den kleinen Beer*, omdat zy de naatſte Ster by de *Noord-Pool*, dat is het uiterſte punt van dien verlengden As des Equators, is, en het kennelykst teken is, om denzelven te vinden, de *Poolſter* noemt.

102. Men moet *twee* afmeetingen hebben, om de plaats van een zeker ſtip der kloot te bepaalen, maar deze zyn ook genoegzaam om door de-



maat is van den hoek MIN zal de tot den *Equator overgebragte plaats der Ster* O zyn, en het is deze boog, welke men de *Ascentio recta* der Ster O noemt; dan daar die Ster O ook in elk ander punt van den ½ Cirkel INL zou kunnen ſtaan, moet men nog eene *tweede* afmeeting hebben om deszelvs juiſte ſtand te beſtemmen, dat is, men moet de grootheid van den boog NO, welke de afſtand der Ster van den *Equator* is, kennen, en het is deze boog NO, gemeeten op den ½ Cirkel INL, dien men de DECLINATIE der Ster O heet: deze *Declinatie* der Sterren is *Noordelyk* als de Ster O benoorden, en *Zuidelyk* als de Ster bezuiden den *Equator* gelegen is.

103. Dan welke is nu de halve Cirkel IML, welke het begin der telling van de *Ascentio recta* der Sterren bepaalt? deze is niet anders dan dat gedeelte van de *Coulure der Nacht-eveningen*, het welk door het 1e. punt van *Aries* gaat; alle de Sterren onder dezelve gelegen hebben dus 0° *Ascentio recta*, en men begint derhalve de *Ascentio recta* op den *Equator*, zoo wel van dit 1e. punt van ♈ te tellen, als de *Lengte op de Ecliptica*. Den halven Cirkel INL noemt men DECLINATIE-CIRKEL; men treft denzelven ook op onze nieuwe Globe aan; de kopere halve Cirkel OPQ Pl. VIII. beweegbaar om de beide Poolen des *Equators*, is zoodanig een *Declinatie-cirkel* in graaden verdeeld, welken men dus op elken graad des *Equators* kan ſtellen, en alzoo de plaats van elke Ster bepaalen; elk punt des Hemels, door middel van den *Equator* en den *Declinatie-cirkel*

rondom deze Globe kunnende bepaalen, kunnen wy ons dezelve als door een *Hemel-Globe* omringd zeer gevoeglijk verbeelden.

104. Na het boven gezegde omtrent de *Declinatie* der Sterren, zyn wy ook beter in ſtaat te bepaalen wat men door de *Declinatie der Zon* verſtaat; laat Fig. 23. MZR de *Ecliptica* en S de Zon zyn, dan is de boog SN de *Declinatie der Zon*, MN de *Aſcentio recta*, en MS de lengte der Zon; de *Declinatie* der Zon neemt zigtbaar toe, dat is de boog NS wordt grooter, naarmate de Zon *zich* meer van het punt M verwydert; hy is het grootſte in Z, alwaar de *Ecliptica* en *Equator* het verſt van elkander afſtaan; vervolgends neemt dezelve weder af, en wordt *nul* in R §97. — Nog moeten wy in deze figuur doen opmerken, dat de boog MN niet gelyk is aan den boog MS, dan alleen ingeval dezelve 90° is, en dat dus de afſtand der Zon op den *Equator* gemeten, van het naatſte Nacht-eveningspunt, niet gelyk is aan dienzelvden afſtand op de *Ecliptica* gemeten, dan in de beide *Zonneſtanden*, wanneer de beide boogen MT des *Equators* en MT der *Ecliptica* beide = 90° zyn.

reeds leeren kennen, § 82. en het ſpreekt dus van zelve dat men de plaats der Sterren ook door middel der *Lengte en Breedte* op dezelve kan bepaalen; hetzelvde dus dat men *Lengte* noemt, op de *Ecliptica* geteld, noemt men *Ascentio recta*, op den *Equator* geteld, en 't geen men *Breedte* noemt op eenen op de *Ecliptica* rechthoekig ſtaanden Cirkel, noemt men *Declinatie* op eenen op den *Equator* rechthoekig ſtaanden Cirkel; de *Zon*, die in het vlak der *Ecliptica* ſtaat § 70. heeft dus wel *Ascentio recta* en *Declinatie*, maar geen *Breedte*.

Van den Horiſon.

106. Na dus alle de Cirkels, welken deze nieuwe Globe omringen, en, niet met dezelve ronddraajende, eigentlyk tot de *Hemel-Spheer* behooren, beſchreven te hebben, gaan wy over van die te ſpreeken, die met dezelve ronddraajen en meer bijzonder tot onze *Aarde* betrekking hebben. —

Wanneer wy ons op het open veld bevinden, waar niets ons oog belemmert, zien wy dat op eenen verren afſtand van ons de Lucht en Aarde elkander ſchynen te naderen, en, in een zeker punt zich als 't waare vereenigende, ons alle verder zien belet; keeren wy ons rechts of links wy ontdekken een oneindig aantal zulke punten, en ontwaaren weldra dat dezelven alle te zaamen als 't waare een Cirkel rondom ons vormen, die de eindpaal van ons gezicht is. — Dezen Cirkel

noemt men den HORISON, *Gezichteinder*; is het in den vroegen morgenſtond, dan zien wy de Zon als met Majeſteit in dezen Cirkel uit de hemelen reizen, aan dienzelvden oord, waar wy weinige uuren te vooren nog nieuwe Sterren voor ons oog zagen *opgaan*, gelyk wy 'er, kort voor Zonnen opgang, anderen aan de tegenovergeſtelde zyde des Hemels zagen ondergaan. Laat ABCD Fig. 25. onze Aarde verbeelden, A een zekere plaats op derzelver oppervlakte, dan zal de lyn EAF het *vlak van den Horiſon* voor de plaats A zyn; zoo lang de waarneemer zich in A bevind, blyft dit vlak zyn Horiſon, maar begeevt deze zich van A naar G, dan is niet meer het vlak EAF het *vlak van zynen Horiſon*, maar het vlak HGI; elk punt der oppervlakte heeft dus zynen byzonderen *Horiſon*, en het *vlak van den Horiſon* bepaalt zich derhalve naar de gelegenheid van de plaats des waarneemers op de oppervlakte der Aarde.

107. Men onderſcheid tweederlei *Horiſon*, eene *Natuurlyke* en eene *Artificieele*, de *Natuurlyke* is die welke wy zoo even beſchreven hebben; door de *Artificieele* verſtaat men een vlak LKM Fig.

zy *Horiſon is*, en deze eigenſchap is het, welke ons de betrekkelyke ſtand van den Horiſon van eene zekere plaats leert kennen; APMRpL Fig. 26. zy de omtrek der Aarde, Pp de As der Aarde, A eene zekere plaats op derzelver oppervlakte gelegen, waarvan LM de *Artificieele Horiſon* is, dan zeggen wy ſtaat deze rechthoekig op de ½ middenlyn AK, die door de plaats A der Aarde gaat, omdat de afſtand van de plaats A tot den *Horiſon* overal 90° moet zyn; immers wanneer LM de *Artificieele Horiſon* is, dan is EAF de *Natuurlyke Horiſon* van die zelvde plaats; de lyn KA, tot in Z verlengd zynde, wyst ons het Toppunt (*Zenith*) aan, en dit ſtaat noodwendig even verre van den Horiſon EAF, maar LKM is paralel aan EAF, en het punt Z ſtaat dus ook overal even verre van den *Artificieelen Horiſon* LKM; nu is AZ de verlengde van KA, en derhalve is A, dat is de plaats des waarneemers, ook overal even verre van den *Artificieelen Horiſon* LKM; de de plaats A is dus de Pool des *Artificieelen Horiſons*, § 22. en daar de hoek AKP, welken de ½ middenlyn AK met den As PK der Aarde maakt, gelyk is aan den boog AP, welke de afſtand van de plaats A van de *Pool der Aarde* is, zoo volgt daaruit dat de afſtand van het *Zenith* (of de Pool van den Horiſon), en de *Pool der Aarde* gelijk is aan den afſtand van de plaats A der Aarde zelve, tot de Pool, en dus de afſtand van de Pool der Aarde P tot den Horiſon M gelyk aan de *Breedte der Plaats*, welke men daarom ook wel deszelfs *Poolshoogte* noemt, § 96. Wanneer

nu

nu ÆKR de *Equator* is, zoo zien wy dat daar AL = 90 = AM is en PÆ ook = 90° is, dat PM = ÆA en LÆ = AP moet zyn, § 35. 2e. gevolg, en dat dus de hoogte LÆ des *Equators* boven den Horiſon gelyk is aan het *Compliment der Poolshoogte.*

109. Men is gewoon in de Sterrekunde alle de Hemelſche bewegingen tot het *middenpunt* der *Aarde* overtebrengen, ten einde dezelven regelmatig zouden ſchynen, en de verſchillende uitwerking, welke de verſchillende punten van de oppervlakte der Aarde op derzelver ſtand te weeg brengt, geen invloed op onze bereekening zoude hebben, en daarom gebruikt men ook altoos den *Artificieelen* en *nimmer* den *Natuurlyken Horiſon*, en het is nu nog onze taak aantetoonen, welk verſchil hierdoor in de oplosſing der verſchillende *problemata* geboren wordt, ten einde hierdoor gelegendheid te hebben om van het *verſchilzigt* of de *Parallaxis* te ſpreeken.

110. Laat ABCD Fig. 24. de *Aarde* verbeelden, A eene zekere plaats op dezelve, waarvan PAH de *Natuurlyke* en ETF de *Artificieele Horiſon* is; laat S een zekere Ster zyn, welke van

Aarde gezien (of dat op 't zelvde uitkomt van den *Artificieelen Horiſon* gezien) is het, 't welk men de *Horiſontale Parallaxis* of *het Horiſontale verſchilzigt* noemt; hetzelve is voor de *Maan*, die het naaste by onze *Aarde* ſtaat, in haaren naasten ſtand 60′ 22″ en in haaren verſten ſtand 54′ 5′, voor de *Zon* werdt hetzelve by de laatſte voorbygang van *Venus* over dezelve van ruim 8″ gevonden, doch voor de *vaste Sterren* is hetzelve oneindig klein, en komt dus in geen aanmerking, waarom men ook zeer wel zich zonder eenigen hinder van den *Artificieelen Horiſon* kan bedienen, en dat vooral als men van de *Horiſontaale Parallaxis* rekening houdt voor die Hemel Ligchaamen, waarop dezelve eenigen invloed van belang heeft.

III. De *Horizontaale* Parallaxis is de grootſte van allen; want wanneer de Ster S boven den Horiſon klimt, zoo dat zy in S^2 te ſtaan komt, dan wordt het *verſchilzigt* kleinder; van de oppervlakte der Aarde, wordt de Ster dan aan den Sterrenhemel by K en uit het centrum T der Aarde by L gezien; de hoek L S K is kleinder dan de hoek I S H; nog hooger klimmende en in S^3 te ſtaan komende, wordt deze hoek nog kleinder, want de hoek OS^3M is weder kleinder dan de hoek LS^2K, en in het *Zenith* verdwynt het *verſchilzigt* geheel, wyl de Ster in den ſtand S^4 uit het *centrum* T der Aarde en van derzelver oppervlakte beiden langs de lyn T Λ Z gezien wordt; deze *Parallaxis*, dat is die welke boven de Horiſon plaats heeft, of de hoeken LS^2K en OS^3M, noemt men de *Parallaxis van hoogte*, welke altoos

in

in de omgekeerde rede van de hoogte der Ster boven den *Horiſon* ſtaat.

112. De HORISON der nieuwe Aard-Globe is een Cirkel VSW Pl. VIII. welke de Globe omringt, en met dezelve ronddraait; hy is beweegbaar op twee ſpilletjes, die aan eenen anderen Cirkel, waarvan wy hierna § 130. ſpreken zullen, vastgeklonken zyn: door middel van deze beweging kan denzelven zyne bepaalde helling gegeeven worden, en op alle *Breedten* of *Poolshoogten* geſteld worden; deze Cirkel is verdeeld in de *tweeëndertig ſtreeken van het Compas*, om de ſtreek des winds aantewyzen, in welke eenig Hemellicht opgaat, of ook wel de ſtreek van 't Compas aantewyzen, boven welke hetzelve *verticaal* ſtaat; behalve deze verdeeling heeft dezelve nog eene andere in 360°, geſchikt om het *Azimuth* van eenige Ster te kunnen vinden.

113. Het *Azimuth* noemt men de boog van den *Horiſon*, welke 'er tuſſchen het *Noorden* of *Zuiden*, en de plaats des *Horiſons* in gelegen is, alwaar eene Ster *op-* of *ondergaat*; eene Ster dus b. v. wier *Azimuth* by derzelver opgang 80° van het *Noorden* af is, komt 10° Noordwaards van het

[redacted]

van eene ſchroef voorzien is, in het Toppunt van den Horiſon vastgeſchroefd te worden; wanneer Fig. 23. MNR de *Horiſon* is, en I het Toppunt, dan is de Quartcirkel ION de *Verticaal*, welke over de Ster O gelegd zynde, ons de *hoogte der Ster* NO boven den Horiſon en deszelfs *Azimuth* MN aanwyst; de *Verticaal* van de nieuwe Aard-Globe bevat 18° meer als een' Quartcirkel, omdat men 18° beneden den *Horiſon* door denzelven kunnende meeten, het *begin* en *einde* der morgen en avond *ſchemering* zou kunnen bepaalen.

115. De *Verticaal* is dus geſchikt om ons de hoogte van een Hemellicht te doen meeten; op deze hoogte is het, gelyk wy § 111. zagen, dat het *Verſchilzigt* invloed heeft; het *Verſchilzigt* doet het Hemellicht *laager* ſchynen als hetzelven van den *Artificieelen Horiſon* gemeeten, zou zyn; dan 'er is nog een ander verſchynſel, hetwelk de hoogte der Sterren boven den Horiſon ook aandoet, en het geen men daarom almede moet kennen: het is de *Dampheffing* of *Refractie*.

116. Wanneer een lichtſtraal van eene ylder in eene digtere vloeiſtof overgaat, wordt dezelve gebroken, en komt niet in eene regte maar in eene gebogen lyn tot ons oog; deze ſtraalbuiging is oorzaak dat, het licht der Zon en der Sterren door den dampkring onzer Aarde doorgaande, die lichtſtraal gebroken wordt, en onder een' zekeren hoek tot ons komt, waardoor wy de Sterren hooger ſchynen te zien als dezelven werkelyk zyn. — Laat Fig. 27. ABCD wederom de Aarde zyn, omringd

van

van derzelver dampkring EFG; B eene zekere plaats der Aarde, en OBI de *Horiſon* van die plaats, dan zal het licht, dat van de Ster H tot de plaats B komt, niet regtlynig door den dampkring doorgelaaten worden, maar in a eene breeking ondergaan, waardoor die Ster in de richting BaI zal ſchynen te ſtaan, en dezelve dus in den *Horiſon* OBI zal gezien worden, ſchoon zy nog onder den *Horiſon* is; daar nu de hoek IaH van ſtraalbreeking grooter is naarmate de lichtſtraalen ſchuinder op de digtere vloeiſtof vallen, zoo volgt hieruit dat de *ſtraalbreking* of *dampheffing* in den *Horiſon* het grootſte is; de lichtſtraal, die van de Ster K, eene zekere hoogte boven den *Horiſon* hebbende, tot ons komt, ondergaat ook wel eene breeking in b, doch dezelve is zoo groot niet; die Ster wordt dus ook niet in de lyn BbK maar in de lyn BbL, van de Aarde gezien, doch dit verſchil is zoo groot niet; noch kleinder is dit verſchil voor de Ster M, en voor de Ster Z, in het *Zenith* ſtaande, verdwynt hetzelve geheel; de *Straalbuiging* is dus het grootſte in den *Horiſon*, en wordt o in het *Zenith*, even als de *Parallaxis*; maar het verſchil tuſſchen deze beiden is, dat

[redacted]

Van den Meridiaan.

117. De MERIDIAAN behoort, eigentlyk gezegd, mede tot de *Aard-Globe*, dan hy heeft zoo wel een *Aardrykskundig* als Sterrekundig gebruik: in de Aardrykskunde is de Meridiaan een *Cirkel*, en het is het vlak van dien zelvden Cirkel, dat in de Sterrekunde gebruikt, en wel gekend behoort te worden.

118. De *Meridiaan* in de Aardrykskunde is eigentlyk een $\frac{1}{2}$ Cirkel, welke van de eene Pool tot de andere, en dus rechthoekig op den Equator § 24. op elk punt van de Globe kan getrokken worden; doorgaands vindt men op de Aard-Globen verſcheiden van dezelve, afgetekend; op deze nieuwe Aard-Globe zyn dezelven van 5 tot 5 graaden getrokken; hy dient om door middel van denzelven de ligging van de onderſcheiden plaatſen des Aardbodems te bepaalen, en men noemt *Meridiaan* van eene zekere plaats zoodanig een' $\frac{1}{2}$ Cirkel, welke, van de eene *Pool* tot de andere getrokken, over deze plaats heen gaat; elke ſlip van de Globe heeft dus zyn' *Meridiaan*, en het getal der Meridiaanen is derhalven onbepaald; laat Fig. 12. NRZÆN de omtrek der *Aarde* verbeelden, N de *Noord* en Z de *Zuidpool*, dan zyn alle de $\frac{1}{2}$ Cirkels NaZ, NbZ, NcZ, enz. *Meridiaanen*; eene zekere plaats, Y by voorbeeld, waardoor de $\frac{1}{2}$ Cirkel NbZ gaat, heeft die $\frac{1}{2}$ Cirkel tot *Meridiaan*, de boog Æb van den Equator noemt men de *Lengte* der plaats Y, en

de Meridiaan dient dus om de *Lengte* eener plaats op den Equatòr te bepaalen.

119. Men behoort dus een' dezer Meridiaanen vóór den *eerſten Meridiaan* aanteneemen, om van denzelven de telling der *Lengte* te beginnen; in de 12e. Fig. onderſtellen wy den ½ Cirkel NÆZ de *eerſte Meridiaan* te zyn, dan *over welke plaats* dezen eerſten Meridiaan te trekken, hierin verſchillen de Aardrykskundigen zeer: *Ptolomeus* deed zyn eerſten Meridiaan over 't Eiland *Juno* gaan; *Mercator* over *del Corro*, een der *Flandriſche* Eilanden; *Hondius* trok denzelven over 't Spaanſche Eiland *St. Jago*, een der *Caap-Verdiſche* Eilanden; *Ricciolus* over de weſtelyke kust van 't Eiland *Palma*; de *Hollanders* zyn gewoon hunnen eerſten Meridiaan over den *berg Pico*, op het Eiland *Teneriffe*, doorgaands de *Pic van Teneriffe* genaamd, te trekken; de *Franſchen* daarentegen trekken denzelven over het Eiland *Ferro*, mede een der *Canariſche* Eilanden; of liever over een punt des Aardbodems, 't welk juist 20° ten weſten van 't *Obſervatorium van Parys* gelegen is, 't welk nog 30' weſtelyker van *Parys* gelegen is, dan het Eiland *Ferro*; de *Engelſchen* laaten hunnen eerſten Meridiaan meestal over *London* of *Greenwich* gaan; zomtyds trekken de *Franſchen* ook den hunne over het *Obſervatorium van Parys* zelve; men ziet hieruit hoe zeer verſchillende het is, welken Meridiaan men voor den *eerſten* aanneemt, en 'er is ook indedaad niets in de natuur 't welk een vast punt kan geeven, ſchoon het anders te wenſchen waare dat men hieromtrent eene alge-

mee-

meene overeenkomst tusschen de Aardrykskundigen vondt. Op onze nieuwe Aard-Globe is de *eerste Meridiaan* getrokken, 30' westwaards van 't Eiland Ferro, zoodat *Parys* net op 20° Lengte gelegen is, dan, welken men ook als *eersten Meridiaan* aanneemt, men begint altoos het 1e. punt van telling van dien Meridiaan, welken men zich voor de *eerste* verkiest; en den boog des Equators in graaden uitgedrukt, welke tusschen dezelven en den Meridiaan eener plaats in gelegen is, noemt men, gelyk wy boven zeiden, *de Lengte dier plaats*: dus legt *Weenen* op 34° 3' *Lengte* — *Praag* op 32° 5' — *Copenhague* op 30° 15' 30" — *Caïro* op 49° 10' — *Batavia* op 124° 33' 46" — *Peking* op 134° 7' 30"; zomtyds telt men ook de Lengte van den 1e. Meridiaan *Oost-* en *Westwaards*; in dat geval ontmoeten de beide tellingen elkander op de 180°, en men zegt dan, die of die plaats is zoo veele graaden *Oost-* of *Westwaards* van deze gelegen; dit doet men meestal dan wanneer men zyn' eersten Meridiaan over eene zekere stad doet gaan: zoo is *Greenwich* 2° 20' 15" *Westelyk* van *Parys* gelegen — *Frankfort* ligt, volgends dezelve telling, 6° 15' 45" *Oostwaards* van *Parys*, enz. Zomtyds is men ook gewoon de Lengte eener plaats in *Uuren*, in plaats van in *graaden*, uittedrukken: de reden hiervan zal ons in 't gebruik der Globe nader blyken.

120. Alle plaatsen, welken *eenen* Meridiaan hebben, of die onder *denzelvden Meridiaan* gelegen zyn, hebben ook dezelve *Lengte*, en tegelyk *Middag*, 't geen het woord *Meridiaan*, dat *Mid-*

daglyn betekent, zelf uitdrukt; en men moet derhalve, om de verſchillende ligging dier plaatſen, welken dezelve Lengte hebben, nader te bepaalen, even als in de Sterrekunde, zich nog van eene andere afmeeting bedienen; ten dien einde trekt men door de plaats Y Fig. 12. een' anderen Cirkel 3, Y, 7,14 *paralel* aan den *Equator:* de afſtand van dezen Cirkel van den *Equator* of den boog bY des *Meridiaans*, bepaalt de *Breedte* der plaats, welke *Noordelyk* is als de plaats benoorden den *Equator*, en *Zuidelyk* als de plaats bezuiden den *Equator* gelegen is; men bepaalt dus de ligging der plaatſen op den Aardbodem door *Lengte* en *Breedte*; hetzelve dat *Ascenſio recta* in de Sterrekunde is, is *Lengte* in de Aardrykskunde; en hetzelve dat *Declinatie* in de Sterrekunde is, is *Breedte* in de Aardrykskunde. Even gelyk alle plaatſen, die onder denzelven *Meridiaan* gelegen zyn, dezelvde *Lengte* hebben, zoo hebben ook alle plaatſen, die op dezelvde *Paralel* gelegen zyn, dezelvde *Breedte*; en de *langſte* en *kortſte* Dag des Jaars is voor plaatſen, onder dezelvde Paralel gelegen, altoos van dezelvde lengte; by voorb: *Kiel* in *Neder-Saxe*, legt op 28° 0'



Lengte verſchilt 13° 38′ 15″; want *Falmouth* ligt op 12° 37′ 30″, en *Frankfort* op 26° 15′ 45″.

121. Van het *vlak* nu van dezen Cirkel, welken wy als de *Meridiaan* in de Aardrykskunde hebben leeren kennen, is het, van hetwelk men ſpreekt als men den *Meridiaan noemt in de Sterrekunde*; de *Meridiaan*, *in eenen Sterrekundigen zin*, is niet anders dan het vlak eens grooten Cirkels van de Spheer, die rechthoekig op den *Equator* en te gelyk ook rechthoekig op den *Horiſon* ſtaat, welke de Aarde in twee gelyke deelen deelt, en met dezelve in 24 uuren moet begrepen worden rond te draajen, en alle punten des Hemels beurteling te ſnyden.

122. Laat ERGÆ Fig. 9. de *Horiſon* zyn, dan is de Cirkel EZG de *Meridiaan*, het punt E is het *Noorden*, N de *Noordpool* voor onze Noordelyke Gewesten, Z *het Zenith* en G het *Zuiden*; des de *Meridiaan* van het *Zuidpunt* des *Horiſons* recht opklimt tot in ons *Zenith*, en vervolgends door de *Pool* gaat, om in het *Noordelykſte* punt des *Horiſons*, dezelve weder te ontmoeten, waaruit wy dus beſluiten, dat even gelyk in de Aardrykskunde de *Meridiaan* maar ½ Cirkel is, in de Sterrekunde dezelve ook maar een ½ Cirkel is, doch wiens begin en einde eenigzins anders bepaald wordt; te weeten in de Aardrykskunde begint de *Meridiaan* aan de eene, en eindigt aan de andere *Pool*, en de andere helft deszelvden Cirkels, is *Meridiaan* van eene plaats, welke 180° met de eerſte in Lengte verſchilt, doch in de Sterrekunde begint de Meri-

diaan aan den *Horiſon*, en eindigt aan de tegenoverſtaande zyde van denzelfden *Horiſon*, waarom men dus in de Sterrekunde, van den *Meridiaan* ſpreekende, daardoor verſtaat, dat gedeelte van het vlak des Meridaans dat *boven onzen Horiſon verheven is*. Het gedeelte NE, dat, in een' Aardrykskundigen zin, een gedeelte is van den *Meridiaan*, die 180° in lengte verſchilt met de plaats, waarvan wy thands ſpreeken, behoort, in een' Sterrekundigen zin tot den *Meridiaan* van de plaats zelve, daar het gedeelte des Meridiaans, 't welk onder den *Horiſon* is, in de Sterrekunde niet in aanmerking komt. De Meridiaan gaat door het *Zenith* der plaats, waarvan hy *Meridiaan* is, en dus door de Pool des *Horiſons*, § 108. en ſtaat derhalve *rechthoekig* op dezelve; hy gaat ook door de *Pool* N des *Equators*, en ſtaat dus mede *rechthoekig* op deze § 24.

123. Wy zeiden zoo even dat het vlak van den *Meridiaan* de Aarde in twee gelyke deelen deelt, en, met dezelve zich in 24 uuren ronddraajende, alle punten des Hemels beurtelings ſnyd; laat AßCD Fig. 28. de *Equator* der Aarde, P de *Noordpool* en G eene zekere plaate zyn, die



Middag te G zy, als de Ster E in den *Meridiaan* is, dan zal wanneer 2 uuren verloopen zyn, en de plaats G. dus op haare paralel tot in a gevorderd is, dat vlak van den Meridiaan der plaats G. de richting FPM verkregen hebben, en eene andere Ster F zal alsdan in den *Meridiaan* van G gezegd worden te zyn; nog 2 uuren verloopen zynde, zal het vlak van dienzelvden Meridiaan de richting GPN verkregen hebben, en de Ster G zal dus ten 4 uuren door den *Meridiaan* gaan; zoo voortgaande zal ten 6 uuren de Ster H — ten 8 uuren de Ster I — ten 10 uuren de Ster K. — ten 12 uuren Middern: de Ster L — ten 2 uuren 's Morgens, de Ster M — ten 4 uuren de Ster N — ten 6 uuren de Ster O — ten 8 uuren de Ster P — ten 10 uuren de Ster Q, en ten 12 uuren des Middags van den volgenden dag weder de Ster E in den Meridiaan zyn.

124. Uit de beschouwing van deze figuur ziet men, dat de richting van het vlak van den *Meridiaan* tweemaal hetzelvde is in den tyd van 24 uuren; want de richting EPL duid ons zoo wel den stand van het vlak des *Meridiaans* aan voor 12 uuren des *Middags*, als voor 12 uuren des *Middernachts*; zoo is ook de lyn FPM de richting van het vlak des Meridiaans, zoo wel voor 2 uuren na den middag, als voor 2 uuren na middernacht, en hieruit zou men misschien besluiten, dat de Sterren tweemaal in de 24 uuren in den Meridiaan komen, 't geen egter zoo niet is.

125. Ten einde deze zwarigheid weg te neemen, merken wy aan 1e. dat wy § 118. gezegd heb-

rykskunde
s volgt dat
éne zyde
uit verder
vlak EPL,
den *Me-*
het vlak
24 uuren

in de § 122.
gevallen gebeu-
lans, dat boven
mal in de 24 uuren
ten: wanneer de af-
die boven den *Horiſon*
n de boog NE Fig. 9.
Meridiaan behoort, § 122,
door de ſchynbaare bewe-
paralel fed, welke de *Me-*
als in f ſnyd: de Ster dus
gegaan zynde, komt naar
den *Meridiaan* in d, en der-
24 uuren, met dit onder-
zy in f haare *grootſte*

tot het punt G des *Horiſons*, 't welk het Zuiden is, te ſpreeken.

126. Na dit alles zal het niet ongemakkelyk zyn te vatten, welken Cirkel wy voor den *Meridiaan* tot het Sterrekundig gebruik op onze nieuwe Globe bezigen: het is een koperen Cirkel RST, Pl. VIII. welke om de beide *Poolen* der Globe beweegbaar is, om op elke plaats der Aarde geſteld te kunnen worden, die in graaden verdeeld is, en op 90° afſtand ten *Westen* en *Oosten*, van welke de Horiſon op twee ſpilletjes, die aan een' anderen Cirkel, van welken wy § 130. zullen ſpreeken, vastgemaakt zyn, draaid. — De verdeeling der graaden op dezen Cirkel is zoodanig geſchikt, dat de graaden op denzelven aan den eenen kant der *Pool* van de Pool af met 10, 20, enz. beginnen te tellen, terwyl aan de andere zyde der *Pool* dezelven terugwaards gaan, zoo dat de graaden aldaar van den *Equator* aftellen; deze laatſte zyde des *Meridiaans* moet men ſtellen op de plaats van dewelke men begeert dat hy *Meridiaan* zyn zal, wanneer het getal graaden, dat de plaats zelve aanwyst, de *Breedte* der plaats is, op welken graad, (aan den anderen kant van dezen zelvden Cirkel) van de Pool afgeteld, men het *Noordpunt* des *Horiſons* moet ſtellen, om denzelven voor eene gegeeven plaats overeenkomſtig te doen zyn.

127. Deze *Meridiaan* aldus over eene zekere plaats geſteld zynde, is die ½ Cirkel van denzelven, *Meridiaan* van die plaats, welke van de eene *Pool* over de *Plaats* zelve tot de andere *Pool* gaat;

en wanneer men van dien *Meridiaan* ten opzigte des *Horiſons* ſpreekt, dan is dat gedeelte van dezen zelvden Cirkel de *Meridiaan*, 't welk van het *Noordpunt* van den Horiſon af begint, door de *Pool* die boven den Horiſon verheven is, en door het *Zenith*, dat is de *plaats zelve*, heen gaat, en in het *Zuiderpunt* des Horiſons eindigt, § 122, 124.

128. Laat NTZVN Fig. 29. deze *Meridiaan* der Globe zyn; ABCD de *Horiſon* van eene zekere plaats T, dan is de ½ Cirkel NTZ de *Meridiaan* der plaats T, in een' *Aardrykskundigen zin*, en de ½ Cirkel ATC de *Meridiaan* der plaats T, in een' *Sterrekundigen zin*, dan de Cirkel ABCD welke de *Horiſon* is, van de plaats T, is ook te gelyk de *Horiſon* van de plaats V, welke op 180° van de plaats T gelegen is, en de ½ Cirkel AVZC, welke onder den *Horiſon* ligt, is de *Meridiaan* van de plaats V, waaruit volgt, dat twee plaatſen, welken, op den *Meridiaan* getald, 180° graaden van elkander gelegen zyn, denzelvden *Horiſon* hebben, en dat haare *Meridiaanen* in het *zelvde vlak* gelegen zyn; de plaats V noemt men de *Tegenvoeter*, *Antipode* van de plaats T, gelyk omge-



voor T het *Oosten* is, voor V het *Westen*, en omgekeerd, zoo dat het *Oost-* en *Westpunt* des Hemels betrekkelyk zyn tot de plaats, van dewelke men spreekt.

Van den Uurcirkel.

129. De *Uurcirkel*, welken men nodig heeft om, door middel van denzelven, de Uuren van den *Zons Op-* en *Ondergang*, of van den *Op-* en *Ondergang* van eenig ander Hemellicht te kunnen vinden, en andere Problema's op de Globen optelosfen, was men gewoon te plaatsen boven op den grooten koperen Cirkel, wanneer men op denzelven, door middel van een' wyzer aan de *Pool*, op dezen Cirkel de Uuren deed aanwyzen; de Hr. ADAMS, te *Londen*, verwierp, by zyne verbetering van de Constructie der Globen, dezen Cirkel, en gebruikte tot *Uurcirkel* den *Equator* der Globe zelven; en inderdaad 'er is zeer veel dat voor deze inrichting pleit: de *Equator* omringt de geheele Globe; hy is dus de *grootste* Cirkel, welken men op dezelve trekken kan, en men geeft dus, door dezen tot *Uurcirkel* te gebruiken, de meest mogelyke grootte aan denzelven, waardoor dan ook de *Uuren* zelven veel grooter tusschenspatie bekomen, en men gemakkelyk op eene Globe van 12 duim diam. van 5′ tot 5′ onderscheiden kan; wy hebben dit gebruik van den *Equator* tot *Uurcirkel* in deze nieuwe Constructie gevolgd, doch egter met dit onderscheid, dat wy niet den *Equator der Globe zelven* daartoe bezigen, maar de Globe hebben doen omringen door een' koperen Cirkel XYZ,

Pl.

Pl. VIII. welke aan den *Meridiaan*, op de hoogte des *Equators* is vastgemaakt, en, met den *Meridiaan* en *Horiſon* verbonden zynde, om de Poolen der Globe ronddraait, en tevens met de Globe zelve zich rond beweegt; deze Cirkel, dus in 24 uuren, en vervolgends elk uur in minuten, verdeeld, verſtrekt dus ten *Uurcirkel* aan deze Globe; het gemak van dezen Uurcirkel zal nader blyken, wanneer wy in het III Boek het gebruik der Globe zullen verklaaren.

130. Deze geheele toeſtel van Cirkels, welke onze nieuwe Aard-Globe omringt, en met dezelve ronddraait, wordt in de 30 Fig. afgebeeld: ANTQCZVÆA is de *Meridiaan*; ABCD de *Horiſon* van eene zekere plaats T; ÆBQD de *Uurcirkel*, op welken de *Horiſon*, op twee ſpilletjens in de punten B en D geplaatst, beweegbaar is; N de *Noordpool*; Z de *Zuidpool*; T het *Toppunt* of *Zenith*, en V het *Voetpunt* of *Nadir*; de *Meridiaan* is in deze Fig. van 10 tot 10 graaden afgedeeld, en genommerd, zoo als wy § 126. beſchreven hebben, waarom men deze Fig. beziende, en gemelde § nog eens herlezende alles (zoo wy oordeelen) beter bevatten zal.

vraag met eene andere vraag beantwoordende, zullen wy ſpoedig ontdekken, wat wy voor onzen *Uurwyzer* op deze nieuwe Globe te houden hebben; *welke is*, afgeſcheiden van alle Horologies of Uurwerken, *onze algemeene Uurwyzer, waarnaar wy onze Uuren gewoon zyn te regelen?* —— Deze is immers de ZON. — Zoo is dan op deze Globe, op welke alle de *Voorſtellen* overeenkomſtig met den aart der zaak moeten opgelost worden, ook de *Artificieele Zon* de *Uurwyzer*; hoedanig zy dit is, en wat daaromtrent is aantemerken, behoort tot het volgende Boek.

132. Laat ons nu, ten beſluite van dit *Hoofdſtuk*, alles, wat wy in hetzelve als *eigentlyke gezegde Beſchryving der Globe* gezegd hebben, met weinige woorden herhaalen en te zamen vatten: de breede Cirkel ABC, Pl. VIII. is de *Ecliptica*, welke behalve zyne verdeeling in *Tekens* en graaden, en eene andere in *Maanden* en *Dagen* nog eene afzonderlyke verdeeling voor de beweging der Maan § 75. bevat. — DBE is de *Equator* des Hemels in 360° afgedeeld, en de *Ecliptica* in beide de *Nachts-eveningspunten* ſnydende. — FGHKIF en LMN zyn beide *Breedte-Cirkels*, waarvan de Cirkel LMN beweegbaar is om de Poolen L en M der *Ecliptica* — de ½ Cirkel OPQ is een *Declinatie-Cirkel*, mede beweegbaar, doch om de *Poolen* F en K des *Equators* of *der Aarde* — RST een beweegbaare *Meridiaan* — VSW de *Horiſon* — en XYZ de *Uurcirkel* — waarby men nog voegen kan den losſen ¼ Cirkel, welke men de *Verticaal* gemeenlyk noemt.

II. HOOFDSTUK.

ALGEMEENE BEGINSELEN VAN DEN LOOP DER MAAN.

§. 133. Wy hebben in het II Hoofdſtuk van het I Boek die Algemeene Grondbeginſelen opgegeven, welken men behoort te kennen, om zich een denkbeeld van den loop der Planeeten te vormen; wy hebben dezelven in het I Hoofdſtuk van dit Boek meer byzonder op den *Loop van onze Aarde* toegepast, ten einde daaruit de Beſchryving van onze nieuwe Conſtructie der Aard-Globe afteleiden, dan wy hebben nog niets opzettelyks aangaande den loop der *Maan* gezegd; rechtſtreeks doet de kennis van derzelver loop niets af of toe tot de kennis van het gebruik der Globen, dan daar de *Maan* zulk eene naauwe betrekking op onze Aarde heeft, en het ons oogmerk is het gebruik der Globen door deze Handleiding meer algemeen te maaken, zoo behoort men ook iets meer byzonders aangaande haaren loop te weeten, waarom wy dit *Hoofddeel* beſtee-

ons, maakt de *Zon*, het aanmerkelykſte licht, uit hoofde van haare nabyheid by de *Aarde*, en ondervind, door haare nabyheid, eene zeer groote kragt van aantrekking van onze *Aarde*, gelyk wederkeerig de *Aarde* door de *Maan* wordt aangetrokken.

235. Uit hoofde van deze aantrekkingskragt der *Aarde* en der *Zon* op de *Maan*, is haar loop aan zeer veele oneffenheden onderhevig, en het is uit dien hoofde zeer moejelyk denzelven regt te kennen, en haaren juisten ſtand te berekenen; wy willen ons, daar wy geen eigentlyke gezegde Sterrenkunde ſchryven, ſlegts met de algemeene grondbeginſelen van haaren loop bezighouden, om daaruit een middel afteleiden, om haaren *middelbaare lengte* ten allen tyde te kunnen vinden.

236. Den middelbaaren afſtand der *Maan* van onze *Aarde* berekent men op 85393 Lieues, van welke 'er 25, één' graad uitmaaken, wordende de *Lieues* gereekent op 2283 *Toiſes*, des de afſtand der Maan van onze Aarde nagenoeg 51236 *Duitſche Mylen* is, haar groote wordt op het $\frac{1}{19}$ deel van onze Aarde geſteld; zy volbrengt haaren loop in 27 dagen 7 uuren 43′ 4″ om onze *Aarde*, en doorloopt dus in den tyd van 24 uuren nagenoeg 13° 10′ 35″; deze ſnelle beweging der *Maan* is het die ons dezelve dezen Avond by eene Ster doet zien, van dewelke zy den voorigen nog op een' grooten afſtand verwyderd was; wanneer zy tuſſchen onze *Aarde* en de *Zon* inſtaat, is haare verlichte zyde geheel van ons afgekeerd; wy kunnen haar alsdan niet zien; zy is dan in *Conjunctie* met de *Zon*, en men noemt dezen haaren ſtand *Nieuwe Maan*,

Maan, omdat men, van de eene *Conjunctie* tot de andere tellende, deze duuring van tyd voor éénen *Maaneſchyn* rekent, en zy, in *Conjunctie* met de *Zon* zynde, voor ons als 't waare haaren loop op nieuws begint; het tydsverloop egter van de eene *Nieuwe Maan* tot de andere, en dus van de lengte van éénen *Maaneſchyn*, is niet gelyk met den boven opgegeeven *omloopstyd* der *Maan* van 27 dagen en 7 uuren; want laat Fig. 31. ABTC de *loopkring der Aarde* zyn — S de *Zon* — T de *Aarde* — en DEFGD de *loopkring* der *Maan* — dan zal de *Maan*, in D ſtaande, uit de *Aarde* gezien worden langs de lyn TDSH; haare *Lengte* zal dus gelyk zyn met de *Lengte* der *Zon*, en daar haar omloopstyd 27 dagen 7 uuren 41' 4" is, zoo zal zy, na verloop van dien tyd, weder met hetzelvde punt H des Hemels overeenkomen; doch wyl de *Aarde* in dit tydsverloop den boog TI van haaren loopkring heeft doorgeloopen, zoo zal de *Maan* noch niet weder in *Conjunctie* met de *Zon* zyn, maar, om in dezelve te zyn, nog den boog DK moeten doorloopen, waartoe zy nog beſteed circa 2 dagen, 5 uuren: des de duuring van haare ééne *Conjunctie* tot de

Maanmaand, het tydsverloop van 29 dagen 12 uuren 44′ 3″, welke haaren *Periodiſchen omloop* bepaalt; twaalf zulke *Maanmaanden*, of 12 *Periodiſche omloopen* maaken één *Maanjaar* uit, 't welk dus van 354 dagen 8 uuren 48′ 35″ is, nagenoeg 11 dagen kleinder als het *Zonnejaar*, § 152. — 235 volkomen *Maanmaanden* maaken zeer naby 19 *Zonnejaaren uit*: deze bepaling verſchilt in 309 Jaaren maar eenen dag; deze Periode van 19 *Zonnejaaren*, na welke dus de *Maan* genoegzaam op denzelvden tyd weder met hetzelvde punt des Hemels overeenkomt, was reeds 430 Jaaren vóór onze gewoone Jaartelling bekend; zy is voor het burgerlyke gebruik vry naauwkeurig, en werdt, toen dezelve ten dien tyde door *Meton* bekend gemaakt wierd, te *Athene* zoo gewigtig geoordeeld, dat men de berekening derzelve tot het gebruik der burgeren, in de openbaare plaatſen, met gouden letteren ten toon ſtelde, waarvan men nog *gulden getal* noemt, deze *Periode* van 19 Jaaren, dewelke de *Conjunctie* der *Maan* weder naauwkeurig tot hetzelvde punt des Hemels, of tot denzelvden dag van het Zonnejaar terug brengt; het is dezelvde Periode, welk ook heden nog onder den naam van *Maan-Cirkel* bekend is.

158. Even gelyk de overige Planeeten, beweegt zich de Maan in eenen *Elliptiſchen* loopkring om de *Aarde*; de *Aarde* ſtaat in het eene brandpunt van deze Ellips, en de afſtand der *Maan* van de *Aarde*; op den eenen of anderen tyd, verſchilt aanmerkelyk: het punt van haaren loopkring in 't welke zy van ons *Aarde* het verſte verwydert is,

noemt men *Apogeum* en het naaste *Perigeum*: de beweging van het *Apogeum* en *Perigeum* der *Maan* is zeer aanmerkelyk, wyl dezelven in den tyd van 8 Jaaren en 311 dagen, met alle punten der *Ecliptica* overeenkomen, dat is in dien tyd eens rondloopen, zoo dat de Lengte van het *Apogeum* in eene Maanmaand 3° 15′ 28″ verſchilt, zynde hetzelve in dien tyd zoo veel voortgelopen of in lengte toegenomen; de afſtand der *Maan* in haar' *verſten ſtand* van onze Aarde is 91397 Lieues of 54838 Duitſche Mylen, in haar' naasten ſtand 86324 L. of 51794 Duitſche Mylen; haar ſchynbaare *Middenlyn* vertoont zich dus ook veel grooter, wanneer zy in haar' naasten ſtand by de *Aarde* is, dan in alle andere ſtanden; in den naasten ſtand ziet men dezelve 33′ 34″ groot, en in haaren verſten ſtand ſlechts van 29′ 25″, waaruit men afleid dat de middelbaare middenlyn der *Maan* is 31′29″, dus de *Maan* van ons nagenoeg ½ graad aan den Hemel beſlaande (te weeten als zy vol is,) gezien wordt; zoo dat men door de hoegrootheid der *volle Maan* de grootte van eenen ½ graad aan den Hemel kan leeren kennen, en de *volle Maan* dus als 't waare tot eene paal van vergelyking, om ons

van 5°, doch de hoegrootheid dezer helling ondergaat door de aantrekkingskragt der *Zon* en *Aarde* veele veranderingen, zoo dat zy tot 5° 18′ kan aanwasſen, zy is grooter, als de *Maan*, in haare *Quadratuuren* zynde, haar grootſte breedte heeft, dan wanneer zy in haare *Conjunctie* of *Oppoſitie* is; de *Maan* gaat in ieder' omloop tweemaal dwars door de *Ecliptica*, en zeven dagen nadat zy in een' haarer knoopen, dwars door de *Ecliptica* gegaan is wykt zy 5 graaden van dezelve af; zonder deze helling zouden wy alle Maanden eene *Zon-Eclips* op den dag der *Conjunctie* hebben, en eene *Maan-Eclips* op den dag der *Oppoſitie*, daar 'er nu geheele Jaaren zyn, in welken 'er geen Eclips voorvalt; wy zullen gelegendheid hebben om over de Eclipſen nader te ſpreeken. De *klimmende knoop der Maan*, of dat punt van de gemeene ſneede van het vlak der *Ecliptica*, en het vlak van den *Loopkring der Maan*, door hetwelk zy gaan moet om benoorden de *Ecliptica* te komen, wordt ſomtyds het *Draakenhoofd* genoemd, en is aan dit merkteken ☊ kenbaar, daar het tegenovergeſtelde punt of de *daalende knoop*, anders ook wel de *Draakenſtaart* genaamd, aan dit merkteken ☋ kenbaar is.

140. Aanmerkelyk is de ſnelle beweging van de *lyn der knoopen* van de *Maan*, welke in den tyd van 18 jaaren 228 dagen 4 uuren 52′ 52″, tegen de order der Tekens, de geheele *Ecliptica* rondloopt, zoo dat, als de *Maan* in het 1e. punt van *Aries* of het *Nacht-eveningspunt van de Lente* door de *Ecliptica* gaat, (gelyk zulks in de Maand

Juny, 1764, gebeurde,) zy 18 Maanden daarna de *Ecliptica* in het begin der *Visschen* snyd, zoo dat haar knoop in dien tyd een Teken is teruggegaan; de doorgang der *Maan*, en de beweging van haare knoopen is zeer duidelyk waartenemen, wanneer de Lengte van een' der beide knoopen 4: 26° is: zy verduistert alsdan de heldere Ster in het hart van den Leeuw of *Regulus*, (gelyk zulks in de Maand Juny, 1757, voorviel); dan eenige jaaren daarna ziet men haar 5° ten Noorden of ten Zuiden van die Ster staan, en haare knoopen zyn dus in dien tyd zigtbaar $\frac{1}{4}$ Cirkel van plaats veranderd.

141. Het zyn de schyngestalten (Phases) der *Maan*, welken het eerst en het meest de aandagt naar zich trekken: de *Maan*, na in haare *Conjunctie* met de Zon geheel voor ons onzigtbaar te zyn geweest, wordt na weinige dagen des avonds in het Westen, naby den Horison, weder voor ons zigtbaar in de gedaante van een' sikkel, wiens rug naar den *Horison*, en dus naar de *Zon* is toegekeerd; van dag tot dag zien wy de *Maan* in licht toenemen; de verlichte rand wordt grooter, en zy staat des avonds hooger aan den *Hori-*

Volle Maan; na dezen dag neemt zy in licht af, wy zien haar circa 8 dagen na *Volle Maan* weder half verlicht, en noemen zulks *Laatſte Quartier*; en nu van dag tot dag in licht al meer en meer afneemende, zien wy haar kort vóór de volgende *Nieuwe Maan*, des ochtends aan den Ooster *Horiſon* weder in de gedaante van een' ſikkel, waarna zy eindelyk zich weder voor ons oog verbergt; deze geheele afwisſeling der Maan, van *Nieuwe Maan* tot *Nieuwe Maan*, noemt men één *Maaneſchyn*, § 137.

141. De 32 Fig. vertoont ons de oorzaak van deze ſchyngeſtalten (Phaſes) der Maan: laat S de *Zon*, T de Aarde, en A, B, C, D, E, F, de *Maan* in haare byzondere ſtanden zyn; zoo zal de *Maan* in A, in *Conjunctie* met de *Zon* zynde, het deel a b c, dat na de *Zon* toegekeerd is, door dezelve verlicht worden, en het duistere gedeelte c d a naar de *Aarde* T toegekeerd zyn; zy kan dus van de *Aarde* niet gezien worden, en wy noemen dezen ſtand NIEUWE MAAN; is zy van A tot in B op haaren weg voortgegaan, dan is het door de *Zon* verlichte gedeelte a b c gedeeltelyk naar de *Aarde* gekeerd; de *Aarde* ziet het gedeelte e B a der *Maan* verlicht, en dit vertoont zich aan ons oog zoo, als wy het Fig. 33. hebben afgebeeld; gaat de *Maan* verder van B tot C, zoo is de ½ van het verlichte gedeelte a b C naar de *Aarde* gekeerd, en deze ziet de Maan in dezen ſtand, welken wy EERSTE QUARTIER noemen, half verlicht; van C tot D voorgaande, is de geheele verlichte helft der

Maan naar de *Aarde* gekeerd; de *Aarde* ziet de geheele ſchyf der *Maan* verlicht, en wy noemen dezen ſtand der *Maan*, in welken zy in haaren *Oppoſitie* is, VOLLE MAAN; ſtaat de *Maan* vervolgends in E, dan is weder de halve verlichte zyde Ebc naar de *Aarde* toegekeerd; wy zien dus haar in dezelvde gedaante als in C, en noemen dezen ſtand LAATSTE QUARTIER; eindelyk wanneer de *Maan* in den ſtand F komt, ziet de *Aarde* ſlechts het kleine gedeelte Fec verlicht, en zy vertoont zich dus weder zoo als wy haar in Fig. 33. hebben afgebeeld; — wy willen alleen dit nog hebben opgemerkt, dat hoe zeer het verlichte gedeelte der *Maan* in de ſtanden B en F, en C en E, even groot is, egter de ſtand van het verlichte gedeelte juist omgekeerd is: dit verlichte gedeelte moet altoos naar de *Zon* toegekeerd zyn; de *Maan* volgt de *Zon*, van dat zy *Nieuw* is geweest tot dat zy *Vol* is, maar gaat de *Zon* voor uit, van *Volle* tot *Nieuwe Maan*: van hier dat in het eerſte geval het verlichte gedeelte naar het *Weſten*, en in het laatſte geval naar het *Oosten* gekeerd is. — Den tyd, die 'er verloopen is, nadat de *Maan* in *Conjunctie* met de *Zon* is ge-



voor een geſchikt merk der tyden achttede, en zyne tydrekening naar den loop der Maan regelde; van hier dan ook dat de wederkomst der *Maan*, op eene plegtige wyze zelvs, by hen geviert werdt, dat men op de hoogten der bergen klom, om de *Maan*, na dat zy nieuw geweest was, het eerst waarteneemen, en van daar met Trompettengeſchal haare wederkomst den Volke bekend maakte; bekend is het *Feest der Nieuwe Maan* by de Jooden, uit de H. Schrift; bekend zyn dergelyke Feesten, ook by andere Volkeren in gebruik, uit hunne Geſchiedenisſen; en wy weeten welk een' grooten invloed de loop der Maan nog, ſchoon wy thands in onze Tydrekenkunde geen *Maanjaaren*, maar *Zonnejaaren* gebruiken, op onzen Almanak, en op de regeling der beweeglyke Feesten heeft; waarom wy het noodzakelyk oordeelen hier iets nader over de Tydrekenkunde of over den Almanak te zeggen.

Van den Almanak.

143. De grondſlag der *Tydrekenkunde* beſtaat in de vergelyking der beweeging van *Zon* en *Maan* onderling, en met de verſcheiden gebeurenisſen, die ons de Geſchiedenisſen der Volkeren opleveren; zy maakt den grondſlag uit der Sterrekunde, en is volſtrekt noodzaakelyk tot de regte kennis van alle de verſchynſelen der Hemelſche Ligchaamen, welken de Sterrekunde ten onderwerp heeft; men kan ook het gebruik der Globen niet recht vatten, zonder eenig begrip van dezelve te heb-

ben, en het is om deze reden dat wy het noodig oordeelen, hier iets van dezelve te zeggen, ons alleenlyk by een kort overzigt bepaalende, en inzonderheid tot die uitkomſten der vroegere waarneemingen en ſchikkingen, welken ons in ſtaat zullen ſtellen, die weinige Tafelen te verklaaren, welken wy nodig geacht hebben in deze Handleiding intelasſchen, om voor alle Jaaren, de *Dagen der Week* — de *Nieuwe Maanen* enz. te kunnen berekenen; uitvoeriger Verhandeling van dit onderwerp, kan onze lezer vinden in opzettelyk over deze ſtof geſchreven werken, gelyk de onlangs uitgegeeven *Eeuwigduurende Almanak*, door J. DE GELDER, vooral voor het oplosſen van allerlei Tykrekenkundige vraagſtukken zeer geſchikt is.

144. De *Maan-Cirkel* is eene *Periode* van 19 Jaaren, door *Meton* 430 Jaaren vóór J. C reeds opgemerkt, § 137. na welke de *Nieuwe-Maanen* weder op denzelvden dag invallen; men noemt het Jaar, waarin de *Nieuwe Maan* op den 1 January komt, het eerſte Jaar van een' Maan-Cirkel, ten minſte volgends den *Gregoriaanſche Almanak*; van de 235 Maaneſchynen welke 'er in deze Jaaren

[redacted]

het Jaar van den *Maan-Cirkel* waarin men zich bevindt. — Zoo dikwyls als de *Nieuwe Maan* op den 1 January valt, begint men weder een' *Maan-Cirkel*, en men heeft dan 1 voor het *Gulden getal*. — Om het *Gulden getal* voor elk Jaar der Christen Jaartelling te vinden, vergaêrt men 1 by het Jaar der telling, deelt de ſom door 19, en het overblyfſel zal het *Gulden getal* voor dat Jaar aanwyzen; indien 'er niets overblyft, dat is, indien de deeling net uitkomt, toont zulks aan, dat men in het laatſte Jaar van den *Maan-Cirkel* is, en het *Gulden getal* is derhalven 19; op deze wyze te werk gaande, zal men bevinden dat het *Gulden getal* voor 1801, 16 is.

145. De *Zonne-Cirkel* is eene *Periode* van 28 Jaaren, na welke de Dagen der Week weder op denzelfden dag der Maand komen; deze Periode wordt veroorzaakt, doordien het gemeene Jaar 1 dag meer als 52 Weeken heeft, en het ſchrikkeljaar 2 dagen meer als 52 Weeken heeft; om den *Zonne-Cirkel* voor elk gegeven Jaar te vinden, telt men 9 by het Jaartal op, deelt de ſom door 28, en het overſchot wyst het Jaar des *Zonne-Cirkels* aan; dus doende vinden wy 18 voor den Zonne-Cirkel van 1801.

146. De *Zondags-letters*, is eene volgreeks van de 7 eerſte letteren van het Alphabet, in den Almanak toegevoegd aan ieder' Dag der Week, waardoor dus dezelvde letter het geheele Jaar op denzelvden Dag der Week wederkomt; die Letter, welke voor een gegeven Jaar beſtendig den *Zondag* aanduidt, noemt men de Zondags-letter

van dat Jaar: zy volgen de order van den Zonne-Cirkel; indien G de Zondags-letter voor een gegeven Jaar is, zal F het zyn voor het volgende; E voor het volgende, enz. —— Alle Schrikkeljaaren hebben twee Zondags-letteren, de eerſte voor de Maanden *January* en *February*, en de tweede voor de 10 overige Maanden des Jaars. — Om de Zondags-letter te vinden, moet men 5 bytellen by het getal der jaaren, en daarenboven nog zoo veele éénheden als 'er Schrikkeljaaren in de Eeuw verlopen zyn; het *facit* deelt men door 7 en het overſchietende getal zal de Zondags-letter voor dat Jaar aanwyzen, volgends de volgende Tafel

1	2	3	4	5	6	7
G	F	E	D	C	B	A

dus om de Zondags-letter voor het Jaar 1763 te vinden, zal men 63 met 5 en 15 moeten ſaamentellen, en de ſom 83 door 7, deelen, dan zal 'er 6 overblyven, des de zesde letter B de Zondags-letter voor 1763 geweest is; deze regel egter kan van geen dienst zyn voor deze 19e. [redacted]

Schrikkeljaaren zedert 1800 geweest zyn, deelt dit getal door 7, en het overſchietende getal zal in de onderſtaande Tafel de *Zondags-letter* aanwyzen:

1	2	3	4	5	6	7
D	C	B	A	G	F	E
4	3	2	1	7	6	5

by voorb: men wil de Zondags-letter voor 1819 weeten, telt men by 19, 4 by, omdat 'er 4 Schrikkeljaaren onder dezelve zyn, en deelt de ſom 23 door 7, dan blyft 'er 2 over, welke in de bovenſtaande Tafel met de Letter C overeenkomt, zoo dat de *Zondags-letter* van dat Jaar C zyn zal; het volgende Jaar, een Schrikkeljaar zynde, heeft de Letters B en A voor Zondags-letters; zo men de bovenſtaande bereekening voor een Schrikkeljaar zelven doet, verkrygt men de tweede Letter; want by 20, 5 bytellende, en door 7 deelende, ſchiet 'er 4 over, 't geen met de A overeenkomt, welke de tweede Zondags-letter voor 1820 is. — De getallen, welken onder iedere letter in deze Tafel ſtaan, dienen om te vinden, welke de eerſte Zondag van 't Jaar zyn zal; de Zondag valt op den 1 January als de Zondags-letter A is, op den 2e. als de Zondags-letter B is, enz.; de Zondags-letter van 1719 is C, derhalve valt de *eerſte* Zondag op den 3 January.

147. De *Indictiën*, of ſoorten van verſchuivingen, welken men, onder *Conſtantinus* en volgende

Kei-

Keizeren, in de gerichtszetels gebruikte, maakten eene *Periode* of een' Cirkel van 15 Jaaren uit, welke zonder oorzaak, en als eene willekeurige ſoort van telling, van eeuw tot eeuw is voortgezet; de *Indictie* is begonnen den 25 September, 312. De Griekſche Keizers en de Kerk van *Conſtantinopolen* begonnen met den 1 September; de Pauſen, welken zich ook van dezelve bedienen, beginnen met den 1 January 313; deze *Periode* heeft niets dat meer aanmerking verdient, als dat dezelve in de openbaare geſchriften van het Roomſche Hof wordt aangehaald; om de *Indictiën* voor een gegeven Jaar te vinden, telt men 3 op by het jaartal, en deelt de ſom door 15; de rest duid het getal der *Indictie* aan.

148. De *Juliaanſche Periode* is het vermenigvuldigde der drie Cirkels, namelyk, van den *Zonne-Cirkel*, *Maan-Cirkel* en *Cirkel van Indictie*, of van 28, 19 en 15, dat is een tydverloop van 7980 Jaaren, in 't welk geen twee Jaaren kunnen zyn, welken dezelfde getallen voor de drie Cirkels kunnen hebben; maar ten einde van welken de drie Cirkels weder gezamentlyk in dezelfde orde komen. — Om te weeten hoe

Van de lengte des Jaars.

149. De duuring van den omloop der Aarde om de Zon bepaalt de lengte van het *Zonnejaar*; echter moet men opmerken, dat de omloop der *Aarde* om de *Zon*, met betrekking tot de *vaste Sterren*, of de wederkomst der *Zon* tot dezelfde Ster, welke van 365 dagen, 6 uuren 9' 10" is, niet de lengte van het Jaar is, van het welke men zich in de Burgerlyke Maatſchappy bedient; men bedient zich van de lengte des Jaars, 't welke door de wederkomst der *Zon* tot het Nachts-eveningspunt bepaald wordt; men is gewoon hetzelve het *Keerkringsjaar* te noemen, en bereekent hetzelve op 365 dagen, 5 uuren 48' 45". — Het burgerlyke Jaar der *Egyptenaaren* was beſtendig van 365 Dagen: zy verwaarloosden geheel de 6 uuren, welken het Jaar langer is. — De oude *Perſen* bemerkte het eerst dat men alle 4 Jaaren eenen Dag moest bytellen, om met den loop der Zon gelyk te blyven, en JULIUS CÆSAR maakte vervolgends de invulling van éénen Dag alle 4 Jaaren, door zyn geheele Ryk, tot één wet; en het is dit Jaar 't welk men gewoon is het *Schrikkeljaar* te noemen: deze invulling van éénen dag geſchied in de Maand February, welke daarom in die Jaaren 29 dagen heeft; dezelve veronderſtelt dat het *Burgerlyke* Jaar juist 6 uuren korter is, als het *Keerkringsjaar*, welke 6 uuren, na verloop van 4 Jaaren, 24 uuren of éénen Dag uitmaken; dan daar het *Keerkringsjaar* 11' 15" korter is dan 365 dagen 6 uuren, welke de leng-

lengte des Jaars volgends deze onderſtelling zyn zou, zoo beantwoord deze invulling niet volkomen aan den loop der *Zon*: 'er worden alle 4 Jaaren, 45′ te veel bygerelt, en deze 45′ zouden na een tydsverloop van veele Jaaren een aanmerkelyk verloop in den tyd der Saiſoenen hebben voortgebragt; daarenboven kon ook door dit verloop van den Tyd, dat de *Zon* door het Nachteveningspunt van de Lente gaat, het Paaschfeest niet meer volgends de inſtelling van het *Concilie van Niceen* gevierd worden; het was om deze reden dat PAUS GREGORIUS XIII, in den Jaare 1582, eene verbetering in den Almanak invoerde, welke onder den naam van *Gregoriaanſchen* of *Nieuwen Styl* bekend is.

150. De verbeteringen in den Almanak, door PAUS GREGORIUS ingeſteld, hadden ten oogmerk 1° om de Saiſoenen geduurig tot denzelvden dag der Maand te doen wederkeeren, dat is de Nachteevening van de Lente op, of zeer naby op den 21 Maart beſtendig te doen voorvallen. — 2° Om de *Nieuwe Maan* en de 14e. der *Paasch Maand* weder te brengen tot het Tydmerk, hetwelk door het *Concilie van Trente*, in 't Jaar 325 voor hetzelve beſtemt was. — Om het eerſte te verhelpen, werden 'er 10 dagen in den Almanak van 't Jaar 1582 overgeſlagen, zoo dat men na den 10 Maart terſtond 21 Maart telde, en om dit verloop in 't vervolg van tyd voor te komen, wierd bepaald, dat de Eeuw-jaaren, welken volgends, de bepaaling van JULIUS CÆSAR, Schrikkeljaaren zouden moeten zyn, tot gemeene Jaaren gemaakt wer-

werden, behalven om de 400 Jaaren, wanneer het Eeuwjaar weder een Schrikkeljaar is; om deze reden zyn de jaaren 1700, 1800, gemeene jaaren geweest, 1900 zal ook een gemeen jaar zyn, maar 2000, 2400, 2800, enz. een Schrikkeljaar: deze ſchikking komt nagenoeg met den loop der *Zon* overeen, want de $11\frac{1}{4}'$ welke het jaar kleinder is dan 6 uuren, maaken éénen dag in de 128 jaaren, en dus 3 dagen in de 384 jaaren, 't geen nagenoeg met 400 jaaren, op welke de Gregoriaanſche Almanak deze vereffening brengt, overeenkomt. — De tweede fout in den Almanak, te weeten, de Nieuwe Maanen betreffende, moest op eene andere wyze verholpen worden, van welke wy nu gaan ſpreeken.

151. Men had zich in den *Juliaanſchen Almanak* altoos van het *Gulden getal* bediend, om den tyd der *Nieuwe Maan* te bereekenen, en onderſteld dat na 19 jaaren de *Nieuwe Maan* juist op denzelfden dag wederkomt; dan dit is niet naauwkeurig, want de Nieuwe Maan komt ten einde des *Maan-Cirkels*, dat is ten einde van 19 jaaren, $1\frac{1}{2}$ uur vroeger, het geen na $312\frac{1}{2}$ jaaren, 23 uuren $59' 52'' 49'''$ geeft, en de *Maan-Cirkel* is dus voor eene reeks van jaaren geen genoegzaam naauwkeurige *Periode*, om de *Nieuwe Maanen* te bereekenen, het was om deze reden, dat by de verbetering van den Almanak de *Epacten* werden ingevoerd, welker uitvinding men aan een' Geneesheer ALOISIUS LILIUS toekent.

152. De *Epacta* is, in haar' eerſten oorſprong, het geen men by het Maanjaar moet optellen, om het Zon-

Zonnejaar uit te maaken; de reeks der *Epacten* is de reeks der verſchillen, welken tusſchen die beide ſoorten van jaaren gevonden worden. — De Epacten van den Almanak zyn alleenlyk geſchikt, om, volgends het oogmerk van de Kerk, en den regel in 't jaar 1582 vastgeſteld, de dagen der Kerkelyke Nieuwe Maan te vinden; dezen komen egter niet altoos naauwkeurig overeen met de middelbaare Sterrekundige Conjunctien der Maan: wy zullen om dezelve te vinden § 183. een' naauwkeuriger weg aanwyzen. — De *Epacten*, die men voor ieder jaar in den Almanak opgeeft, is het getal dat, volgends den Almanak, den ouderdom der Maan in 't begin van dat jaar aanwyst; waaruit volgt, dat indien de Nieuwe Maan den 1 January voorvalt, de *Epacta* voor dat jaar nul is, maar het volgende jaar zal dezelve 11 dagen zyn, omdat het Maanjaar ſlechts van 354, en het Zonnejaar van 365 dagen is; het geen te weeg brengt dat de Nieuwe Maan op den 20 December gevallen zynde, de Maan op den 1 January 11 Dagen oud zal zyn; desgelyks is de *Epacta* in het daaraanvolgende jaar 22; het derde jaar zou dezelve 33 zyn, indien men 'er geen 30 van aftrok, om eene volle Maand uit te

meer men de Maan-maanden van 29 en 30 dagen, en de burgerlyke jaaren van 365 Dagen, benevens een Schrikkeljaar alle vier jaaren veronderſtelt.

153. Dan daar de *Maan-Cirkel* alle 19 jaaren 1½ uur met den loop der Maan verſchilt, § 151, en men om deze reden geduurende drie Eeuwen het Schrikkeljaar overſlaat, hetwelk volgends den gewoonen loop der Schrikkeljaaren moest plaats hebben, § 150. zoo zyn 'er twee uitzonderingen op dezen regel, te weeten, de *proemtoſe* of *Maan equatie*, welke uit het verſchil des *Maan-Cirkels*, vergeleken met den loop der Maan zelve, voortſpruit, en de *metemptoſe* of *Zon equatie*, welke in het overſlaan van de Schrikkeljaaren der Eeuwjaaren haar' oorſprong vindt; men moet uit dien hoofde alle Eeuwen eene nieuwe volgreeks van *Epacten* aanneemen, waaruit de *Uitvoerige Tafel der Epacten*, welke dertig volgreeksen van Epacten bevat, geboren wordt. — Deze dertig volgreeksen van *Epacten* gebruikt men in de plaats van dertig byzondere Almanakken, welken men anders zou moeten hebben, en zy voldoen volkomen aan het burgerlyke gebruik, waartoe dezelven geſchikt zyn. — Wy zullen, in plaats van deze *Uitvoerige Tafel der Epacten*, welke hier nog eene byzondere verklaring zou vereiſchen, achter bladz. 102. eene Tafel laaten volgen, geſchikt om de *Epacten*, het *Gulden getal*, den *Zonne-Cirkel*, en de *Zondagsletter* voor alle jaaren dezer loopende Eeuw gemakkelyk te kunnen vinden.

154. Ten einde de *Epacten* van het jaar te doen dienen, om alle Maanden de Nieuwe Maan-

aantewyzen, plaats men in den eeuwigdurenden Almanak, welken wy, met de Tafel der Epacten enz. voor deze 19 Eeuw, na bladz. 102 zullen laaten volgen, de 30 *Epacten* nevens de *dagen der Maand*, volgends eene teruggaande order, en de dag der *Nieuwe Maan* komt dan altoos overeen met den datum der Maand, naast welke de *Epacta* van het jaar gevonden wordt.

155. Door denzelvden Almanak vindt men ook zeer gemakkelyk den Dag der Week, welke met elken datum der Maand overeenkomt; men vindt namentlyk voor elke Maand de Zondagletters in haare natuurlyke volgreeks in eene colom achter de colom der *Epacten* geplaatst; de Zondagsletter voor het gegeeven jaar gevonden hebbende, ziet men derhalve voor elke Maand den datum der *Zondagen*, en bygevolg van elken dag der Week; want is A by voorb. de Zondagsletter, dan is B Maandag, C Dingsdag, enz.

156. Even zoo dient dezelve Almanak ook om den tyd van het Paaschfeest, en van alle de andere beweegelyke feesten te bepaalen; de beſtemde tyden, tusſchen welken het Paaschfeest komt, zyn de 22 Maart en de 25 April: dus is het Paasch-

datum de *Epacta* van het jaar na den 8 Maart ingeſlooten te reekenen overeenkomt, en deze Nieuwe Maan zal de *Nieuwe Maan* van *Paasſchen* zyn; de veertiende dag na dezelve (te weeten de dag van de Nieuwe Maan mede ingeſloten,) zal het *Volle Maan* zyn, welke men de *Volle Maan van Paasſchen* noemt, en de Zondag na deze Volle Maan is de datum van Paasſchen voor dat jaar; zoo de Volle Maan op een' Zondag zelven komt, wordt het Paaſchfeest den volgende Zondag gevierd.

Verklaring dezer Tafel.

157. De *eerſte* Tafel, gemerkt Tab. I en II, welke twee bladzyden beſlaat, bevat op ieder bladz. *twee* Hoofdcolommen, ieder van welke weder in *vyf* Colommen verdeeld is, waarvan de 1e. de *Jaaren* dezer loopende Eeuw, (van de welke men om des plaats wille de honderdtallen heeft afgelaaten,) bevat, — de 2e. geeft den *Zonne-Cirkel*, — de 3e. de *Zondagsletter*, — de 4e. het *Gulden-getal*, en de 5e. de *Epacta* van het jaar uit de 1e. Colom, dat met elk dezer getallen of letters overeenkomt; zoo ziet men by voorb. dat voor het Jaar 1825 de Zonne-Cirkel 14 is, de Zondagsletter B, het Gulden-getal 2 en de Epacta XI.

158. De *tweede* Tafel, welke 4 bladz. beſlaat, die gemerkt zyn Tab. III, IV, V, VI. bevat op iedere bladz. *drie* Hoofdcolommen, ieder *één* Maand inhoudende, ieder van welke weder in

drie Colommen verdeeld is, welken de *dagen* der Maand, en de *Epacta* en *Zondagsletter* voor iederen dag derzelve bevatten; men vindt in dezen *Eeuwigduurenden Almanak* der *Epacten* ſommige dagen, by welken *twee* Epacten zyn aangetekend, om dat iedere volgreeks 30 *Epacten* bevat, en 12 volgreekſen van Epacten, ieder van 30 dagen, aan het *Maanjaar*, 't welk 354 dagen heeft, 360 dagen zouden geeven, welke 6 dagen nu, door op 6 plaatſen van den Almanak de Epacten XXIV en XXV te vereenigen, zyn weggenomen; door deze ſchikking heeft men zóowel Maaneſchynen van 29 dagen als van 30 dagen in den Almanak gebragt, alhoewel het getal der Epacten 30 blyft; de 12 Maaneſchynen van één Jaar zyn door deze inrichting nu de eene van 30, en de volgende van 29, de naastvolgende weder van 30 dagen enz., en ten einde te zorgen, dat men egter niet te vreezen hebbe dat 'er in het tydsverloop van 19 Jaaren of één' Maan-Cirkel, twee Maaneſchynen op éénen dag zouden vallen, zoo zyn de reekſen der Epacten in de *Uitvoerige Tafel der Epacten* zoodanig ingericht, dat de getallen XXV en XXIV nimmer in dezelvde volgreeks van 19

[redacted]

oorzaak zyn om in het zelvde tydsverloop van 19 Jaaren de N. Maan op denzelvden dag te doen wederkomen, wyl 'er gezorgd is dat deze beide *Epacten* mede nimmer in dezelvde volgreeks komen. —— Op den laatſten December vindt men nog eene buitengewoone *Epacta* 19 geplaatst: deze dient alleen dan, wanneer men voor *Epacta* van het gegeven Jaar, en voor het *Gulden-getal* beide 19 heeft, omdat alsdan de laatſte N. Maan maar van 29 dagen is, en men dus zoo wel den 31e. als den 2e. December Nieuwe Maan heeft; de laatſte N. Maan van het Jaar, waarvan het Gulden-getal 19 is, is daarom van 29 dagen, omdat dit de *zevende* der *embolismiſche* of *toegevoegde Maaneſchynen* is. § 144.

159. Zie hier eenige voorbeelden van het gebruik dezes Almanaks: Men vraagt naar de Nieuwe Maan van April 1802? — Ten dien einde zoeke men in de *eerſte* Tafel de *Epacta* voor het Jaar 1802, welke XXVI is, en zie met den hoeveelſten der Maand *April* deze in den Almanak overeenkomt, wanneer men zal bevinden dat, de Epacta XXVI met den 4e. April overeenkomende, het op dien dag N. Maan is; wil men weeten welke dag der week het dan zy, zoo zoeke men nu nog de *Zondagsletter* van 1802 in de eerſte Tafel, welke C zynde, de 4 April juist *Zondag* is, om dat C in den Almanak naast den 4. April ſtaat; om den dag der *Volle Maan* te weeten, behoeft men ſlegts 14 dagen van den dag der N. Maan, dien dag ingeſloten, aftetellen: dit

doende voor April 1802, vindt men voor de N. Maan den 17. *April.*

Tweede Voorbeeld: men vraagt wanneer het *Paasſchen* zijn zal A°. 1804? — Men zoeke ten dien einde *eerst* de *Epacta* voor dat Jaar, en bevindt dat dezelve is XVIII; ten *tweede* zie men met welken dag der Maand *Maart* de Epacta XVIII overeenkomt, 't geen met den 11e. is; daar nu de 11e. Maart de eerſte N. Maan na den 7e. is, is deze dus de *N. Maan* van *Paaſſche*, § 156. ten *derde* telle men van dezen 11e. Maart 14 dagen verder, en men bekomt voor de *Volle Maan* van *Paasſchen* den 26e. Maart, ten *vierde* zoeke men de *Zondagsletter* voor het Jaar 1804, welke A en G is, omdat het een Schrikkeljaar is: de 11e. Maart is na den 29e. February, en derhalve is de Zondagsletter in Maart G, § 146, naast den 26e. Maart ſtaat de letter A, die op de G volgt: het is dus den 26 Maart *Maandag*, en den volgenden *Zondag* den 1. April *Paasſchen*. § 156.

Van de Maanden.



Tafel om den Zonnecirkel, Zondagsletter, het Gulden Getal en de Epacta te vinden voor elk Jaar der 19e Eeuw.

Jaaren.	Zonnecirkel.	Zond. Lett.	Guld. Getal	Epacta.	Jaaren.	Zonnecirkel.	Zond. Lett.	Guld. Getal	Epacta.
1	18	D	16	XV	26	15	A	3	XXII
2	19	C	17	XXVI	27	16	G	4	III
3	20	B	18	VII	28	17	F E	5	XIV
4	21	A G	19	XVIII	29	18	D	6	XXV
5	22	F	1	*	30	19	C	7	VI
6	23	E	2	XI	31	20	B	8	XVII
7	24	D	3	XXII	32	21	A G	9	XXVIII
8	25	C B	4	III	33	22	F	10	IX
9	26	A	5	XIV	34	23	E	11	XX
10	27	G	6	XXV	35	24	D	12	I
11	28	F	7	VI	36	25	C B	13	XII
12	1	E D	8	XVII	37	26	A	14	XXIII
13	2	C	9	XXVIII	38	27	G	15	IV
14	3	B	10	IX	39	28	F	16	XV
15	4	A	11	XX	40	1	E D	17	XXVI
16	5	G F	12	I	41	2	C	18	VII
17	6	E	13	XII	42	3	B	19	XVIII
18	7	D	14	XXIII	43	4	A	1	*
19	8	C	15	IV	44	5	G F	2	XI
20	9	B A	16	XV	45	6	E	3	XXII
21	10	G	17	XXVI	46	7	D	4	III
22	11	F	18	VII	47	8	C	5	XIV
23	12	E	19	XVIII	48	9	B A	6	XXV
24	13	D C	1	*	49	10	G	7	VI
25	14	B	2	XI	50	11	F	8	XVII

Tafel om den Zonnecirkel, Zondagsletter; het Gulden Getal en de Epacta te vinden voor elk Jaar der 19e Eeuw.

Jaaren.	Zonnecirkel.	Zond. Lett.	Guld. Getal	Epacta.	Jaaren.	Zonnecirkel.	Zond. Lett.	Guld. Getal	Epacta.
51	12	E	9	XXVIII	76	9	B A	15	IV
52	13	D C	10	IX	77	10	G	16	XV
53	14	B	11	XX	78	11	F	17	XXVI
54	15	A	12	I	79	12	E	18	VII
55	16	G	13	XII	80	13	D C	19	XVIII
56	17	F E	14	XXIII	81	14	B	1	*
57	18	D	15	IV	82	15	A	2	XI
58	19	C	16	XV	83	16	G	3	XXII
59	20	B	17	XXVI	84	17	F E	4	III
60	21	A G	18	VII	85	18	D	5	XIV
61	22	F	19	XVIII	86	19	C	6	XXV
62	23	E	1	*	87	20	B	7	VI
63	24	D	2	XI	88	21	A G	8	XVII
64	25	C B	3	XXII	89	22	F	9	XXVIII
65	26	A	4	III	90	23	E	10	IX
66	27	G	5	XIV	91	24	D	11	XX
67	28	F	6	XXV	92	25	C B	12	I
68	1	E D	7	VI	93	26	A	13	XII
69	2	C	8	XVII	94	27	G	14	XXIII
70	3	B	9	XXVIII	95	28	F	15	IV
71	4	A	10	IX	96	1	E D	16	XV
72	5	G F	11	XX	97	2	C	17	XXVI
73	6	E	12	I	98	3	B	18	VII
74	7	D	13	XII	99	4	A	19	XVIII
75	8	C	14	XXIII	100	5	G	1	XXIX

[redacted]

Eeuwigduurende Almanak der Epacten.

JANUARY.			FEBRUARY.			MAART.		
Dag.	Epacta.	Z. L.	Dag.	Epacta.	Z. L.	Dag.	Epacta.	Z. L.
1	*	A	1	XXIX	D	1	*	D
2	XXIX	B	2	XXVIII	E	2	XXIX	E
3	XXVIII	C	3	XXVII	F	3	XXVIII	F
4	XXVII	D	4	25 XXVI	G	4	XXVII	G
5	XXVI	E	5	XXV. XXIV	A	5	XXVI	A
6	25 XXV	F	6	XXIII	B	6	25 XXV	B
7	XXIV	G	7	XXII	C	7	XXIV	C
8	XXIII	A	8	XXI	D	8	XXIII	D
9	XXII	B	9	XX	E	9	XXII	E
10	XXI	C	10	XIX	F	10	XXI	F
11	XX	D	11	XVIII	G	11	XX	G
12	XIX	E	12	XVII	A	12	XIX	A
13	XVIII	F	13	XVI	B	13	XVIII	B
14	XVII	G	14	XV	C	14	XVII	C
15	XVI	A	15	XIV	D	15	XVI	D
16	XV	B	16	XIII	E	16	XV	E
17	XIV	C	17	XII	F	17	XIV	F
18	XIII	D	18	XI	G	18	XIII	G
19	XII	E	19	X	A	19	XII	A
20	XI	F	20	IX	B	20	XI	B
21	X	G	21	VIII	C	21	X	C
22	IX	A	22	VII	D	22	IX	D
23	VIII	B	23	VI	E	23	VIII	E
24	VII	C	24	V	F	24	VII	F
25	VI	D	25	IV	G	25	VI	G
26	V	E	26	III	A	26	V	A
27	IV	F	27	II	B	27	IV	B
28	III	G	28	I	C	28	III	C
29	II	A				29	II	D
30	I	B				30	I	E
31	*	C				31	*	F

EEUWIGDUURENDE ALMANAK DER EPACTEN.

OCTOBER.			NOVEMBER.			DECEMBER.		
Dag.	Epacta.	Z.L.	Dag.	Epacta.	Z L.	Dag.	Epacta.	Z.L.
1	XXII	A	1	XXI	D	1	XX	F
2	XXI	B	2	XX	E	2	XIX	G
3	XX	C	3	XIX	F	3	XVIII	A
4	XIX	D	4	XVIII	G	4	XVII	B
5	XVIII	E	5	XVII	A	5	XVI	C
6	XVII	F	6	XVI	B	6	XV	D
7	XVI	G	7	XV	C	7	XIV	E
8	XV	A	8	XIV	D	8	XIII	F
9	XIV	B	9	XIII	E	9	XII	G
10	XIII	C	10	XII	F	10	XI	A
11	XII	D	11	XI	G	11	X	B
12	XI	E	12	X	A	12	IX	C
13	X	F	13	IX	B	13	VIII	D
14	IX	G	14	VIII	C	14	VII	E
15	VIII	A	15	VII	D	15	VI	F
16	VII	B	16	VI	E	16	V	G
17	VI	C	17	V	F	17	IV	A
18	V	D	18	IV	G	18	III	B
19	IV	E	19	III	A	19	II	C
20	III	F	20	II	B	20	I	D
21	II	G	21	I	C	21	*	E
22	I	A	22	*	D	22	XXIX	F
23	*	B	23	XXIX	E	23	XXVIII	G
24	XXIX	C	24	XXVIII	F	24	XXVII	A
25	XXVIII	D	25	XXVII	G	25	XXVI	B
26	XXVII	E	26	25. XXVI	A	26	25. XXV	C
27	XXVI	F	27	XXV. XXIV	B	27	XXIV	D
28	25. XXV	G	28	XXIII	C	28	XXIII	E
29	XXIV	A	29	XXII	D	29	XXII	F
30	XXIII	B	30	XXI	E	30	XXI	G
31	XXII	C				31	19. XX	A

[redacted]

drukken nog door hunne naamen uit, dat zy de 7e, 8e, 9e en 10e. Maanden van het Jaar waren, 't welk toen ook gelyk nu met December eindigde; de Maand *Maart* was toen de eerſte Maand van het Jaar. *Numa* voegde 51 dagen by het Jaar der *Romeinen*, welken toen ten tyde in Maanjaaren reekenden, en maakte dus het Jaar van 355 dagen, en voegde twee Maanden by het Jaar by, welken hy aan het begin des Jaars plaatſte; des het Jaar toen vervolgens, gelyk ook nu, met January begon, denkelyk omdat na den Winter-Zonneſtand de dagen in deze Noordelyke gewesten weder beginnen te lengen, en dus als 't waare tot hunne voorige lengte weder keeren; de Maanden der Romeinen waren toen van 29 en 30 dagen, om met de Maan-maanden, welken van 29½ dag zyn, overeen te komen. —

161. Deze maanden van 29 en 30 dagen maakten een Maanjaar van 355 dagen uit, 't welk 10 dagen kleinder was dan het *Zonnejaar*, zoodat ten einde van drie Jaaren de Winter niet meer in 't begin van January, maar in 't begin van February kwam; om dit verloopen der Saiſoenen voor te komen, gebruikte men eene toevoeging, (*intercalatio*), door welke de winter altoos met de Maand January moest beginnen: wanneer 'er twee Jaaren verloopen waren, voegde men 22 dagen by, wanneer 'er vier jaaren verloopen waren, 23 dagen, op het zesde 22 dagen, op het agtſte 23 dagen, zoodat 'er in agt Jaaren 90 toegevoegde of ſchrikkeldagen waren. — Ten einde van 30 Jaaren egter bevond men dat deze invul-

beginnen hunnen dag van den middag, en tellen door tot 24 uuren op den volgenden middag, zoo dat, wanneer men in burgerlyken tyd telt den 26. May, ten 9 uuren 's morgens, men in de Sterrekunde zegt den 25. May, ten 21 uuren: dit is het, het geen men *Sterrekundige tyd* gewoon is te noemen.

Van den Heliaſchen, Cosmiſchen en Acroniſchen Op- en Ondergang der Sterren.

165. Behalve de te vooren opgegeevene verdeeling van den tyd in *Uuren*, *Dagen*, *Maanden* en *Jaaren*, bediende men zich ook by de ouden van de wederverſchyning van dezelvde vaste Ster, om de wederkomst van het een of ander Jaargety te bepaalen; men benoemde deze verſchyning van zoodanig eene Ster met den naam van *Opgang*, en haare verdwyning met den naam van *Ondergang*. — De aanmerkelykſte en ter beſtemming van den tyd des Landbouws, of ter bepaaling van het tydſtip van de eene of andere gebeurenis meest gebruikelyk, is de *Heliaſche Op-* en *Ondergang* der Sterren; men dient zich van denzelven een denkbeeld te kunnen vormen, om de tyds-

tot de eene of andere Ster, en het is hierdoor, dat Sterren, welken wy gewoon waren des avonds boven onzen Horiſon te zien flonkeren, meer en meer tot de Zon naderende, zich eindelyk in haaren glans verliezen, en voor ons oog onzigtbaar worden: dit is het, 't welk men de *Heliaſche Ondergang* eener Ster noemt; wanneer de Zon dit geſternte doorgelopen heeft en zich verre genoeg van die Ster verwyderd heeft, om één uur na dezelve op te gaan, zien wy dezelvde Ster, die wy te voren in 't Westen in den glans der Zon verloren hadden, des morgens aan den Oostelyken Horiſon weder, en men noemt dit haar *Heliaſche Opgang*; daar nu de Zon beſtendig de Ecliptica doorloopt, § 72. zoo zyn het ook meestal de Sterren, welken in of naarby de Ecliptica zich bevinden, welker *Heliaſche Op-* of *Ondergang* tot bepaaling der tyden diende, en inzonderheid is de *Heliaſche Op-* en *Ondergang* van *Sirius*, of de *groote Hondſter*, vermaard in de oude geſchiedenis; het was de *Heliaſche Opgang* van *Sirius*, welke den tyd van de Overſtroomingen des Nyls bepaalde, en met welke het *Cyniſche* Jaar der *Egyptenaaren* begon.

167. Behalven dezen *Heliaſchen Opgang* der Sterren, die onder de Ouden de aanmerkelykſte was, onderſcheidden zy nog verſcheiden andere Op- en Ondergangen der Sterren, en de hedendaagſche Sterrekundigen zyn nog gewoon, in naarvolging van hen, van een' *Cosmiſchen* en *Acroniſchen* Op- en Ondergang der Sterren te ſpreeken. —— De *Cosmiſche* Opgang der Sterren heeft plaats voor

alle

Schaduwkegel EHF, welke de Aarde achter zich voert; en is de *Maan* dus in haare *oppositie* in I, en haar afstand TI kleinder dan de hoogte der Schaduwkegel, zoo zal deze schaduwkegel EHF der *Aarde* het licht der *Zon* voor de *Maan* moeten verbergen, en 'er zal eene *Maan-Eclips* plaats hebben.

170. Men onderscheid dus de Eclipsen in *Zon-* en *Maan*-Eclipsen: by de *Zon*-Eclipsen zien wy eene verduistering aan de Zon, en by de *Maan*-Eclipsen eene aan de Maan voorvallen; deze verduistering egter is niet altoos even groot, en men is gewoon, om derzelver grootte te bepaalen, by Maan-Eclipsen de middenlyn der Maan, en by Zon-Eclipsen de middenlyn der Zon in 12 deelen, welken men *duimen* noemt, te verdeelen; wordt de geheele schyf der Zon of Maan verduisterd, dan noemt men dit eene *totaale*, wordt 'er slechts een gedeelte verduisterd, dan noemt men het eene *partiaale* Eclips, en geschied de *conjunctie* in het oogenblik zelven dat de Maan in één' van derzelver knoopen is, dan noemt men het eene *centraale* Eclips, welke by eene Zon-Eclips *centraal* en *annulair* kan zyn, wanneer de Maan, kleinder dan de Zon zich vertoonende, een' helderlichtende, ring om zich heeft, welke eene zeer fraaije vertoning veroorzaakt; ook kan eene Zon-Eclips somtyds *centraal* en *totaal* zyn, zoo als wy § 176, nader zien zullen.

171. De *Zon-Eclipsen* kunnen alleen dan plaats hebben, wanneer het *Nieuwe Maan* zynde, de *Maan* in *Conjunctie* met de *Zon* is, en alzoo van

de

de *Aarde* met de *Zon* in dezelvde gezigts-lyn gezien wordt, gelyk de 34e. Fig. verbeeld; *Maan-Eclipſen* vallen alleen dan voor, wanneer het *Volle Maan* is, dat is, wanneer de *Maan* in *oppoſitie* met de *Zon* is, want in geene andere ſtand der Maan kan de ſchaduwe der *Maan* de Aarde, of de ſchaduwe der Aarde de Maan bereiken; egter valt 'er niet by elke *Nieuwe Maan* eene Zon-Eclips, of by elke *Volle Maan* eene Maan-Eclips voor: de reden hiervan ligt in de helling van het *vlak van den loopkring der Maan* op het *vlak der Ecliptica*, § 139. gemeenlyk egter volgt op eene Zon-Eclips eene Maan-Eclips, of ook omgekeerd.

172. Zal 'er eene *Zon-* of *Maan-Eclips* plaats hebben, dan moet de lyn SNT, Fig. 34. van de middenpunten der Zon, der Aarde en der Maan, *in* of ten *naaste by in* het zelvde vlak zyn; want is dit verſchil groot, dan zal de Schaduwkegel der Maan, by derzelver *Conjunctie*, de Aarde niet bereiken, maar boven of beneden de Aarde heenen gaan, en 'er kan alsdan geen Zon-Eclips plaats hebben; even zoo zal 'er geen Maan-Eclips kunnen plaats hebben in de *Oppoſitie* der Maan, zoo de lyn STH, Fig. 35. der middenpunten niet genoegzaam in het zelvde vlak valt, wyl alsdan de Schaduwkegel der Aarde boven of onder de *Maan* zal heenen gaan, en dus de Maan niet berooven van het licht, dat zy van de *Zon* ontvangt; zoo ziet men in de 36e. Fig. eene *Conjunctie* der Maan afgebeeld, in welke 'er geen Zon-Eclips kan plaats heb-

[illegible], omdat de Schaduwkegel MDG boven [illegible] heen gaat, en geen ſchaduw op de Aarde werpt: gelyk 'er ook in de *Oppoſitie* der Maan, in de 35e. Fig. afgebeeld, geen Maan-Eclips kan plaats hebben, omdat de Maan te hoog ſtaat, om door de Schaduwkegel EHF der Aarde verduisterd te worden; de lyn der middenpunten, is in deze beide laatſte Figuuren niet in het zelvde vlak, gelyk in Fig. 34 en 35.; het is zeer noodzakelyk dat men zich hier een juist denkbeeld make van het vlak, in het welk alle drie de middenpunten der *Zon*, *Aarde* en *Maan* zyn moeten, want 'er heeft geen *Conjunctie* of *Oppoſitie* der Maan plaats, of die middenpunten zyn in 't zelvde vlak; doch dit is niet het zelvde vlak, in of naby het welk zy moeten zyn, om eene Eclips te vormen: het vlak, in het welk de meergenoemde middenpunten zyn by elke *Conjunctie* of *Oppoſitie*, ſtaat rechthoekig op het vlak der *Ecliptica*, en het vlak, in of naby het welk de *Eclipſen alleen* kunnen voorvallen, is het *vlak van de Ecliptica* zelve; dit blykt duidelyk uit de vergelyking van de 34 en 36e. Fig.: in de 34e. Fig. is de Zon, Aarde en Maan in het zelvde

maar de Maan is niet in het vlak der Ecliptica, welke ook hier door de lyn S N T verbeeld wordt, en 'er heeft dus geen Eclips plaats.

173. Wy zagen zoo even, dat 'er geen Eclips kan plaats hebben, 't en zy de lyn der middenpunten *in* of ten *naaste by in* het zelvde vlak is; dit is dezelve ondertusschen niet altyd, want dan moest ook het *vlak van den loopkring der Maan* in het *vlak der Ecliptica* gelegen zyn, en dit is het niet, gelyk wy § 139. reeds zagen; het vlak van den loopkring der Maan maakt met het vlak der Ecliptica een' hoek van ruim 5° § 139. 'er is dus maar één lyn, welke aan beiden die vlakken gemeen is, § 64. dat is: de lyn der knoopen, en 'er kunnen derhalven ook geene *Eclipsen* voorvallen, 't en zy de Maan *in* of *naarby* een' haarer *knoopen* is: daar nu elke *Nieuwe* of *Volle Maan* niet in of naarby de knoopen kan voorvallen, wyl de Maan, by elke *Conjunctie* of *Oppositie* van een geheel jaar, in een ander gewest des Hemels staat, zoo kan 'er dus ook by elke *Nieuwe* of *Volle Maan* geen Eclips plaats hebben, en daar de *knoopen* der Maan zelve hunne eigen beweging hebben, zoo kan ook de Periode van 19 Jaar, welke anders den stand der Maan tot het zelvde punt des Hemels wederbrengt, de Eclipsen niet doen wederkeeren, welken men 19 Jaaren te vooren heeft waargenomen.

174. De oude Sterrekundigen, welken zich van de Eclipsen bedienden, om den middelbaaren omloop der Maan te leeren kennen, vonden, dat na 6585 dagen en 8 uuren, dat is na 223 Maanschy-

ſchynen, of 18 Jaaren en 10 dagen, dezelvde Eclipſen nagenoeg weder voorvielen, zoodat twee Maan-Eclipſen, welken 18 Jaaren en 10 dagen van elkander verwyderd zyn, nagenoeg dezelvde grootte moeten hebben, des men voor de wederkomst der Eclipſen eene Periode van 18 Jaaren en 10 dagen zou kunnen aannemen; egter is deze tydbepaaling niet naauwkeurig, wanneer men van een lang verloop van tyd ſpreekt, want by voorb. de Maan-Eclips van 31 January, 1580. was *totaal* geweest; die van den 10 February, 1598. was ſleegts van 11½ duimen; die van den 14 Maart, 1634. ſlegts van 11 duimen; die van den 27 April, 1706. van 5½ duim; van den 29 May, 1760. van ¾ duim, en den 10 July, 1778. na tien volkomen Perioden, is 'er in 't geheel geen Eclips geweest, zoodat, hoezeer ook dezelvde Eclipſen, welken dit Jaar by voorb. zullen plaats hebben, over 18 Jaar en 10 dagen weder komen, egter dit geen vaste regel is, om voor een lang tydsverloop de Eclipſen te kunnen voorzeggen.

175. Laat AB, Fig. 38. een gedeelte van den loopkring der Maan zyn, CD een gedeelte der Ecliptica, E een van de knoopen der Maan; laaten voorts de geſchaduwde ronden F, F, H,



de, eene *totaale Maan-Eclips* veroorzaaken; — in de *Oppositie* by G zal 'er, een gedeelte van de verlichte schyf der Maan door de Schaduwkegel der Aarde bedekt wordende, eene *partiaale* of *gedeeltelyke Maan-Eclips* gezien worden, welke egter in de *Oppositie* by I, die verder van den knoop E voorvalt, veel kleinder zyn zal; in de Oppositie by L zal geen Eclips kunnen plaats hebben, wyl de Maan te groote breedte heeft, om door de Schaduwkegel der Aarde te kunnen bereikt worden. — De afstand der Maan van haar' knoop bepaalt dus de mogelykheid eener Eclips, en de afstand a b der Maan van de Ecliptica, dat is, de *breedte* der Maan, bepaalt de hoegrootheid der Eclips; indien deze afstand a b, dat is de *breedte* der Maan, gelyk is aan de som der $\frac{1}{2}$ middenlynen van de Schaduwkegel der Aarde, in het gewest der Maan en de $\frac{1}{2}$ middenlyn der Maan, kan 'er geen Eclips meer plaats hebben; deze $\frac{1}{2}$ middenlyn nu van de Schaduwkegel der Aarde, in het gewest der Maan, is nooit meer dan 47′, en de $\frac{1}{2}$ middenlyn der Maan is in haaren naasten stand nagenoeg 17′, dus 'er geen *Maan-Eclips* kan plaats hebben, zoo de *breedte der Maan* grooter dan 64′ is, en geen *totnaale* Eclips, wanneer de breedte der Maan grooter is dan 30′.

176. Even nu gelyk wy uit de 38. Fig. de reden hebben aangetoond, waarom 'er enkel dan alleenlyk eene *Maan-Eclips* plaats heeft, wanneer de Maan niet meer dan 64′ breedte heeft, zoo heeft 'er om dezelvde reden geen *Zon-Eclips*

plaats, dan wanneer de breedte der Maan klein is, en dus de conjunctie *in* of *digte by* den knoop voorvalt. — Laat AB, Fig. 39. weder een gedeelte zyn *van den loopkring der Maan*, CD een gedeelte der *Ecliptica*, E een van de *knoopen* der *Maan*, en E, F, H, K de ſtand der Zon, in de Ecliptica voor onderſcheidene *conjunctien*, welken in de ſtanden E, G, I; L der Maan voorvallen, dan zal, wanneer de *conjunctie* in E, in den knoop zelven voorvalt, het middenpunt der Maan op het middenpunt der Zon gezien worden, en de middenlyn der Zon zoo veel grooter zynde dan die der Maan, zal de Zon een' verlichten rand, of ring rondom de Maan vormen, welke de *annulaire* Eclips zal veroorzaaken; — in de *conjunctie* by G, zal een gedeelte van de ſchyf der Maan een gedeelte van de ſchyf der Zon verduisteren, en eene *partiaale* Zon-Eclips veroorzaaken; — in de *conjunctie* by I zal ook eene *partiaale* Zonverduistering plaats hebben, doch welke kleinder zal zyn, omdat de afſtand IE der Maan van haar' knoop grooter is dan de afſtand GE; en eindelyk zoo zullen de beide randen der Zon en Maan elkander ſlechts aanraaken

en Fig. 38 en 39. verſchillen daar in, dat in de 34, 35, 36 en 37e. Fig. de Zon, Aarde en Maan als op eene regte lyn geplaatst gezien worden, en dus in de doorſneede van derzelver loopkring; daar in de 38 en 39e. Fig. de Aarde en Maan, of Zon en Maan, als in eene regte lyn voor ons uit verbeeld worden, in welk geval de voorwerpen ons altoos als op elkanderen geplaatst voorkomen.)

177. 'Er is egter tusſchen de Zon- en Maan-Eclipſen een aanmerkelyk onderſcheid; want daar de Maan zeer veel kleinder is dan de Zon, zoo kan het gedeelte van de Schaduwkegel der *Maan*, 't welk de Aarde bereikt, niet dan een zeer klein gedeelte derzelve van het licht der Zon berooven, daar integendeel de Aarde veel grooter zynde dan de Maan, de laatſte by eene *Maan-Eclips* geheel in de Schaduwkegel der Aarde kan ingaan en alzoo geheel verduisteren; de *Maan* wordt dus by eene *Maan-Eclips* werkelyk van het licht der *Zon* beroofd, en moet verduisterd gezien worden van alle bewooners der Aarde, voor welken zy boven den Horiſon verheven is; de *Zon* wordt nimmer van haar licht beroofd by eene *Zon-Eclips*, maar de Maan belet ſlechts door haare tusſchenkomst het ſchynſel der Zon tot een zeker gedeelte van de oppervlakte der Aarde door te dringen, en de *Zon-Eclips* kan dus in lange na zoo algemeen niet gezien worden als eene *Maan-Eclips*, alhoewel men zich egter niet moet verbeelden, dat alleen die bewooners der Aarde de *Zon-Eclips* zou-

den zien, over welken het gedeelte van de Schaduwkegel der Maan, dat de Aarde bereikt, gaat.

178. Laat S, Fig. 34. wederom de *Zon*, M de *Maan* en T de *Aarde* zyn, dan zullen de lynen ADH en CBI, welken van den *bovenſten* rand der Zon tot den *onderſten* rand der Maan, en van den *onderſten* rand der Zon tot den *bovenſten* rand der Maan getrokken worden, in de punten H en I, op de oppervlakte der Aarde de limieten aanwyzen, tusſchen welken de Zon-Eclips gezien zal kunnen worden; want elk punt der Aarde, gelegen tusſchen de punten GH en GI, zal een gedeelte der Zon door de Maan zien bedekken; het zyn de punten H en I, welken de randen der Zon en Maan elkander zullen zien raaken, en buiten dewelken 'er geene Eclips hoegenaamd zal te zien zyn; de Maan zal, van het punt a der Aarde gezien, het *Zuidelykſte* gedeelte der Zonneſchyf ſchynen te bedekken, daar de plaats b der Aarde het *Noordelykſte* gedeelte der Zonneſchyf zal zien verduisteren; terwyl eene derde plaats G, de middenpunten der Zon en Maan op elkander ziende, in ſommige gevallen eene *totaale*, in anderen eene *annulaire* Zonverduistering zal



ben, om daar na de omſtandigheden derzelve voor byzondere plaatſen des Aardbodems naar te gaan: om deze reden is het gezegde omtrent de *Zon-Eclipſen* in 't algemeen, § 176. alleen toepaſſelyk op het middenpunt der Aarde. — Naar de verſchillende gezigtspunten, onder welken dezelve de Zon-Eclips gezien wordt, onderſcheid men dezelve in *partiaale* — *totaale* — en *annulaire* — de *partiaale* of *gedeeltelyke* Zonverduistering heeft plaats voor die bewooners der Aarde, welken een gedeelte der Zonneſchyf door de Maan zien verduisteren. — By de *totaale* of *geheele* Zonverduistering wordt de geheele ſchyf der Zon voor ons gezigt door de Maan bedekt; 't welk egter zeldzaam is, omdat de Zon, de Maan zoo veel in grootte overtreffende, meest altoos onder een' grooter' hoek van ons gezien wordt; egter kan dezelve dan plaats hebben, wanneer de Zon op haar' verſten ſtand van onze Aarde, en de Maan in haar' naasten ſtand by onze Aarde is, wanneer de middenlyn der Zon onder een' hoek van 31′ 31″, en die der Maan onder een' hoek van 33′ 30″ door ons gezien wordt, 't geen een verſchil oplevert van 2′, groot genoeg, om voor eenige weinige minuten de Zon geheel voor ons te verbergen; de *totaale* Eclipſen zyn egter zeer zeldzaam: de laatſte, welke te *Parys* gezien wordt, was den 22 May 1724, en men heeft berekend, dat 'er voor het jaar 1900. geene *totaale* Zon-Eclipſen in deze Noordelyke gewesten zullen te zien zyn; — *centraale* Zonverduisteringen vin-

den dan plaats, wanneer de beide middenpunten van Zon en Maan in hetzelvde vlak vallen, met het oog des waarnemers op eene zekere plaats op de oppervlakte der Aarde zich bevindende, van welke dus deze beide middenpunten op elkander gezien worden; zoodanige *centraale* Zon-Eclipſen zyn *totaal*, wanneer de middenlyn der Maan uit de Aarde gezien grooter is dan die der Zon, en *annulair*, wanneer de ſchyf der Maan te klein is, om de geheele Zonneſchyf te bedekken, worden de 'er in dit geval op het oogenblik van het midden der Eclips een' lichtgevenden ring rondom de duistere Maan gevormd.

180. 'Er kan, om de in de laatſte §§ aangehaalde redenen, eene Zon-Eclips van eenig gedeelte der Aarde gezien worden, ſchoon 'er voor het middenpunt der Aarde geen Eclips meer zou plaats hebben, en het is om deze reden, dat men in dit geval de bepaling, *wanneer* 'er een Zon-Eclips kan plaats hebben, en die wy boven § 176. opgaven, veel verder moet uitſtrekken; wanneer de Maan meer dan 21° van een' haarer knoopen verwyderd is, dat is, wanneer derzelver *breedte* grooter is dan 1° 50', kan



181. Men onderſcheid de *Maan-Eclipſen*, naar haare hoegrootheid, ook in *totaale* en *partiaale*, dan de oorzaak van het verſchil der hoegrootheid eener Maan-Eclips hangt geheel af van den afſtand der Maan van haar' knoop, in het oogenblik der conjunctie, gelyk wy § 175. hebben opgegeeven, en dezelvde Maan-Eclips wordt van allen, die de Maan boven hunnen Horiſon hebben, even groot gezien; egter moet men by de Maan-Eclipſen nog in opmerking neemen, dat de ſchaduwe, welke door de lynen CEK en AFL, Fig. 35. van den bovenſten rand der Zon tot den onderſten rand der Aarde, en van den onderſten rand der Zon tot den bovenſten rand der Aarde getrokken, eene ſoort van *byſchaduwe* veroorzaakt, welke de waarneemingen van het begin en einde der Maan-Eclipſen moeilyk maakt, omdat het door deze byſchaduwe bezwaarlyk valt, het juiste oogenblik van het begin en einde der verduistering te bepaalen.

182. Ten einde dus te kunnen berekenen, of 'er eene Eclips voorvallen zal, is het volſtrekt noodzaakelyk, dat men het juiste oogenblik der middelbaare *conjunctie* van *Zon* en *Maan*, dat is, den tyd der middelbaare *Nieuwe Maan* kenne; om voor hetzelve de *breedte* der Maan te kunnen berekenen, ten einde, zoo 'er eene Eclips kan plaats hebben, het tydſtip der *waare* conjunctie naden te berekenen, en die omſtandigheden, welken men van de plaats zullende hebben Eclips begeert te kennen.

183. De *middelbaare Conjunctie der Maan*, noemt men het tydſtip, in hetwelk dezelve zich in zamenſtand met de Zon bevindt, berekend naar de middelbaare beweging der *Maan*, zonder acht te ſlaan op die kleine oneffenheden, welken 'er in den loop der Maan, door de aantrekkingskragt van de *Zon* en *Aarde*, veroorzaakt worden; hoewel nu de Epacten ons den dag der *Nieuwe Maan*, en dus van derzelver *Conjunctie* leeren kennen, § 159. zoo geeven dezelve egter ons dit tydſtip niet naauwkeurig genoeg om daarop te kunnen aangaan: 'er kan ſomts een verſchil zyn van een' geheelen dag tusſchen den tyd der *middelbaare* Conjunctie, welke ons de Epacten geeven, en tusſchen den tyd der *waare* Conjunctie; dit verſchil is te groot in de bereekening der Eclipſen, hoezeer ook anders de Epacten voor het burgerlyk gebruik naauwkeurig genoeg mogen zyn; men bedient zich om die reden van de *Sterrekundige Epacten*, welken ons den tyd der *middelbaare* Conjunctie met meerder naauwkeurigheid doen kennen.

184. De *Sterrekundige Epacten*, van welken wy de Tafel bladz. 130. zullen geeven, zyn niet anders dan de ouderdom der Maan voor het be-

éénen dag behoeft aftetrekken, daar men anders geduurende alle de tien laatſte Maanden éénen dag zou moeten bytellen; men is gewoon alle de Sterrekundige Tafelen op die wyze te bereekenen. — De *Sterrekundige Epacten der Maanden* zyn niet anders dan de ouderdom der Maan, op den 1e. van elke Maand, onderſteld zynde dat de ouderdom der Maan den 31 Dec. 0 uuren 0' 0" is. — De *Epacta* van de Maand *January* is dus *nul* — die voor *February* zal de Maans ouderdom zyn in 't begin van *February*, onderſtellende dat de Maan den 31 Dec. haar' loop begonnen heeft: zy is derhalve dat geen 't welk een geheele Maaneſchyn minder dan 31 dagen is, of één dag 11 uuren 15' 57"; de *Epacta* der Maand *February* is dus 1 dag 11 uuren 15' 57"; wyl de Nieuwe Maan veronderſteld wordt op den 31 Dec. plaats gehad te hebben, valt de Nieuwe Maan van *January* den 29e. ten 13 uuren in, en de Maan is dus den 1 Febr. 1 dag 11 uuren 15' 57" oud; het is op dezelvde wyze, dat de *Epacten* voor alle de overige Maanden berekend worden.

185. Om door middel der Sterrekundige Epacten den tyd der *middelbaare Nieuwe Maan* van eene zekere Maand te bereekenen, moet men de Epacten van de Maand by die van het Jaar optellen, en deze ſom van zoo veele omloopstyden der Maan aftrekken, dat 'er minder dan één omloopstyd, dat is 29 dagen 12 uuren 44', overſchiet; by voorb. men vraagt naar de middelbaare Nieuwe Maan van de Maand May, 1801. zoo

vindt

[illegible] middelbare Eperien

[illegible] 49

[illegible] 59′

[illegible] 44 3

[illegible] uuren 44′ 4″

[illegible] geeft, dat de middelbaare [illegible] May, ten 10 uuren 44′ 4″, [illegible] ware tyd den 12 May, ten 10 [illegible] heeft plaats gehad; indien men [illegible] middelbaare *Volle Maan* wilde [illegible] men flechts by den gevonden tyd [illegible] 10 uuren 44′ 4″, de duuring van [illegible] 14 dagen, 18 uuren 22′ 4″ optetel- [illegible] naastvolgende, of van den gevonden [illegible] trekken, om de naastvoorgaande *Volle* [illegible] bekomen, dus

	12 dagen	10 uuren	44′ 4″
[illegible]id zynde	14	18	22 1

[illegible] men 27 dagen 5 uuren 6′ 5″

[illegible] dat de eerstvolgende Volle Maan, na de [illegible] van den 12 May, voorvalt den 27 May [illegible] 6′ 5″ 's avonds, of

[redacted]

gens heeft plaats gehad; men moet hierby opmerken, dat indien het getal dagen, waarvan men $\frac{1}{2}$ omloop moet aftrekken, minder dan 14 is, men 'er zoo veele dagen moet bytellen, als de laatstvoorgaande Maand dagen telt, omdat het in dat geval zeker is, dat de voorgaande *Volle Maan* in de voorige Maand plaats gehad heeft; men zal even op dezelvde wyze ook den tyd van het *Eerſte Quartier-Maan* vinden, door $\frac{1}{4}$ omloop der Maan of 7 dagen 9 uuren 11' by den tyd der N. Maan by te tellen, en het *Laatſte Quartier der Maan*, door 21 dagen 27' 33", of drie vierde van een' omloopstyd der Maan, by de N. Maan optetellen.

186. Indien men nu weeten wil of 'er ten tyde der gevonden *N. of Volle Maan*, eene Zon- of Maan-Eclips zal plaats hebben, moet men de hoegrootheid van de Breedte der Maan kennen, en daar deze van den afſtand der Maan van haar' knoop, en deze wederom van de Lengte van den knoop afhangt, zoo moet men 1°. de Lengte der Maan zelve. — 2°. de Lengte van den klimmenden knoop der Maan kennen. — 3°. Het Supplement van den knoop der Maan ('t welk men in de plaats der Lengte van den knoop zelven gebruikt, zie § 188.) by de Lengte der Maan bytellende, bekomt men den afſtand der Maan van haaren knoop, of het *Argument van Breedte*; — door welke men ten 4e. op den Breeden rand of *Ecliptica* der Globe zeer gemakkelyk de Breedte der Maan kan vinden.

187. De Lengte der Maan in het oogenblik der *Conjunctie* is gelyk met de Lengte der Zon, § 84.

84. men heeft dus de Lengte der Zon, voor den gegeeven dag der N. Maan, op de Ecliptica der Globe maar optezoeken, volgens § 75. en men zal ook tevens de Lengte der Maan gevonden hebben. —— In de *Oppoſitien*, of by de Volle Maanen, verſchilt de Lengte der Maan 6t met de Lengte der Zon, en men moet dus by de Lengte der Zon voor den dag der *Oppoſitie* 6 tekens bytellen, om de Lengte der Maan te bekomen: dus vinden wy de Lengte der Zon voor den 12 May, ten 20 uuren, 1t 20° 30′: bygevolg is de Lengte der Maan, wanneer zy in haare *Conjunctie* was den 12 May, 1801. 1t 20° 30′. —— voor den 28 April is de Lengte der

Zon	1t	7°	0′
hier bygeteld . .	6	0	0
heeft men . .	7t	7°	0′

voor de Lengte der Maan in haare *Oppoſitie* den 28 April, 1801.

188. De knoopen der Maan loopen, gelyk wy § 140. zagen, in den tyd van 18 Jaaren 228 dagen, 4 uuren 52′ 52″, eens om; men moet dus het tydmerk van haaren ſtand en haare beweging voor elk Jaar, Maand en Dag kennen, om de Lengte derzelve te bepaalen: tot dit einde nu is de VIII. Tafel, achter bl. 132. te vinden, geſchikt; in de 1e. Colom van dezelve vindt men de Tydmerken, *niet van de Lengte van den knoop* voor het begin van elk Jaar, maar van het *Supplement van den knoop*, dat is van den afſtand van den knoop tot het 1e. punt van *Aries*: de

reden dat men den *afstand van den knoop tot het* 1e. *punt van Aries*, welke niet anders is dan het Supplement van de Lengte van den knoop, en niet den *afstand van het* 1e. *punt van Aries tot den knoop*, dat is de Lengte van den knoop zelven, gebruikt, is omdat de beweging van de knoopen der Maan tegen de order der Tekens aan, dat is, achterwaart geschied, en men dus geduurig zou moeten aftrekken, om de verandering van haaren stand voor elke Maand of Dag te kunnen berekenen, daar men, het Supplement gebruikende, slechts de verandering van elke Maand of Dag te addeeren heeft, om de Lengte van den knoop voor een' gegeeven tyd te bekomen; want het is blykbaar dat het Supplement van een' boog moet grooter worden, maarmate de boog zelf kleinder word: daar nu de Lengte der knoopen door haare teruggaande beweging geduurig kleinder wordt, moet noodwendig het Supplement van den knoop grooter worden.

189. Men vindt dus in de 1e. Colom van de VIII. Tafel, de Tydmerken van het Supplement der middelbaare Lengte van den knoop der Maan voor het begin van elk Jaar, dat is voor den 31 Dec. des middags ten 12 uuren, indien het een gemeen Jaar is, en voor den 1e. January, indien het een Schrikkeljaar is, § 184. —— In de tweede Colom vindt men de beweging van den knoop voor elk Jaar, en in de 3e. voor iedere Maand en Dag. — Om dus de Lengte van den klimmenden knoop der Maan voor den 12 May, 1801. te vinden, telt men by het Supplement van

den

den knoop voor 1801, by, de beweging van den knoop voor May, en voor 12 dagen, aldus:

1801.	11t	16°	3′	45″
May . . .	0	6	24	27
12 dagen .	0	0	38	7
en men bekomt . .	11t	23°	6′	19″

voor het Supplement der Lengte van den knoop op den 12 May, 1801; indien het product 12 tekens of meer is, moet men altoos 12 tekens aftrekken, by voorb.

1820 Supplement van den knoop	11t	23°	34′	17″
Aug. . .		11	16	46
1 Dag			3	10
	12t	4°	54′	13″

dus is het Supplement der Lengte van den knoop voor den 1 Aug. 1820, of 4° 54′ 13″; deze aanmerking geld dan altoos, wanneer men gedeeltens van eenen Cirkel by elkander tellende, het product meer dan 360° is, waaraan 12 tekens gelyk zyn. Indien het Jaar, voor het welk men de Lengte van den knoop zoekt, een Schrikkeljaar is, moet men in de twee eerste Maanden één' dag minder neemen, dat is, men moet de Lengte van den knoop voor den 1 Febr. zoeken, wanneer men die van den 2 Febr. wil weeten.

190. Deze gevonden Lengte van den knoop nu telt men by de Lengte der Maan op, om den afstand der Maan van haar' knoop te bekomen. De Lengte der Maan den 12 May was 1t 20° 30′

by de Lengte van den knoop 11 23 6

rest de Afstand der ☾ van den knoop 1t 13° 36′

191.

191. Door middel nu van dezen afſtand der Maan van haar' knoop, 't welk men *het Argument van Breedte* gewoon is te noemen, vindt men op de Ecliptica der Globe de *Breedte* der Maan zelve; te weeten: wy hebben boven, § 75. reeds gezien, dat de Ecliptica der Globe *twee* Hoofdverdeelingen bevat, de buitenſte van welken voor den loop der Maan geſchikt is: deze verdeeling bevat drie Cirkels, als in het midden de verdeeling van de twaalf Tekens der Ecliptica, en ter wederzyde van dezelve eene andere, waarvan de binnenſte voor de beweging der Maan in *Lengte*, en de buitenſte voor de beweging der Maan in *Breedte*; op de middenſte verdeeling nu der Tekens en Graaden van de Ecliptica, zoekt men de Graaden van het *Argument van Breedte*, en ziet welk getal naast hetzelve ſtaat in den buitenſten Cirkel, die voor de beweging der Maan in Breedte geſchikt is, en dit getal zal de Breedte der Maan voor den begeerden dag uitdrukken; dus doende vindt men de Breedte der Maan 3° 30′ 30″, wanneer het *Argument* van Breedte 1ᵗ 13° 36′, gelyk in ons geval, is; voorts moet men nog opmerken dat de *Breedte* der Maan *Noordelyk* is in de 6 eerſte Tekens van het *Argument*, en *Zuidelyk* in de 6 laatſten; dat is, wanneer de afſtand der Maan van haar' knoop minder is als 6ᵗ, is de Breedte altoos *Noordelyk*, en meer als 6ᵗ zynde, is de Breedte *Zuidelyk*. De Breedte dan der Maan voor den 12 May is dus 3° 30′ 30″ Noordelyk, en

'er kan derhalve geen Eclips plaats hebben, § 180.

192. Zie hier een tweede voorbeeld: Men vraagt naar de N. Maan van Maart, 1801. en of 'er by dezelve ook eene Zon-Eclips kan plaats hebben? hier toe zoeke men wederom den dag der Nieuwe Maan, door middel der Sterrekundige Epacten.

Sterrek. Epacten voor 1801.	15 dagen	4 uuren	56'	10"
dito voor Maart.	29	11	15	57
	44 dagen	16 uuren	12'	7"
dit van twee omloopen afgetrokken	59	1	28	6
rest	14 dagen	9 uuren	15'	59"

dus valt de Nieuwe Maan in den 14 Maart, 's avonds ten 9 uuren 15' 59" —— de Lengte der Maan nu op dezelvde wys gezocht zynde als in de 187. § gezegd is, vindt men voor dezelve 11c 22° 45'.

Het tydmerk van den knoop voor 1801. is	11c	16°	3'	45"
beweging voor Maart	0	3	10	38
voor 14 dagen	0	0	44	29

[redacted]

de Ecliptica der Globe 1° 35′ voor de Zuider Breedte der Maan aanwyst. De Maan heeft in dit geval 18° afstand van den knoop in 't oogenblik der Conjunctie, en 'er heeft dus volgens § 180. eenige onzekerheid plaats, of 'er eene Eclips kan voorvallen of niet; (dan naauwkeuriger bereekeningen zouden ons egter in dit geval aanwyzen, dat 'er eene Zon-Eclips moest plaats hebben.) —— Wil men nu weeten, of 'er by de naastvolgende Volle Maan ook eene *Maan-Eclips* heeft plaats gehad, behoeft men slechts by de . . 14 dagen 9 uuren 15′ 59″
welken men voor den tyd van de *Conjunctie* der Maan gevonden heeft,
½ omloop bytetellen . 14 . 18 22 1

29 dagen 3 uuren 38′ 0″
en bekomt voor den tyd der Volle Maan den 29 Maart, 3 uuren 38′ nademiddag —— voor dezen tyd de Lengte der Zon gezocht hebbende, bevindt men dezelve te zyn ☌ 7° 30′ waarby 6 tekens bygeteld zynde, bekomt men voor de Lengte der Maan ☌ 7° 30′; daar nu de Lengte van den knoop den 14 Maart was . 11☊ 19° 58′ 52″
en deszelvs beweging in 14 dagen (zie de VIII. Tafel) is 0 0 44′ 29″

Heeft men 11☊ 20° 43′ 21″
voor de Lengte van den knoop den 29 Maart.
by de Lengte der Maan 6☌ 7° 30′
bygeteld het Supplem. van den knoop 11 20 40

5☌ 28° 10′

vindt men voor het *Argument* van *Breedte* 5ᵗ 28° 10', 't welk ons eene *Noorder Breedte* der Maan van 10' 46" geeft, klein genoeg om eene Maan-Eclipse toetelaaten. § 175.

Eenvouwige Handelwyze, om ten allen tyde de Maans plaats te vinden.

193. Het is door middel der *Sterrekundige Epacten* en de *beweging der Maan in Lengte*, welke men, aan de andere zyden van de verdeeling der Tekens en Graaden, op de Ecliptica der Globe aantreft, dat men ten allen tyde de Lengte der Maan kan vinden, wyl men by de gevonden Lengte van de Maan in haare *Conjunctie* maar zoo veele Graaden heeft bytetellen, als dezelve, zedert zy in *Conjunctie* geweest is, op haaren weg gevorderd is; by voorbeeld, indien men de Lengte der Maan den 29 May, 1801. begeert te weeten, zoekt men eerst den tyd der Nieuwe Maan van May, 1801. welken wy § 185. gevonden hebben te zyn den 12 May, ten 10 uuren 's avonds; nu zyn 'er van 12 tot 29 May 17 dagen verlopen: men zoekt derhalve in den

STERREKUNDIGE EPACTEN.

Om de middelbaare Conjunctie der Maan te vinden.

	Jaaren.	Epacta. D.	U.	M.	S.
v.J.C.	800	11	5	9	14
S	0	6	1	10	1
S	100	1	17	4	35
S	1500	0	1	16	54
S	1600	15	5	55	34
S	1660	18	13	13	6
	1700	9	21	50	8
S	1788	22	15	7	39
	1789	3	17	35	8
	1790	14	8	40	29
	1791	24	23	57	56
S	1702	7	2	25	20
	1793	17	17	36	46
	1794	28	8	48	13
	1795	9	11	15	37
S	1796	21	2	27	4
	1797	2	4	54	28
	1798	12	20	5	51
	1799	23	11	17	21
	1800	4	13	44	44
	1801	15	4	56	10
	1802	25	20	7	37
	1803	6	22	35	1
S	1804	18	13	46	27
	1805	29	4	57	54
	1806	10	7	25	17
	1807	20	22	36	44
S	1808	3	1	4	8
	1809	13	16	15	35
	1810	24	7	27	1
	1811	5	9	54	25
S	1812	17	1	5	52
	1813	27	16	17	18
	1814	8	18	44	42
	1815	19	9	56	9
S	1816	1	12	23	32
	1817	12	3	34	59
	1818	22	18	46	26
	1819	3	21	13	49
S	1820	15	12	25	16
	1900	28	18	23	22
S	2000	24	10	17	58

	Jaaren.	Veran. d. Ep. D.	U.	M.	S.
	1	10	15	11	27
	2	21	6	22	53
	3	2	8	50	17
S	4	14	0	1	44
	5	24	15	13	10
	6	5	17	40	34
	7	16	8	52	1
S	8	28	0	3	27
	9	9	2	30	51
	10	19	17	42	17
	11	0	20	9	41
S	12	12	11	21	8
	13	23	2	32	34
	14	4	4	59	58
	15	14	20	11	25
S	16	26	11	22	51
	17	7	13	50	15
	18	18	5	1	42
	19	28	20	13	8
S	20	10	22	40	32
	21	21	13	51	59
	22	2	16	19	23
	23	13	7	30	49
S	24	24	22	42	16
	25	6	1	9	40
	26	16	16	21	6
	27	27	7	32	33
S	28	9	9	59	57
	29	20	1	11	23
	30	1	3	38	47
S	40	21	21	21	4
S	100	25	4	38	38
	200	20	20	33	14
	300	16	12	27	49
	400	12	4	22	24
	500	7	20	17	0
	600	3	12	11	35
	700	28	16	50	14
	800	24	8	44	49
	900	20	0	39	24
	1000	15	16	34	0
S	2000	1	20	23	57

Get. der Oml.	Som der Oml. D.	U.	M.	S.
½	14	18	22	1,4
1	29	12	44	3
2	59	1	28	6
3	88	14	12	8
4	118	2	56	11
5	147	15	40	14
6	177	4	24	17
7	206	17	8	19
8	236	5	52	22
9	265	18	36	25
10	295	7	20	28
11	324	20	4	31
12	354	8	48	33
13	383	21	32	36

Maanden	Epact. d. M. D.	U.	M.	S.
Janu.	0	0	0	0
Febru.	1	11	15	57
Maart	29	11	15	57
April	1	9	47	52
May	1	21	3	49
Juny	3	8	19	46
July	3	19	35	43
Aug.	5	6	51	41
Sept.	6	18	7	38
Oct.	7	5	23	35
Nov.	8	16	39	32
Dec.	9	3	55	29

Voor de Schrikkeljaaren, moet men de Epacta in de twee eerſte Maanden een dag minder neemen.





Tydmerken van de middelbaare Lengte en beweging van den Knoop der Maan.

Jaaren.	Supplement van den Knoop. T. G. M. S.	Jaaren.	Beweging der Knoop. voor de Jaaren. T. G. M. S.	Maanden.	voor de Maanden. T. G. M. S.
1800	10 26 44 2	S 1	0 19 19 43	Janu.	0 0 0 0
1801	11 16 3 45	2	1 8 39 26	Febr.	0 1 38 29,8
1802	0 5 23 28	3	1 27 59 9	Maart	0 3 10 38,3
1803	0 24 43 1 1	S 4	2 17 22 3	April	0 4 49 8,1
S 1804	1 14 6 5	5	3 6 41 46	May	0 6 24 27,3
1805	2 3 25 48	6	3 26 1 29	Juny	0 8 2 57,1
1806	2 22 45 31	7	4 15 21 12	July	0 9 38 16,2
1807	3 12 5 14	S 8	5 4 44 6	Aug.	0 11 16 46,0
S 1808	4 1 28 8	9	5 24 3 49	Sept.	0 12 55 15,8
1809	4 20 47 51	10	6 13 23 32	Oct.	0 14 30 35,0
1810	5 10 7 34	11	7 2 43 15	Nov.	0 16 9 4,8
1811	5 29 27 17	S 12	7 22 6 9	Dec.	0 17 44 23,9
S 1812	6 18 50 11	13	8 11 25 52	Dagen.	Voor de Dagen.
1813	7 8 9 54	14	9 0 45 35		
1814	7 27 29 37	15	9 20 5 18	1	0 0 3 10,6
1815	8 16 49 20	S 16	10 9 28 12	2	0 0 6 21,3
S 1816	9 6 12 14	17	10 28 47 55	3	0 0 9 31,9
1817	9 25 31 57	18	11 18 7 38	4	0 0 12 42,6
1818	10 14 51 40	19	0 7 27 21	5	0 0 15 53,2
1819	11 4 11 23	S 20	0 26 50 15	6	0 0 19 3,8
S 1820	11 23 34 17	S 40	1 23 40 30	7	0 0 22 14,5
1821	0 12 54 0	S 60	2 20 30 45	8	0 0 25 25,1
1822	1 2 13 43	S 80	3 17 21 0	9	0 0 28 35,8
1823	1 21 33 26	S 100	4 14 11 15	10	0 0 31 46,4
S 1824	2 10 56 20	S 200	8 28 22 30	11	0 0 34 57,0
1825	3 0 16 3	S 300	1 12 33 45	12	0 0 38 7,7
1826	3 19 35 46	S 400	5 26 45 0	13	0 0 41 18,3
1827	4 8 55 29	S 500	10 10 56 15	14	0 0 44 29,0
S 1828	4 28 18 23	S 600	2 25 7 30	15	0 0 47 39,6
1829	5 17 38 6	S 1000	8 21 52 30	16	0 0 50 50,2
1830	6 6 57 49	S 2000	5 13 45 0	17	0 0 54 0,9
1831	6 26 17 32			18	0 0 57 11,5
S 1832	7 15 40 26			19	0 1 0 22,1
1833	8 5 0 9			20	0 1 3 32,8
1834	8 24 19 52			21	0 1 6 43,4
1835	9 13 39 35			22	0 1 9 54,1
S 1836	10 3 2 29			23	0 1 13 4,7
1837	10 22 22 12			24	0 1 16 15,3
1838	11 11 41 55			25	0 1 19 26,0
1839	0 1 1 38			26	0 1 22 36,6
S 1840	0 20 24 32			27	0 1 25 47,3
1841	1 9 44 15			28	0 1 28 57,9
				29	0 1 32 8,5
				30	0 1 35 19,2

Voor de Schrikkeljaaren moet men in de twee eerſte Maanden een dag minder neemen.



vindt men dat de Lengte der Maan den 29 May, des avonds ten 10 uuren, is 9t 4° 44′ —— De Breedte der Maan op dien zelvden tyd word't op de boven omſchreven manier gezocht; wy hebben § 189. de Lengte van den knoop voor den 12 May bevonden te zyn . . 11t 23° 6′

beweging in 24 dagen 0 1 16

Lengte van den knoop den 29 May 11t 24° 22′

Lengte der Maan . . 9t 4° 30′

by de Lengte van den knoop 11 24 22

Argument van Breedte 8t 28° 52′

waarmede de Breedte der Maan gezocht zynde, vindt men voor dezelven den 29 May, ten 10 uuren 's avonds 5° 8′ 4″; daar nu de beweging der Maan in Lengte *voor éénen dag* 13° 10′ 35″ en dus nagenoeg 33′ in elk uur is, kan men zeer gemakkelyk derzelver lengte voor elk begeerd uur kennen; dit omtrent de Breedte ook willende weeten, zou men de Breedte der Maan voor twee dagen, die elkander volgen, moeten zoeken, en het verſchil door 24 uuren deelen, 't geen ons de *Uurbeweging der Maan* in *Breedte* voor dien dag zou geven.

Van de Eb en Vloed der Zee.

194. De loop der Maan, en haare aantrekkingskracht op onze Aarde, is nog oorzaak van een verſchynſel, 't welk wy, indien wy ons aan den oever der Zee of in eenige Haven bevinden, da-

gelyks kunnen waarneemen, en 't geen ons zoo lang wy de oorzaak van hetzelve, niet kennen, wonderlyk ſchynen moet: het is namentlyk de af- en toeneemende hoogte van de wateren der Zee, en van het water in elke Haven, die met de open Zee gemeenſchap heeft. De Zee wascht tweemaal, en daalt tweemaal ieder' dag; deze beweging der Zee is het, welke men *Eb* en *Vloed* gewoon is te noemen; wanneer de Zee wascht, dat is hooger wordt, noemt men dit *Vloed*, en wanneer dezelve weder daalt, noemt men dit *Eb*; de *Eb* en *Vloed* te zamen genomen maaken een *Getyde* uit, zoo dat men in éénen dag of 24 uuren twee *Getyden* heeft.

195. Het is de aantrekkingskracht der *Maan* op de wateren der Zee, welke dit verſchynſel voortbrengt; de Maan op het meer vloeibaare gedeelte van de Maſſa der Aarde, zoo wel als op het vaste, haare aantrekkingskracht oefenende, trekt dit vloeibaare gedeelte, dat is het water, tot zich, zoo dat het zich boven de gewoone oppervlakte verheft, en het is deze verheffing van de wateren der Zee, welke wy Vloed noemen; laat ABCD Fig. 42. de Aarde verbeelden, dan zal



eene Ellipsvormige gedaante EHFG aan: de reden hiervan is deze, dat gelyk de Maan de boven wateren GEH meer aantrekt als het middenpunt T der Aarde, zy ook het centrum T der Aarde meer naar zich trekt als de van dezelve afgekeerde oppervlakte der Zee GFH, welke daardoor even veel achter het middenpunt T blyft, als het gedeelte GEH boven hetzelve verheven is; en daar alle Cirkelen der Aarde, die hunne gemeene ſneede naar de Maan gericht hebben, volgens de leer der aantrekkingskracht, dezelvde gedaante aanneemen, zoo vloeit daaruit voort dat de geheele Maſſa van water de gedaante van eene *Ellipſoïde* FGEH aanneemt, welker groote As FE beſtendig naar de Maan toegekeerd is, en zich dus in 24 uuren één's rondom de Aarde beweegt; had het geen plaats dat het gedeelte der Zee GFH, dat van de Maan is afgekeerd, zich even zeer verhief als het gedeelte GEH, dat naar de Maan is toegekeerd, dan konde 'er ook geen *twee Getyden* in één etmaal, of, naauwkeuriger geſproken, in één' Maandag, dat is van den eenen doorgang der Maan door den Meridiaan tot den naastvolgenden, plaats hebben.

196. Even nu gelyk de *Maan* op de wateren der Zee haar aantrekkingsvermogen oefent, zoo oefent de *Zon* hetzelve van gelyken, doch in een' veel minderen graad, doordien de afſtand der *Zon* veel grooter van ons is dan de afſtand der *Maan*, waarom men berekent dat de aantrekkingskracht der *Maan* driemaal zoo groot is

hangt af van den afſtand der *Zon* en *Maan*, welke men dus tevens bekend behoort te hebben; ook maakt de *afſtand der Maan* van onze Aarde eenig verſchil in den tyd van het hoogſte water, waarom wy hier nevens eene Tafel zullen laaten volgen *van het verſchil van tyd dat het hoogſte water vroeger of laater voorvalt, op verſchillende afſtanden der Zon en Maan, en op de verſchillende afſtanden der Maan van onze Aarde.* — Waarby wy tevens eene Alphabetiſche Lyst zullen voegen van *den tyd van het hoogſte water, op den dag van Nieuwe en Volle Maan, voor onderſcheiden Zeehavens*, waarna wy, met een paar Voorbeelden omtrent het gebruik dezer Tafels, dit Hoofdſtuk zullen beſluiten.



Tafel van het verſchil van tyd, dat het hoogſte Water vroeger of laater voorvalt, op verſchillende afſtanden der Zon en Maan, en op de verſchillende afſtanden der Maan van onze Aarde.

Afſtand der Zon en Maan, als zy door den Merid. gaat.		de MAAN in haare Perigeum.	de MAAN in haare middelbaare afſtanden.	de MAAN in haar Apogeum.
Tek.	Gr.	Minuten.	Minuten.	Minuten.
☌	0	18 na	22 na	27½ na
	10	9½ na	11½ na	14 na
	20	0	0	0
I.	0	9½ voor	11½ voor	14 voor
	10	18 voor	22 voor	27½ voor
	20	26 voor	31½ voor	39½ voor
II.	0	33 voor	40 voor	50 voor
	10	37½ voor	45 voor	56 voor
	20	38½ voor	46½ voor	58 voor
III.	0	33½ voor	40½ voor	50½ voor
	10	25 voor	25 voor	31 voor
	20	0	0	0
IV.	0	21 na	25 na	31 na
	10	33½ na	40½ na	50½ na
	20	38½ na	46½ na	58 na
V.	0	37½ na	45 na	56 na
	10	33 na	40 na	50 na
	20	26 na	31½ na	39½ na
VI.	0	18 na	22 na	27½ na

Tafel van het Uur van hoog Water voor onderſcheiden Havens, op den Dag van Nieuwe en Volle Maan.

	U.	M.
Amſterdam, *in de Bataafſche Republiek.*	3	0
Ambleteuſe, *in Vrankrijk.* . .	11	0
Antwerpen, *in Vrankrijk.* . .	6	0
Archangel, *in Rusland.* . .	6	0
Baltimore, *in Ierland.* . .	5	15
Bayonne, *in Vrankrijk.* . .	3	30
Brest, *idem.* . .	3	45
Boulogne, *idem.* . .	11	0
Bristol, *in Engeland.* . .	6	45
Barwich, *idem.* . .	3	0
Brielle, *in de Bataafſche Republiek.*	1	30
Bourdeaux, *in Vrankrijk.* . .	3	0
Cancale, *idem.* . .	6	0
Cherbourg, *idem.* . .	7	30
Calais, *idem.* . .	11	30
Cadix, *in Spanje.* . .	4	30
Canariſche Eilanden. . .	3	0
Cowes, *op 't Eiland Wight.* .	10	30
Dieppe, *in Vrankrijk.* . .	10	30

[redacted]

	U.	M.
Gravelines, *in Vrankrijk.*	0	0
Havres de Grace, *idem.*	9	0
Hamburg, *in Duitschland.*	6	0
Kaap de Goede Hoop, *Afrika.*	2	30
Kusten van Gascogne en Poitou.	3	0
Kinsale, *in Ierland.*	5	15
La Rochelle, *in Vrankrijk.*	3	45
Lime, *in Engeland.*	8	0
Lisfabon, *in Portugaal.*	2	15
Londen, *in Engeland.*	3	0
Morbihan, *in Vrankrijk.*	3	0
Mont- St. Michel, *idem.*	6	30
Milfort, *in Engeland.*	6	0
Madera, (Eil.) *in den Alt. Oceaan.*	12	4
Mond van de Seine, *in Vrankrijk.*	9	0
Mond van de Somme, *idem.*	11	0
Mond van de Severne, *in Engeland.*	6	0
Mond van den Theems, *idem.*	12	0
Mond van de Maas, *in de Bat. Rep.*	1	30
Mond van de Loire, *in Vrankrijk.*	3	0
Nieupoort, *idem.*	11	45
Newcastle, *in Engeland.*	3	0
Nantes, *in Vrankrijk.*	3	0
Noordkaap, *in Zweeden.*	3	0
Olonne, *in Vrankrijk.*	3	15
Oftende, *idem.*	11	45
Plymouth, *in Engeland.*	6	0
Portland, *idem.*	8	0
Portsmouth, *idem.*	11	15
Quebec, *in Amerika.*	7	30
Rouen, *in Vrankrijk.*	1	15

	U.	M.
Rochefort, *in Vrankrijk.*	4	15
Rotterdam, *in de Bataafſche Republiek.*	3	0
St. Malo, *in Vrankrijk.*	6	0
St. Paul-de-Leon, *idem.*	4	0
Veymouth, *in Engeland.*	9	0
Vliſſingen, *in de Bataafſche Republiek.*	12	30
Waterfort, *in Ierland.*	10	38
Yermouth, *in Engeland.*	1	30
Yorck, (New-) *in Amerika.*	3	0
Zeeuwſche Eil., *in de Bataafſche Republiek.*	1	0

199. I. VOORBEELD. Men vraagt naar den tyd van het hoogſte water den 20 May, 1801. te Amſterdam

Uur van de plaats	3 uuren	0′
tyd van den doorgang der Maan door den Meridiaan	6	16′

geeft den tyd van het hoogſte water middelbaar ten 9 uuren 16′'s avonds; de afſtand der Zon en Maan was op dien tyd 2ᵗ 28°, en de Maan was in haar *Apogeum*, deze 2ᵗ 28° gezocht in de Tafel van het verſchil [redacted] Tyd bl. 129. in de Colom van het *Apogeum*

II. VOORBEELD. Men vraagt naar den tyd van het hoogſte water te Amſterdam, 30 Juny, 1801.

Uur van de plaats . .	3 uuren 0′
tyd van den doorgang door den Meridiaan . . .	16 uuren 33′
	19 uuren 33′

de afſtand der Zon en Maan was op dien tyd 3ᵗ 20°, en de Maan was in haar *Perigeum*, waarom 'er dus voor den gevonden tyd volgens de Tafel bl. 139. de verbetering 0 is, zoodat het hoogſte water den 20 Juny, 1801. te Amſterdam voorvalt, ten 19 uuren 33′, dat is in burgerlyken tyd den 1 July, des morgens ten 7° 33′.

200. Om te weeten of de *Maan* in haar *Apogeum*, in haar *Perigeum* dan wel in haare middelbaare afſtanden is, moet men de plaats van het *Apogeum* der Maan kennen: de Lengte van hetzelve was voor het begin van 't jaar 1800. 1ᵗ 15° 28′ 7″; men moet voor elk jaar 1ᵗ 10° 39′ 50″, by de Lengte van het *Apogeum* voor het jaar 1800 bytellen, en zal dus, door eene eenvoudige additie de Lengte van het *Apogeum der Maan* voor het begin van elk Jaar kunnen vinden, 't geen voldoende zal zyn voor de berekening der *Eb* en *Vloed*; wy zullen, over het gebruik der Globen handelende, nadere gelegenheid hebben hieromtrent voorbeelden te geeven.

III. HOOFDSTUK.

VERGELYKING VAN DE NIEUWE CONSTRUCTIE DER AARD-GLOBE MET DE OUDE.

201. Zal men zich een recht denkbeeld vormen van onze *nieuwe* Conſtructie der Aard-Globe, het waare oogmerk dat wy ons met dezelve voorſtelden, en het onderſcheid dat 'er in dezelve is met de gewoone wyze waarop de Aard-Globe is te zaamen geſteld, dan moet men dezelve vergelyken met de *oude* Conſtructie; wy hebben in het I. Hoofdſtuk van dit Boek, de beſchryving van deze nieuwe Conſtructie gegeeven, en wy willen dit Hoofdſtuk beſteeden om dezelve met de oude te vergelyken.

202. Wanneer wy de Aard-Globe, welke Fig. 40 is afgebeeld, zoo als dezelve naar de oude Conſtructie vervaardigd werdt, beſchouwen, dan zien wy dat dezelve even als onze nieuwe Globe door een' breeden Horiſontaal liggenden rand,

in den ſtoel van de rechter- naar de linkerhand, of van de linker- naar de rechterhand bewegende, verheft men de Pool D der Globe meer of min boven den Horiſon, en de boog AD wordt dus grooter of kleinder; de Globe op deze wyze bewogen wordende, en de Noordpool B. V. op $52\frac{1}{2}^{\circ}$ boven den Horiſon verheven wordende, wordt de rand ABC Horiſon van alle plaatſen, welker *Noorder Breedte* $52\frac{1}{2}^{\circ}$ is. —— De koperen Cirkel DCEA, in welken de beide Poolen der Globe D en E zyn vastgemaakt, is een *algemeene Meridiaan*, wanneer wy nu de Globe om haare Poolen zoo ronddraaijen, dat *Amſterdam*, welks Noorder Breedte 52° $30'$ is, onder dezen *Meridiaan* komt, dan is de rand ABC bepaaldelyk *Horiſon van Amſterdam*, en de Cirkel ADCEA *Meridiaan van Amſterdam*; dan, draaijen wy maar even de Globe verder voort, zoo houd de rand ABC op *Horiſon van Amſterdam* te zyn; hy blyft wel Horiſon van eene zekere plaats op $52\frac{1}{2}^{\circ}$ N. B. gelegen, maar geenzins van *Amſterdam*, en dit is wezenlyk het gebrekkige in deze Conſtructie der Globe; daar en boven is het ook niet waar, dat, gelyk deze Globe in den Horiſon draait, onze Aarde alzoo draait, terwyl de Horiſon ſtandvastig ſtaan blyft: de Horiſon van eene zekere plaats blyft altoos dezelvde betrekking tot die plaats behouden, en draait met de Aarde rond; de Horiſon dus ſtil te laaten ſtaan, en de Globe in denzelven zich te laaten bewegen, veroorzaakt een valsch denkbeeld, en doet ook in het oplosſen der Problema's dat Effect, dat dezelven niet volkomen met den aart der zaak overeenkomſtig kunnen wor-

den opgelost; gelyk daarom ook de Aard-Globe naar de *oude* Conſtructie niet geſchikt is om den *Op-* en *Ondergang* der Zon by voorb. te vertoonen, wyl men daartoe van de Ecliptica, die op de Aard-Globe zelve is afgebeeld, zou gebruik moeten maaken, 't geen dan zou doen ſchynen alsof de Zon tegelyk met de Aarde zich rond bewoog, 't geen zeer verkeerd zou zyn; ook zou alsdan de Zon geduurende een' geheelen dag in 't Zenith van dezelvde plaats moeten zyn, 't geen ook zoo niet is, daar de Zon elk oogenblik recht boven eene *andere* plaats ſtaat.

203. Dit is in onze nieuwe Conſtructie verholpen: de Horiſon blyft niet ſtaan terwyl de Aard-Globe in denzelven ronddraait; de Horiſon draait met de Globe zelve om, en eens geſteld zynde om den Horiſon van eene zekere plaats te verbeelden, blyft hy zulks ſtandvastig, tot dat men denzelven eene andere richting geeft; ook gevoelt men van zelfs dat men de Globe, op de oude manier gemonteerd, geene beweging hoegenaamd met haar' Horiſon kan geven, en dus in dit opzigt van denzelven naar behooren geen gebruik kan maaken; ook komt daarenboven de verdeeling der Tekens

gen, rust dan de oude Conſtructie der Aard-Globe op eene geheel valſche onderſtelling, of welke is de Hypoteſe, welke men by de Conſtructie derzelve gebezigd heeft? — Geheel valsch is dezelve niet, maar zy is verkeerd toegepast; wy hebben te vooren, door onze beſchouwing van den loop der *Aarde* om de *Zon*, en van derzelver ſtand met betrekking tot het vlak van derzelver loopkring, zoo wy vertrouwen volkomen overtuigend, doen zien, dat de *nieuwe* Conſtructie der Aard-Globe volkomen met den ſtand der Aarde overeenkomſtig is; paſſen wy dit toe, op de *Hemel*-Globe, dan zullen wy nader ontdekken welke de grondſlag is der oude inrichting der Aard-Globe.

204. Beſchouwen wy de Aard-Globe, zoo als dezelve Pl. VIII. wordt afgebeeld, als onze Aarde verbeeldende, dan zullen alle de Cirkels, die dezelve omringen, de *Hemel-Globe* verbeelden, die als 't waare de *Aard-Globe* omringd, en wy zouden dusdoende in het midden der *Hemel-Globe*, ook eene Aard-Globe, op dezelvde wyze vervaardigd, moeten plaatſen, om het geen hier ſlechts door Cirkels wordt afgebeeld, wezentlyk aan het oog voorteſtellen; dan men gevoelt welligt dat eene zoodanige Conſtructie van geen nut altoos zou zyn, want de *Aard-Globe* zou door de *Hemel-Globe* onzigtbaar gemaakt worden, en alle de Sterrenbeelden zelven, die naar den aart der zaak binnen in de *Hemel-Globe* zouden moeten afgebeeld worden, zouden mede onzigtbaar worden; het was derhalve nodig dat men, wilde men den

ſtand der vaste Sterren op eene Globe afbeelden; denzelven niet binnen in de holligheid der Globe, maar op derzelver oppervlakte afteekende, en was tevens verpligt de beweging der benodigde Cirkels van de *Aard-Globe*, die men onderſtellen moet binnen in de *Hemel-Globe* geplaatst te zyn, naar buiten zigtbaár te maaken, 't geen dan voldoende geſchied, wanneer de vlakken van de *Meridiaan* en *Horiſon*, die de Aard-Globe omringen, máar tot buiten de *Hemel-Globe* verlengd worden, en dus de Cirkels, die men buiten de *Hemel-Globe* plaatst, maar in dezelvde vlakken gelegen zyn met die Cirkels der *Aard-Globe*, welken zy verbeelden zullen.

205. Laat ons veronderſtellen dat P Z S N K Fig. 41. de doorſnede zy van eene *Hemel-Globe*, in dewelke de *Aard-Globe* A B C D geplaatst zy, zoo dat dezelve zich in de *Hemel-Globe* om den As O P p Q vryelyk bewegen kan; dat D B de *Horiſon* en E F G H de *Meridiaan* zy van eene zekere plaats; verlengen wy nu het vlak van den *Horiſon* D B ter wederzyde tot in L en M, en trekken wy in dit vlak een' Cirkel rondom de *Hemel-Globe*; dan zal, alſchoon wy de geheele *Aard-Globe* met der-

Hemel-Globe zigtbaar overbrengen, en dit is waarlyk juist hetgeen men in de Conſtructie der *Hemel-Globe* gedaan heeft, met dit onderſcheid egter dat men de Cirkels doet ſtilſtaan, en de Globe zich in dezelven laat bewegen, 't geen dezelvde verſchynſels veroorzaakt; zie hier in dezen Cirkel A B C Fig. 40. werklyk het vlak van den *Horiſon* der Aarde, dat, verlengd zynde, zich buiten de *Hemel-Globe* als een Cirkel vertoont, en in dezen koperen Cirkel D C E A den *Meridiaan* mede in hetzelve vlak van den *Meridiaan* der *Aard-Globe* getrokken; dan deze beide vlakken zyn, gelyk wy zoo even zeiden, onbeweeglyk, terwyl de Globe zich IN dezelven beweegt: dit ſchynt dus nog niet overeenkomſtig onze boven gegeven verklaring, dan men merke hierop aan, dat men in deze Conſtructie niet de *waare* maar de *ſchynbaare* beweging gevolgd heeft, en dit is de reden, dat de *Hemel-Globe*, en niet de Cirkels, die dezelve omringen, (welken eigenlyk tot de *Aard-Globe* behooren), zich beweegt; men zou zeker ook de *Hemel-Globe* zodanig kunnen inrichten, dat dezelve de Problema's naar de *waare* beweging oploste; doch dan zou het gebeuren dat men ſoms die Sterren, welken wy in ons *Zenith* recht boven ons Hoofd zien, aan de onderſte oppervlakte der Globe moest zoeken, waarom wy om deze gelyk ook om andere redenen, voor de Hemel Globe de gewoone ſtructure, als de beste, behouden.

206. Het is deze *ſchynbaare* beweging des Sterrenhemels, welke men ook op de Conſtruc-

tie der *Aard-Globe* heeft toegepast, en waar uit de inrichting der *Aard-Globe* is voortgeſprooten, zoo als men dezelve gewoonlyk gebruikt; dan indien wy de zaak wat dieper doorzien, dan is het eigenlyk gezegd nog *ſchynbaare* nog *waare* beweging, welke men door de gewoone *Aard-Globe* afbeeld; want by de *ſchynbaare* beweging komt geene beweging der Aarde om haar' As te pas, gelyk men die egter aan de Globe geeft, en om de *waare* beweging aftebeelden, moet men de *Aard-Globe* door de *Ecliptica* doen omringen, gelyk wy gedaan hebben, wil men den ſtand der *Zon*, der *Maan*, of van eenige *Ster* voor een zeker gedeelte der Aarde bepaalen; 't is waar, de *Heer* ADAMS gebruikt ook den *Horiſon* van zyne *Aard-Globe* wel eens voor de *Ecliptica*, doch in dat geval mist men dan geheel den *Horiſon*, en veroorzaakt door deze verwisſeling wellicht verwarring voor den leerling; gebruikt men den Horiſon voor den Cirkel, welke het verlichte en onverlichte gedeelte der Aarde affcheid, gelyk de *Heer* ADAMS mede in ſommige gevallen doet, dan mist men en *Ecliptica* en *Horiſon*, en men verliest dus daardoor de gelegendheid om de betrekkingen te verklaaren, welken deze Cirkels geduurig tot elkander hebben, terwyl men ook nimmer in ſtaat is, het naauwe verband tuſſchen Sterre- en Aardrykskunde zoo duidelyk aantetonen, als wanneer men en *Ecliptica* en *Horiſon* en *Equator* geduurig voor zich ziet.

207. Onze nieuwe *Aard-Globe* vereenigt dus, als 't waare, de *Hemel-* en *Aard-Globe* te zamen,

men, vertoont ons de *waare* beweging der Aarde, en lost de oorzaaken der Hemelſche verſchynſelen op die wijze op, als wy dezelve ons door de beweging der Aarde veroorzaakt moeten voorſtellen plaats te hebben; terwyl de *Hemel-Globe*, naar de gewoone inrichting, dat is naar die van den *Heer* ADAMS, (want deze is zeker boven de oudere te ſtellen), ons de ſchynbaare beweging verklaart, en geſchikt is om by de beſchouwing van de *ſchynbaare* beweging des Hemels gebruikt te worden, tot welke beſchouwing wy nu overgaan.

IV. HOOFDSTUK.

BESCHRYVING VAN DE HEMEL-GLOBE, AFGELEID UIT DE SCHYNBAARE BEWEGING DES HEMELS.

208. Men is gewoon in de Sterrekunde tweeërlei beweging te onderſcheiden, de *waare* en de *ſchynbaare* beweging. — De *waare beweging* is die der Aarde, van dewelke wy in het I. *Hoofdſtuk* van dit Boek geſproken hebben, en welke door onze nieuwe *Aard-Globe* wordt afgebeeld; en de *ſchynbaare beweging* is die des Hemels, welke door de *Hemel-Globe* vertoont wordt en van welke wy in dit *Hoofdſtuk* moeten ſpreeken.

209. De *ſchynbaare* beweging is die, welke wy elken dag en elk oogenblik kunnen waarnemen, en volgens welke wy de *Zon*, *Maan* en

Sterren dagelyks zien op- en ondergaan; wy zien volgens dezelve den ganſchen Sterrenhemel in 24 uuren zich rondom ons bewegen, volgens dezelve de *Zon* in 365 dagen de 12 Teekens der *Ecliptica* doorloopen, de *Planeten* geduurig van ſtand veranderen, en eenen onvasten loop behouden, en de *Maan*, van de eene Ster tot de andere gaande, na verloop van eenige dagen weder tot dezelvde Ster wederkeeren, en, in één woord, alle die verſchynſelen, welken wy by eene aandachtige beſchouwing des Sterrenhemels kunnen waarneemen.

210. Het is de waarneeming van de *ſchynbaare* beweging des Hemels, welke ons tot de kennis van de *waare* beweging en van derzelver wetten heeft moeten brengen, en eene aandachtige beſchouwing derzelve, geholpen door eenige aanleiding tot opmerking, afgeleid uit het te vooren geſtelde, zal ons in ſtaat kunnen ſtellen, om proefondervindelyk de waarheid van het te vooren gezegde omtrent den loop van onze Aarde, de Maan en de overige Planeeten te leeren kennen; zal men egter van deze beſchouwing eenige wezenlyke vrucht trekken, dan moet dezelve gepaard gaan met daadelyke waarnemingen aan den Sterrenhemel zelven, geholpen door de waarnemingen van anderen vóór ons, wyl onze leeftyd te kort zoude zyn, om waarneemingen te doen, die op een' genoegzaamen afſtand van tyd van elkander zyn, om met zekerheid de bewegingen der Hemelſche Ligchaamen te bepaalen; eeuwen zyn 'er verloopen, eer men in de Sterre-

kun-

kunde tot die hoogte gekomen is, dat men de beweging der Planeeten en zelfs der Maan, die ons zoo naby is, naauwkeurig heeft kunnen bepaalen, en de waarnemingen doen van tyd tot tyd ons dezelve nog naauwkeuriger kennen; met dit al moet men het zich nimmer als onmogelyk voorſtellen, om door eigen waarnemingen te kunnen bevestigd worden in de zekerheid van het geen door de Sterrekundigen als waarheid worde voorgedragen: hiertoe is voor een' ieder gelegendheid, die zich daar toe eenigen tyd wil gunnen, en wy willen trachten in dit Hoofdſtuk daartoe behulpzaam te zyn; wy zullen, om duidelyk te zyn in onzen lezer zoo weinige kundigheden veronderſtellen als mogelyk is, alleenlyk begeerende dat hy geen volſtrekte vreemdeling zy in de eerſte beginſelen der *Aardryksкunde*, ten minſte eenige *Mathematiſche* kennis hebbe, en inzonderheid de *Eerſte beginſelen* der *Spheer*, zoo als zy in het I. Hoofdſtuk van dit Werkje voorkomen, verſta.

211. Eer wy egter tot deze beſchouwing overgaan, moeten wy de plaats kennen, van dewelke wy onze waarneemingen doen, en de hulpmiddelen, die ons in het doen derzelve van dienst kunnen zyn. — Wanneer wy ons verledigen om den Sterrenhemel met een aandachtig oog te beſchouwen, en derzelver bewegingen op te merken, begeven wy ons op eene open vlakte, waar geene gebouwen, boomen of andere beletſelen ons hinderen de Sterren aan alle oorden des Hemels gade te ſlaan; wy bevinden ons op de

oppervlakte der Aarde, en worden alsdan door niets in ons gezigt belet, dan door de ſchynbaare vereeniging van Lucht en Aarde, welke, rondom onze ſtandplaats zich uitſtrekkende, eenen Cirkel vormt, wiens vlak als de ſtandplaats onzer beſchouwing moet worden aangemerkt; men noemt dit vlak de *Horiſon*, en wy hebben dezelve § 106. reeds leeren kennen, en willen hier niet herhaalen 't geen wy daar reeds gezegd hebben; men herleeze dus hier bepaaldelyk die § §, en beſchouwe dezelven als hier tusſchen gevoegd; de *Horiſon* is dus het eerſte vlak, 't welk men, om de *ſchynbaare* beweging des Hemels waarteneemen, moet leeren kennen, gelyk het, het vlak van de *Ecliptica* is, 't welk men het eerst moet kennen, als men de *waare* beweging naarſpoort, § 70. In den Hemel-Globe is daarom ook de *Horiſon*, Horiſontaal, dat is. waterpas geplaatst; het is de Cirkel ABC, Fig. 40, welke de *Hemel-Globe* omringt, en in welken deze als in een' ſtoel geplaatst is; de voornaamſte verdeeling van den *Horiſon*, welke men zich behoort eigen te maaken, is die naar de vier hoofdſtreeken van 't Compas: men behoort de plaats van het *Zuiden*, van het *Noorden*, van het *Oosten* en van het *Westen*, daar, waar men zyne waarneemingen doet, weeten aantewyzen: men kan zich daartoe van een Compasje bedienen, en behoort zich daarby te herinneren, dat het voornamentlyk in het *Zuiden* is, in het welke de meeste Sterrekundige waarnemingen gedaan worden; kent men de vier Hoofdſtreeken des winds, dan zal het vervolgens niet

niet moejelyk zyn ook de tusſchenſtreeken, en dus alle de 32 ſtreeken, in dewelken de *Horiſon* der *Hemel-Globe* verdeeld is, te leeren kennen.

212. Alle de Sterrekundige waarneemingen berusten op het nemen van de hoogte der Sterren boven den Horiſon, en het meeten van zekere hoeken, waarom men zich dus een juist denkbeeld behoort eigen te maaken, wat de hoogte der Sterren is, en hoe men dezelve gewoonlyk meet; wy zullen daardoor een paar eenvouwige werktuigen leeren kennen, die ons in het doen der waarnemingen behulpzaam, en zelfs onontbeerlyk zyn. Wanneer men op de lyn AB Fig. 43. eene andere AC trekt, dan maaken deze lynen te zamen, in A, een' hoek, welke gemeten wordt, door den boog BC, die uit A als centrum getrokken wordt; beſchouwt men AB als den *Horiſon*, dan is de lyn AC de lyn, langs welke wy eene zekere Ster C zien, en de boog BC is de hoogte dier Ster boven den *Horiſon*, die dus gelyk is aan den hoek CAB; dan, hoe meet men nu dezen hoek CAB aan den Hemel? Om dezen hoek te meeten, bedient men zich van een werktuig, 't welk men een *Quadrant* noemt: men ziet het zelve in de 44. Fig. afgebeeld; het beſtaat uit een' Cirkelboog AB, welke naauwkeurig het $\frac{1}{4}$ gedeelte van een' Cirkel uitmaakt, en in 90° verdeeld is; aan dezen Quartcirkel is een Winkelhaak AE, EB vastgemaakt, en uit C, het welk het middenpunt van den boog AB zyn moet, hangt eene loodlyn CD, aan wier onderſte gedeel-

deelte een gewigt hangt, het welk de loodlyn te lood doet neder hangen.

213. De lyn AE van het *Quadrant* gebruikt men, om langs dezelve naar de Ster S te zien, en als dan wyst de loodlyn CD op den boog AB, de hoogte der Ster S aan, zoodat de hoek BCD gelyk is aan de hoogte der Ster S; laat ons dit door een voorbeeld duidelyker maaken: AB, Fig. 43. zy de *Horiſon;* C eene zekere Ster, welke langs de lyn AC van den Waarnemer gezien wordt; acb is dan het *Quadrant*, zoo even door ons omſchreven; ac de zyde van het *Quadrant*, langs dewelke men naar de Ster C. ziet, en ce de loodlyn; dan zeggen wy zal de boog be gelyk zyn aan de hoogte der Ster, dat is aan den hoek CAB; dat dit zoo is, kan men gemakkelyk uit de eigenſchappen der driehoeken bewyzen, want verlengen wy ce tot in d, dan zal Acd een rechthoekige Driehoek zyn, waarvan de hoek d recht is, en dus de twee overige hoeken te zaamen gelyk 90°; daar nu de boog ab uit c als Centrum getrokken is, zoo is de hoek c gelyk de boog ae, en de boog eb is het *Compliment* van den boog ae, en dus gelyk



214. Indien men egter zich van dit Quadrant met meer gemak bedienen wil, dan moet hetzelve op een' voet geſteld worden, en tot een werktuig ingericht, zoo als hetzelve in de 45ſte. Fig. wordt afgebeeld, —— IHG is een kruisvoet, van drie Schroeven I, H en G voorzien: deze voet draagt het geheele Werktuig, en de Schroeven zyn geſchikt om hetzelve behoorlyk Waterpas te kunnen ſtellen; op dit kruis ligt een ronde Cirkel FE, welke in graaden verdeeld is; op dezen Cirkel FE is de rechtſtandige Standaart AB geplaatst, welke in het centrum des Cirkels FE beweegbaar is, en door een' wyzer BC, op denzelven de graaden aanwyst; aan den Standaart AB is het Quadrant DKL, in C vastgemaakt, om dit punt C als centrum beweegbaar, terwyl MN de Loodlyn is, van dewelke wy reeds geſproken hebben.

215. Begeeven wy ons nu, van dit werktuig voorzien, naar het open veld, of naar eene andere geſchikte plaats, om van dezelve een ruim gezigt van den Sterrenhemel te kunnen hebben; plaatſen wy ons zoo dat wy het *Zuiden* recht voor ons hebben, dat is met het aangezigt naar hetzelve toegekeerd zyn; dan hebben wy aan onze linkerhand het *Oosten*, aan de rechterhand het *Westen*, en agter onzen rug het *Noorden;* vestigen wy onze aandacht inzonderheid op de eene of andere heldere Ster, die in glans boven de anderen uitmunt, en wel inzonderheid op deze, die in het *Zuid-Oosten* eenige graaden boven den *Horiſon* door derzelver glans onze aandacht tot zich trekt,

trekt (*), meeten wy met ons Quadrant derzelver hoogte; dit geſchied op deze wyze dat men, het Quadrant waterpas geſteld hebbende, hetzelve naar de Ster toekeert, en hetzelve die helling geeft, dat men de Ster door de vizieren P en O zien kan, dan zal de loodlyn ons aanwyzen dat de hoogte dezer Ster 24° is. — Eene tweede Ster, op eene grootere hoogte, genoegzaam recht boven de eerſte, trekt vervolgens onze aandacht: wy meeten almeede derzelver hoogte, en vinden dezelve te zyn 68°. — Dan eer wy onze waarnemingen verder voortzetten, moeten wy eene aanmerking maaken; wanneer wy den voet van het Quadrant geheel onbeweegelyk laaten ſtaan, en het *Quadrant* zelven alleen beweegen op deszelfs ſpil C, dan beſchryft hetzelve eenen boog aan den Hemel, welke rechthoekig, of loodrecht op het vlak van den *Horiſon* ſtaat, omdat de ſtandaart, waaraan hetzelve is vastgemaakt, veronderſteld wordt te lood te ſtaan; deze boog nu wordt een *Verticaale boog* of wel *Verticaal* genaamd; denzelven van den *Horiſon* af opwaarts trekkende, gaat hy door dat punt des Hemels, 't welk recht *boven* ons hoofd is, en het is dit punt



perpendiculair of *te lood* ſtaan; en *horiſontaal* worden alle lynen of boogen genaamd, die waterpas zyn, dus wordt alle beweging in den eerſten zin eene *Verticaale*, en in den laatſten zin eene *Horiſontaale* beweging genaamd; eene *Verticaale* beweging geeft men aan het Quadrant, als men hetzelve op den Spil C doet ronddraajen, en men geeft hetzelve eene *Horiſontaale* beweging, als men het met den ſtandaart in het middenpunt van den Cirkel E F doet rondbewegen.

216. Laat ons nu na eenigen tyd toevens wederom dezelvde Sterren waarnemen, en zien of dezelven nog op dezelvde hoogte aan hetzelvde punt des Hemels gezogt moeten worden: wy willen daartoe één uur laaten verlopen; — dan nu naar deze beide Sterren ziende, zien wy reeds met het bloote oog dat haar ſtand veranderd is, dat zy veel hooger aan den Hemel gezogt moeten worden; wy zien zelfs, dat wy zoo wel den *Horiſontaalen*, als *Verticaalen* ſtand van ons *Quadrant* moeten veranderen, dat wy hetzelve meer naar dat punt, waar ons *Compas* ons het Zuiden aanwyst, moeten draajen en dat deszelfs *Verticaale* beweging naar de hoogte zyn moet; dusdoende nemen wy de hoogte der eerst waargenomen Ster, thans waar te zyn 40°, en de hoogte van de tweede 75°.

217. Wat leeren wy nu reeds uit deze beide waarnemingen? dit, dat deze Sterren niet ſtilſtaan, maar zich bewegen, en dat deze beweging niet in eenen *Verticaalen boog* geſchied, maar in eenen van denzelven verſchillende, dat zy het

Zui-

Zuiden naderen, en zich van het *Oosten* verwyderen.

218. Laat ons nu, na weder één uur te hebben laaten verloopen, de hoogte dezer beide Sterren nog eens waarnemen, en wy zullen bevinden, dat wy al weder den *Horiſontaalen* ſtand van ons *Quadrant* moeten veranderen, (wel verſtaan het altoos op dezelvde plaats laatende ſtaan, maar alleen hetzelve op den voet bewegende,) en nemen nu de hoogte der eerſte Ster waar 44°, en van de tweede 73°. —— Dan hier ontdekken wy iets, 't geen onze opmerking verdient: de eerſte Ster, die wy waarnamen, had by onze eerſte waarneming eene hoogte van 24°, —— vervolgens van 40° en nu van 44° — en de tweede Ster was eerst 68° hoog, voorts 75° en nu 73°; de eerſte Ster is dus nog telkens in hoogte toegenomen, en de laatſte bevinden wy nu by onze derde waarneming 2° lager, als by onze voorige: wat mag hier de reden van zyn? Laat ons, om te ontdekken of ook iets dergelyks omtrent de eerſte Ster zal plaats hebben, deze telkens waarnemen, om te zien of wy het punt ontdekken kunnen, waarin dezelve het hoogſte zyn

zien wy, dat de ſtand van ons *Quadrant* ter dier tyden juist overeenkomt met dat punt des Hemels, waar ons *Compas* ons het *Zuiden* aanwyst.

219. Weder eenigen tyd gewacht hebbende, nemen wy weder deze beide Sterren waar, en vinden dat de hoogte der eerſte is 41°; en der tweede $58\frac{1}{2}$° (*); wy zien dus dat deze beide Sterren nu merkelyk gedaald zyn, en zouden, wanneer wy dus onze waarnemingen tot in den vroegen morgenſtond van den volgenden dag voortzetteden, de eerſte den *Horiſon* zien naderen en geheel ondergaan (†).

220. Dan laat ons op den volgenden avond terzelvder tyd eens weder deze onze waarnemingen hervatten, en zien of wy ook deze zelvde Sterren weder zien zullen, en of de beweging, welke wy aan deze beide Sterren hebben waargenomen, ook door ons aan anderen ontdekt wordt: hiertoe zal het noodzaakelyk zyn, dat wy op den ſtand der overige Sterren wat naauwkeuriger acht ſlaan, en daardoor opmerken, of zy, dezen ſtand behoudende, gezamenlyk eene beweging van het *Oosten* naar het *Westen* hebben, gelyk wy op den vorigen dag by de toen waargenomen Sterren ontdekt hebben.

221. Al ras ontdekken wy weder de te voren waar-

(*) Deze is de hoogte van *Athair* en *Lira*, 's middernachts ten 12 uuren van den 2 Augustus.

(†) *Athair* gaat, op den 3 Augustus, onder des morgens ten 6½ uuren.

waargenomen beide Sterren, vinden haare hoogte nagenoeg dezelvde, en ontdekken nu, by eene naauwkeurige beſchouwing des Hemels, dat niet alleen deze beide Sterren, maar de gantſche menigte van Sterren eene beweging in dezelve richting heeft, en wy worden daardoor opgewekt, met meerder naauwkeurigheid én met meer nadenken onze waarnemingen te regelen; wy hadden gisteren opgemerkt, dat elke Ster, in een zeker punt des Hemels, haaren hoogſten ſtand boven onzen *Horiſon* bereikt heeft, en dit doet ons beſluiten eens te onderzoeken, of deze punten, in dewelken verſchillende Sterren het hoogst boven den *Horiſon* ſtaan, ook eenige betrekking op elkanderen hebben; ten einde dit te ontdekken, zullen wy trachten het tydſtip aantetreffen, dat de *tweede* Ster, die wy gisteren waarnamen, haar' hoogſten ſtand bereikt heeft; wy weeten nu, daar wy de hoogte van deze Ster op 75° hebben waargenomen, dat dezelve deze hoogte en nog wel mogelyk iets meer bereikt: wy meeten dus derzelver hoogte, en het tydſtip gevonden hebbende dat de Ster deze hoogte bereikt heeft, gaan wy haaren loop nog een weinig naar, zien haar de



ſtand aan den Hemel bereikt hebben, in een' en denzelven *Verticaalen* boog is.

222. Daar wy nu reeds met het bloote oog aan den ſtand der vaste Sterren ontdekt hebben, dat de beweging derzelven eenpaarig naar dezelvde ſtreek des Hemels gericht is, zoo doet ons dit natuurlyk vraagen, of dan alle vaste Sterren in dezen zelvden *Verticaal* haar' hoogſten ſtand boven den Horiſon bereiken? dit te beſliſſen zal nu niet meer moeijelyk zyn: wy kennen den *Verticaal*, in welken deze beide Sterren haar' hoogſten ſtand bereikt hebben; wy kunnen, door middel der verdeeling op den Cirkel E F, denzelven aanteekenen, en alle Sterren, welken in dezen *Verticaal* aan den Hemel door ons worden gezien, waarneemen om te zien of zy haaren hoogſten ſtand in dezen zelvden *Verticaal* zullen bereiken; dit doende zullen wy wezenlyk ondervinden, dat ja *alle Sterren* in denzelvden Verticaalen boog, alhoewel op zeer verſchillende punten, haare grootſte hoogte bereiken; terwyl de ſtand van ons *Quadrant* ons de richting van dezen Verticaalen Cirkel, van het *Zuiden* naar het *Noorden* loopende, aanwyst; te recht houden wy dezen Cirkel voor een' der aanmerkelykſten na den *Horiſon*; te recht beſchouwen wy denzelven als gewigtig voor onze waarnemingen, en oordeelen het dus noodzakelyk hem eenen byzonderen naam te geeven.

223. Wy hebben tot hiertoe onze beſchouwingen nog altoos by de Sterren bepaald, en nog niets omtrent het grootſte licht, dat wy aan den Hemel waarneemen, gedaan; dat de *Zon* ook;

gelyk wy thands van de Sterren gezien hebben, dagelyks allengskens boven onzen Horiſon ryst, en op zyn hoogst gekomen zynde wederom daalt, is reeds door eene gemeene opmerking zoo bekend aan ons, dat wy dit niet behoeven naarteſpooren; wy weeten ook, dat de *Zon* op den middag op haar hoogst ſtaat; dan, valt deze hoogſte ſtand der *Zon* ook in denzelvden *Verticaal* met de vaste Sterren voor, van welken wy zoo even ſpraken? dit dienen wy nader te onderzoeken, en deze waarneming zal ons leeren, dat de *Zon* op den middag, dat is ten 12 uuren, juist in dienzelvden *Verticaal*, van denwelken wy zoo dikwils ſpraken, haar' hoogſten ſtand bereikt, en wy oordeelen daarom ook aan dezen *Verticaal* geen geſchikter naam, dan dien van *Meridiaan* of *Middag-Cirkel* te kunnen geeven.

224. Wy weeten dan nu, door deze waarnemingen, dat de *Meridiaan* een Cirkel is, welke rechthoekig op den *Horiſon* ſtaat, § 121, en welke dus door de Poolen des *Horiſons* gaat, § 24, en daar wy den *Horiſon* als een' grooten Cirkel der Spheer moeten aanmerken, wyl wy in het middenpunt van denzelven geplaatst zyn, en zyn omtrek gelyk is aan den omtrek des geheelen voor ons oog zigtbaaren Sterrenhemels, zoo moeten wy ook den *Meridiaan* als een' grooten Cirkel der Spheer beſchouwen, welke den *Horiſon*, gelyk ook de geheele Hemelkloot, in twee gelyke deelen deelt, § 9; dan dit doet ook elke *Verticaal;* deze verdeelt ook de geheele voor ons zigtbaare kloot des Hemels in twee gelyke deelen; deze ſtaat ook recht-

rechthoekig op den Horiſon : waarin is dan de *Meridiaan* van elken anderen *Verticaal* onderſcheiden ? — Deze vraag zullen wy het best kunnen oplosſen, als wy de beweging des Hemels wat meer van naby bezien.

225. Wy moeten elke Ster, die wy aan den Hemel waarnemen, beſchouwen als eene ſtip op de oppervlakte eener kloot geplaatst; elke zoodanige ſtip nu is het uiteinde van een *ordinaat*, welke, zoodra de bol of kloot om zyn' As zich beweegt, een' Cirkel beſchryft, § 7; deze Cirkels nu van elke ſtip van de oppervlakte eener kloot zyn *paralel* aan elkander, want de ſtippen behouden alle haaren onderlingen ſtand, beſchryven dus door de omwenteling der kloot een oneindig aantal punten, welken alle te zamen eenen Cirkel uitmaken, die dus ook paralel is aan den Cirkel, die elke andere ſtip, op de oppervlakte der kloot geplaatst, beſchryft; paſſen wy dit toe op de Sterren, dan zien wy dat de Sterren door de omwenteling des Hemels *paralellen* beſchryven, die even om die reden ook alle kleine Cirkels zyn, § 8 en 12; alle deze *paralellen* nu worden door den *Meridiaan*, en door geen anderen *Verticaal*, midden door gedeeld, omdat het gedeelte dezer *paralellen*, dat aan de eene zyde des *Meridiaans* gelegen is, even groot is als het gedeelte, dat aan de andere zyde gelegen is, gelyk wy dit kunnen waarnemen, als wy het tydsverloop van den *opgang* van eenig Hemellicht tot den tyd van den doorgang van hetzelve door den *Meridiaan* gelyk bevinden aan dat tydsverloop van den doorgang door den *Meri-*

diaan, tot deszelfs *ondergang*; maar worden alle deze *paralellen* door den *Meridiaan* midden doorgedeeld, dan gaat ook de *Meridiaan* door de Poolen van alle deze *Paralellen*, en dus door de Poolen des Bols, en dan is de As der Hemelkloot ook in het vlak van den *Meridiaan* gelegen, § 12. en hier in verſchilt dus de *Meridiaan* van alle andere *Verticaalen*, dat in deszelfs vlak de *As*, om welken wy den gantſchen Sterrenhemel zien draajen, gelegen is; en derhalve is de *Meridiaan* alleen geſchikt om ons de nadere eigenſchappen van de omwenteling des Sterrenhemels nader te leeren kennen.

206. Wy kennen dan nu het vlak van den *As* des Hemels, zoodra wy den ſtand van den *Meridiaan* kennen; dan het is nu ook noodzaakelyk de plaats van de Pool des Hemels te kennen, omdat wy daardoor den ſtand van dezen As, en dus ook de gelegendheid der Plaats, waar wy onze waarnemingen doen, leeren beſtemmen; (wy onderſtellen dat onze lezer weet wat de *Geographiſche Breedte* eener plaats zy, en dus ook dat de afſtand eener plaats van de Pool der Aarde gelyk is aan het *Compliment* van die Breedte, § 18.) Wy zagen, § 22, dat de

[redacted]

Meridiaan gemeeten, te beſtemmen, en daardoor in ſtaat de plaats der Pool te vinden; immers daar wy reeds hebben opgemerkt, dat dezelvde Sterren omſtreeks denzelvden tyd elken avond zigtbaar zyn, zoo beſluiten wy hieruit, dat, daar de *Meridiaan* den Cirkel, dien elke Ster beſchryft, in twee gelyke deelen deelt, die Ster 12 uuren aan den eenen en 12 uuren aan den anderen kant van den *Meridiaan* zyn moet; dezelvde Ster zal dus, na ten 8 uuren 's avonds door den Meridiaan gegaan te zyn, na 12 uuren, dat is des morgens ten 8 uuren van den volgenden dag, weder in den *Meridiaan* moeten zyn; het komt 'er maar op aan of dezelve dan boven onzen *Horiſon*, en dus voor ons oog zigtbaar is.

227. Om dan te onderzoeken of 'er eenige Ster zy, welker doorgang door den *Meridiaan* men zoo wel aan de eene zyde der Pool als aan de andere zyde derzelve kan waarnemen, merke men aan, dat, wanneer wy den Sterrenhemel aandachtig beſchouwen, wy laag in het *Zuiden* Sterren den *Meridiaan* zien paſſeeren, welken zeer kleine Cirkelbogen voor ons oog beſchryven, en dus maar voor een' korten tyd voor ons zigtbaar zyn; dan ons oog vestigende op Sterren, welken op eene grooter hoogte door den *Meridiaan* gaan, zien wy dat ook dezen grooter voor ons zigtbaare Cirkelbogen beſchryven, en dat hoe hooger de Sterren door den *Meridiaan* gaan, hoe grooter de Cirkelbogen zyn, die zy boven onzen Horiſon afleggen; dan nu ons oog naar het *Noorden* wendende, zien wy ook aldaar Sterren, en vragen

onszelven te recht, waar gaan deze Sterren onder? Wy zien dezelven vlak in het *Noorden*; naar het *Oosten* voortgaande, ryzen zy weder, en kunnen ons dus het punt des *Horizons* niet voorstellen, in hetwelk zy zouden ondergaan; konden wy hier eenige heldere Ster, welke door haar' meerderen glans, of door haar' byzonderen stand, ons oog trekt, opspooren, dan zouden wy kunnen zien of wy den geheelen Cirkel, welken deze doorloopt, kunnen zien, deszelfs middenlyn in graaden meeten, en daar uit de gelegendheid van de Pool bepaalen.

228. 'Er zyn zeven Sterren, welken nagenoeg in dezen stand staan, en die hiertoe zeer geschikt zyn.

Deze Sterren zyn doorgaands onder den naam van *den grooten Wagen* zeer bekend, en gemakkelyk aan den Hemel te vinden: zy gaan in onze Noordelyke gewesten nooit onder; laat ons onderstellen, dat wy op den 2. December, des avonds ten 5 uuren, de hoogte van de Ster geteekend α waarnemen, welke wy bevinden te zyn 26°; ten 6 uuren nemen wy dezelvde Ster weder waar, wanneer zy ons net in het *Noorden* schynt te zyn, en bevinden haare hoogte te zyn $25\frac{1}{2}^{\circ}$ — ten 7 uuren die zelvde Ster weder waarnemende, zien wy dat zy weder geklommen is tot 26°; en nu tot den anderen morgen ten 6 uuren, dat is 12 uuren na dat zy in 't *Noorden* of in den *Noorder Meridiaan* geweest is,

is, wachtende, nemen wy weder haare hoogte waar, en bevinden dezelve te zyn $79\frac{1}{2}^{o}$; de grootſte hoogte van de Ster α, van den grooten Wagen, is dus . . . . . $79\frac{1}{2}^{o}$
de kleinſte hoogte . . . . . $25\frac{1}{2}$

54^{o}

dus is de boog van den Meridiaan, welke de Diameter van den Cirkel van deze Ster bepaalt, 54^{o}, 't geen de dubbele afſtand van de Ster van de Pool is: dus is de afſtand der Ster van de Pool 27^{o}, en hierby geteld $25\frac{1}{2}^{o}$, of de kleinſte hoogte der Ster, zoo geeft dit voor de Poolshoogte $52\frac{1}{2}^{o}$, waaruit wy dus beſluiten kunnen, dat de *Breedte* van *Amſterdam*, de plaats onzer waarneming, $52\frac{1}{2}^{o}$ is, § 36. — De hoogte der Pool of de Poolshoogte bekend hebbende, kunnen wy nu ook gemakkelyk den afſtand van het *Zenith* tot de Pool kennen; want de afſtand van het *Zenith* tot den *Horiſon* is 90^{o}: hier afgetrokken de hoogte der Pool $52\frac{1}{2}^{o}$, zoo rest voor de afſtand van de Pool tot het *Zenith* $37\frac{1}{2}^{o}$. — Ook zal de kennis van de hoogte der Pool ons dezelve gemakkelyk aan den Hemel kunnen doen kennen, want het *Quadrant* verheffende, dat de loodlyn juist $52\frac{1}{2}^{o}$ aanwyst, en het *Quadrant* zoo geſteld zynde dat het net het *Noorden* aanwyst, zullen wy, door de viſieren ziende, net de *Pool* zien, en daardoor ontdekken dat 'er eene Ster zeer dicht by de Pool ſtaat, welke men daarom ook de *Poolſter* gewoon is te noemen. — Wy weeten dus nu dat de *Meridiaan* rechthoekig op

den *Horiſon* ſtaat, dat hy door ons *Zenith* en door de *Pool* gaat, (de Pool, welke hy ons zigtbaar is, noemt men de *Noord-Pool*,) en het zal na dit alles niet moeijelyk zyn zich te verbeelden, dat de koperen Cirkel DCEA der Hemel-Globe, Fig. 40, dezen *Meridiaan* afbeeld; het is het gedeelte ADC deszelven, dat boven den *Horiſon* ABC verheven is, van het welke wy dus lange geſproken hebben.

229. Wy kennen nu den *Horiſon*, wy kennen den *Meridiaan*, en weeten dat de As der Hemelkloot in het vlak van dezen laatſten Cirkel gelegen zy; dan willen wy eenige nadere kennis bekomen van de beweging des Hemels, dan moeten wy den juisten ſtand van den *Meridiaan* op onzen *Horiſon*, dat is de juiste plaats van het *Zuiden*, zeer naauwkeurig weeten te bepaalen: hiertoe nu zyn 'er verſchillende wegen; de gemakkelykſte is de volgende: men neeme een plankje, en trekke op hetzelve verſcheiden Cirkels, zette in het middenpunt van dit plankje een ſtokje *perpendiculair* op hetzelve, en plaatſe dit plankje in den Zonneſchyn, zoo, dat het ſtokje wel te lood ſtaa; nu teekene men des morgens ten 9 uuren de juiste plaats aan der ſchaduwe, die het ſtokje, dat door de Zon beſchenen wordt, op een' der Cirkels (en dus het uiteinde van de ſchaduwe,) geeft, en wachte tot dat des middags, 't geen, als ons Horologie gelyk is, juist ten 3 uuren zal moeten zyn, het uiteinde der ſchaduwe weder op den zelvden Cirkel te

ſtaan

ſtaan kome, alwaar men de plaats der ſchaduwe weder aantekent: de helft der tusſchenwydte, tusſchen deze beide aldus aangetekende punten, zal de plaats des *Meridiaans* zyn; doch, om dezelve naauwkeurig te bekomen, zal men weldoen, dezelve waarneming ook des morgens ten 8 en 10 uuren, en des nadenmiddags ten 2 en 4 uuren te doen: men verkrygt alsdan 3 uitkomſten, en kan daardoor het abuis, 't geen men begaan mogt hebben, beter verhelpen; nu zal men wachten tot dat de *Zon* op een' zekeren dag de ſchaduwe van het ſtokje juist op de aangetekende plaats van den middag doet vallen, en op dit zelvde oogenblik de plaats der *Zon* met het *Quadrant* waarnemen, waardoor men in de gelegendheid komt een zeker teeken te ſtellen, ten einde naar hetzelve zyn *Quadrant* te kunnen richten, dat hetzelve in het *Zuiden*, dat is in den *Meridiaan* gericht zy, wanneer men tevens zorgt, dat de o der verdeeling van den *Horiſontaalen* Cirkel E F ook in dit punt van het *Zuiden* ſta; hierdoor zal men nu in ſtaat zyn, niet alleen de hoogte eener Ster boven den *Horiſon*, maar ook den ſtand van den *Verticaal*, in denwelken die Ster ſtaat, te bepaalen, te weeten: wanneer het *Quadrant* aldus geſteld zy, en men hetzelve naar eene zekere Ster toekeert, om haare hoogte waartenemen, dan zal de wyzer B C op den Cirkel E F den graad aanwyzen, dien de *Verticaal*, in denwelken de Ster ſtaat, van het Zuiden afwykt, en het is deeze boog, welken men het *Azimuth* der Ster noemt.

230.

230. Ook dit *Azimuth* wordt op den *Horiſon* der Hemel-Globe aangewreezen; de Horiſon derzelve is ten dien einde in 360° verdeelt, en wanneer men de Globe op de Poolshoogte der plaats geſteld heeft, zoo ſchroeft men in het Zenith den *Quart-Cirkel* of *Verticaal*, welke eene halfe Cirkelwyze gebogen en in graaden verdeelde reep koper is, aan de eene zyde van een koper ſtukje met een ſchroefje voorzien, vast, hangt dezelve over de Ster; en dan wyst de *Verticaal* op den *Horiſon* het *Azimuth* der Ster aan, gelyk de Ster zelve op den *Verticaal* haar eigen hoogte boven den *Horiſon* aanwyst.

231. Wy hebben tot hiertoe verondersteld, dat in den tyd van 24 uuren de gantſche Sterrenhemel zich éénmaal ronddraait, en dat dus elke Ster juist na 24 uuren weder in den *Meridiaan* komt, waaruit volgen zou, dat dezelvde Sterren op hetzelvde uur weder aan denzelvden oord des Hemels zigtbaar waren; dan zoodra men zyne waarnemingen gedurende eenigen tyd voortzet, of door eene betrokken lucht verhinderd wordt gedurende eenige dagen den Sterrenhemel waartenemen, ziet men dat men zich hierin bedriegt, en

[redacted]

zamentevatten, en onder zekere *Conſtellatiën* of *Sterrenbeelden* te brengen, aan welken men byzondere figuuren en namen heeft toegeëigend, om dezelven te onderſcheiden; men vindt alle deze Sterrebeelden op de Hemel-Globe afgebeeld, dan daar het ons te verre van ons oogmerk zoude afleiden, hier over dezelven afzonderlyk te handelen, verwyzen wy onze lezeren hieromtrent naar andere daartoe meer bepaaldelyk geſchreven werken, als daar is de *Handleiding tot de kennis van den Sterrenhemel, door* J. E. Bode; wy zeggen nog alleenlyk maar, dat men de Sterrebeelden onderſcheid, in de Sterrebeelden van den Dierenriem, welken den naam voeren der 12 Teekens der Ecliptica, en in de Sterrenbeelden *benoorden* en *bezuiden* den Dierenriem; men is gewoon de byzondere Sterren in elk Sterrenbeeld met eene letter van het Griekſche Alphabet te onderſcheiden, en dezelven voorts naar haare grootte in Sterren van de 1e. 2e. 3e. tot de 9e. grootte te verdeelen; de Sterren, die uit verſcheiden zyn zamengeſteld, noemt men dubbele Sterren, en indien zy een wolkachtig licht geven, noemt men dit Nevel-Sterren; deze laatſten egter kunnen niet dan met Verrekykers worden waargenomen.

232. Ten einde de vaste Sterren behoorlyk te kunnen weder vinden, of derzelver ſtand aan den Hemel aan anderen te kunnen mededeelen, moest men haare plaats aan den Hemel naauwkeurig kunnen bepaalen: om dit te kunnen doen, zagen wy boven, § 102, dat men *twee* verſchillende afmeetingen nodig heeft; wy kunnen den tyd van den,

door-

doorgang der Sterren door den *Meridiaan*, volgens de te voren opgegeeven wyze thands bepaalen, en daarby dan tevens derzelver hoogte in den *Meridiaan* waarnemende, zou men zeker derzelver plaats op eene Globe eenigzins kunnen afteekenen; dan hoe zeer ook deze handelwyze voor eene enkele plaats des Aardbodems geſchikt zoude mogen zyn, om den ſtand der Sterren eenigzins te bepaalen, zoo zou dit geenzins geſchikt zyn, om derzelver plaats in het algemeen te beſtemmen, en het is daarom dat men tot een ander middel toevlugt genomen heeft.

233. Wy zagen, § 93, dat; *wanneer men op de oppervlakte eener kloot, op gelyke afſtanden van derzelver Poolen, en rechthoekig op den As, een' Cirkel trekt, men dezen Cirkel* Equator *noemt:* zoodanig een Cirkel moet naar deszelfs zoo even omſchreven ſtand juist geſchikt zyn, om de beweging des Hemels nader te leeren kennen, en den ſtand der Sterren naauwkeurig te bepaalen; immers, ſtaat hy rechthoekig op den *As*, dan is hy ook *Paralel* aan alle de Cirkels, die de Sterren door haare beweging beſchryven; hy is een groote Cirkel der Spheer, en deelt dus den *Horiſon* en *Meridiaan* in twee gelyke deelen, § 9; wy hebben denzelven reeds in de Aardrykskunde leeren kennen, en het is ook noodzaakelyk zyn' ſtand aan den Hemel te kunnen bepaalen; de *Equator* ſtaat op 90° van de Pool, en deszelfs hoogte in den *Meridiaan* moet dus gelyk zyn aan het *Compliment* der Poolshoogte, § 35. 2e. gevolg, dus is de hoogte des *Equators* aan den *Meridiaan*

te

te *Amſterdam* $37\frac{1}{2}^{o}$; hy deelt den *Horiſon* in twee gelyke deelen, en ſnydt dus denzelven in het *Oosten* en *Westen*; de hoogte van den *Equator* kennende, en die van eene zekere Ster, als zy in den Meridiaan is, zoo verkrygen wy door $37\frac{1}{2}^{o}$ van die hoogte aftetrekken, indien de Ster *beoosten* den *Equator* ſtaat, dat is, indien de hoogte der Ster grooter is dan die des *Equators*, of door de hoogte van de Ster van de hoogte des *Equators* aftetrekken, indien de Ster *bezuiden* den *Equator* ſtaat, den afſtand eener Ster van den *Equator*: dus is de hoogte van *Arcturus* in den *Meridiaan* te *Amſterdam* $57\frac{1}{2}^{o}$; hiervan afgetrokken $37\frac{1}{2}^{o}$ voor de hoogte *des Equators*, bekomt men 20^{o} voor den afſtand van *Arcturus* van den *Equator*, welken afſtand men gewoon is *Declinatie* te noemen; kent men daarentegen de *Declinatie* eener Ster, en neemt men derzelver hoogte in den *Meridiaan* waar, dan kunnen wy daaruit de hoogte van den *Equator*, en dus ook de *Breedte der Plaats* afleiden (*).

234. Deze *Equator* nu geeft ons ook een geſchikt middel aan de hand, om den ſtand der vaste Sterren nog nader op de volgende wyze te bepaalen: men is gewoon denzelven, gelyk alle andere Cirkels, in 360^{o} te verdeelen; deze 360^{o} paſſeeren allen in den tyd van éene omwenteling des Hemels, welke wy gemaakshalve nog maar op 24 uuren

(*) Wy leggen die hier maar even aan; in het gevolg der Boeken zal men hiervoorens meer voorbeelden vinden.

uuren zullen bepaalen, den *Meridiaan*; elke Ster gaat met een zeker punt des *Equators* door den *Meridiaan*, en wel beſtendig met hetzelvde punt, omdat de *Equator* ſteeds zyne zelvde betrekking tot de vaste Sterren behoud; wy kunnen dus, zoodra wy het punt bepaald hebben, waarmede wy de 360 graaden des *Equators* beginnen te tellen, ook bepaalen met welken graad des *Equaters* iedere Ster door den *Meridiaan* gaat, te weeten: daar in 24 uuren tyds alle de 360 graaden des *Equators* door den *Meridiaan* gaan, zoo gaan 'er elk uur 15 graaden door denzelven; wanneer wy nu den tyd weeten dat het eerſte punt van den *Equator* door den *Meridiaan* gaat, en den tyd dat eene zekere Ster door denzelvden Meridiaan gaat, zoo hebben wy dit verſchil van tyd maar in graaden te veranderen in rede van 15° in een uur, om den graad van den *Equator* te bekomen, welke te gelyk met de Ster door den *Meridiaan* gaat; deze afſtand nu van eene Ster in graaden van den *Equator*, van het eerſte punt van telling, noemt men de *Ascentio recta* derzelve, d. i. haare *rechte klimming*, omdat van dien gegeeven graad recht in den *Meridiaan* opklimmende, men tot de gegeeven

eener Ster door den *Meridiaan*, van den eenen dag tot den volgenden, moeten wy den loop der *Zon*, welke de regelmaat van onzen tyd is, wat meer van naby beſchouwen; wy weeten nu reeds, dat de *Zon* elken dag des middags ten 12 uuren in den *Meridiaan* is, en eene geringe oplettendheid, zal ons zeker ook al geleerd hebben, dat dezelve des Middags niet altoos even hoog boven onzen *Horiſon* ſtaat; dan wy moeten deze hoogte met meer naauwkeurigheid waarnemen, om derzelver loop te kunnen opſpooren; wy onderſtellen dat wy den 3 December haare hoogte waarnemen, en dezelve bevinden te zyn 14° 14′, dus is haare *Declinatie* alsdan 22° 16′ zuidelyk, § 233; wy nemen tevens den tyd waar, dat eene der aanmerkelykſte Sterren in grootte den *Meridiaan* paſſeert, om met dezelve den ſtand der *Zon* te kunnen vergelyken: kiezen wy hiertoe voor dezen tyd *Aldebaran* in het hoofd van *de Stier*, dan vinden wy dat dezelve 's middernachts even voor 12 uuren door den *Meridiaan* gaat, en beſluiten daaruit dat de *Zon*, op den *Equator* geteld, 180° van *Aldebaran* afſtaat, wyl 12 uuren in tyd juist 180° van den *Equator* uitmaken, § 234.

236. Door den ſtand van het eene Hemellicht, met den ſtand van een ander Hemellicht te vergelyken, verſtaan wy den afſtand te meeten der beide graaden van den *Equator*, welke met ieder van deze Hemellichten te gelyk door den *Meridiaan* gaan; wy weeten dat alle de 360 graaden van den *Equator* in den tyd van 24 uuren nagenoeg den *Meridiaan* paſſeeren, § 234. dat 'er

16' 28" — 4°. dat zelvde tydverloop tuſſchen den doorgang van *Athair* en *Lira*, 't geen 1 uur 10' 14" is. — 5°. Eindelyk het verſchil van den doorgang van *Aldebaran* en *Athair*, 't geen 8 uuren 43' 4" is.

240. Uit deze verſchillen leiden wy af, dat de afſtand van *Aldebaran* en *Regulus* is 83° 21'
van *Regulus* en de *Koornair* . 49 15
van de *Koornair* en *Lira* . . 79 7
van *Lira* en *Athair* . . . 17 31
van *Athair* en *Aldebaran* . 130 46
't welk te zamen opgeſteld zynde juist 360° uitmaakt.

241. Wy nemen dan nu op den 15 Maart den tyd des doorgangs van *Regulus* door den *Meridiaan* waar, en vinden daar voor 10 uuren of 150°, waarvan moet worden afgetrokken de afſtand van *Aldebaran* en *Regulus*, zo bekomen wy voor den afſtand der *Zon* van *Aldebaran* 66° 40'. Vervolgends nemen wy weder den 21 Maart de hoogte der Zon waar, en bevinden dezelve te zyn 37½°, juist de hoogte des *Equators*, dus de *Zon* op dezen dag geen *Declinatie* heeft, maar juist in den *Equator* ſtaat; den doorgang van *Re-*

den *Meridiaan* 6 uuren 30′: des de *Declinatie* der *Zon* den 15 Febr. $13\frac{1}{2}^{\circ}$ is, en de afſtand van *Aldebaran* van de *Zon* 97° 30′. — Op den 15 Maart vinden wy de hoogte der *Zon* $35\frac{3}{4}^{\circ}$, dus haare *Declinatie* is $11\frac{3}{4}^{\circ}$, dan *Aldebaran* is nu reeds zoo naby de *Zon*, dat wy door het licht derzelve belet worden, haaren doorgang door den *Meridiaan* waartenemen, wy moeten ons dus van eene andere heldere Ster bedienen, om met dezelve de plaats der *Zon* te vergelyken, en daar wy, willen wy den loop der *Zon* naargaan, altoos haaren afſtand van *hetzelvde* punt des Hemels moeten kennen, waartoe wy *Aldebaran* verkozen hebben, zoo moeten wy den afſtand, van elk ander punt des Hemels, 't welk wy nu of in 't vervolg hiertoe zouden mogen verkiezen, van *Aldebaran* kennen.

239. Daar wy dan in ons oogmerk, om den loop der *Zon* door den gantſchen Hemel te leeren kennen, verſchillende punten zullen nodig hebben, zoo zullen wy hiertoe vervolgends de navolgende Sterren, alle van de eerſte grootte, neemen, te weeten: *Regulus* — de *Koornair van de Maagd* — *Lira* — en *Athair*. — Wy nemen dus waar, 1°. hoe veel tyd 'er verloopt tusſchen den doorgang van *Regulus* en *Aldebaran* door den *Meridiaan*, waarvoor wy vinden 5 uuren 33′ 24″ — ten 2°. het tydverloop tuſchen den doorgang van de *Koornair* en *Regulus* door den *Meridiaan*, waarvoor wy vinden 3 uuren 17′ 30″ — 3°. dat zelvde tydverloop tusſchen den doorgang van *Lira* en de *Koornair*, waarvoor wy vinden 5 uuren

16' 28" — 4°. dat zelvde tydverloop tusſchen den doorgang van *Athair* en *Lira*, 't geen 1 uur 10' 14" is. — 5°. Eindelyk het verſchil van den doorgang van *Aldebaran* en *Athair*, 't geen 8 uuren 43' 4" is.

240. Uit deze verſchillen leiden wy af, dat de afſtand van *Aldebaran* en *Regulus* is 83° 21'
van *Regulus* en de *Koornair* . 49 15
van de *Koornair* en *Lira* . . 79 7
van *Lira* en *Athair* . . . 17 31
van *Athair* en *Aldebaran* . 130 46
't welk te zamen opgeſteld zynde juist 360° uitmaakt.

241. Wy nemen dan nu op den 15 Maart den tyd des doorgangs van *Regulus* door den *Meridiaan* waar, en vinden daar voor 10 uuren of 150°, waarvan moet worden afgetrokken de afſtand van *Aldebaran* en *Regulus*, zo bekomen wy voor den afſtand der *Zon* van *Aldebaran* 66° 40'. Vervolgends nemen wy weder den 21 Maart de hoogte der Zon waar, en bevinden dezelve te zyn $37\frac{1}{2}$°, juist de hoogte des *Equators*, dus de *Zon* op dezen dag geen *Declinatie* heeft, maar juist in den *Equator* ſtaat; den doorgang van *Regulus* door den *Meridiaan* vinden wy te zyn ten 9 uuren 45' 't geen 65° 56' afſtand van de *Zon* van *Aldebaran* geeft, op deze wyze voortgaande, vinden wy:

d. 21 Apr. h. der Zon $49\frac{1}{2}$° doorg. v. *Regulus* 8 uur.
den 21 May . $57\frac{1}{2}$° — v. de *Koornair* 9 uur. 15'
den 21 Juny . 61° — van *Lira* 12 uur. 30'
den 21 July . $57\frac{1}{2}$° — van *Lira* 10 uur. 15'

den

den 24 Aug. h. der Zon $48\frac{1}{2}°$ doorg. van *Lira* 8 uur. 30′
den 24 Sept. . $37\frac{1}{2}°$ — van *Athair* 7 uur. 45′
den 24 Oct. . $24\frac{1}{2}°$ — van *Athair* 5 uur. 45′
den 21 Nov. . 17 — v. *Aldebaran* 12 uur. 30′
den 13 Dec. . $14\frac{1}{4}°$ — v. *Aldebaran* 11 uur.
den 21 Dec. . 14 — v. *Aldebaran* 10 uuren.

242. Uit alle deze waarnemingen, geholpen door de in de 236 en 240 §§ opgegeeven bereekeningen, leiden wy deze gevolgen af:

	Declin. der Zon.	afstand van *Aldebaran*.
3 Dec.	22° 16′ Zuid .	180° 0′ Westelyk
30 dito	23° 7′ Z. . .	142° 0′ W.
15 Jan.	21° 8′ Z. . .	127° 30′ W.
15 Febr.	12° 40′ Z. . .	97° 30′ W.
15 Maart	1° 44′ Z. . .	66° 40′ W.
21 dito	0° 0′ Z. . .	65° 56′ W.
21 April	12° 10′ Noord .	36° 40′ W.
21 May	20° 22′ N. .	6° 9′ W.
21 Juny	23° 30′ N. .	24° 13 Oostelyk (*)
21 July	20° 20′ N. .	58° 0′ O.
24 Aug.	10° 49′ N. .	84° 13′ O.
24 Sept.	0° 0′ N. .	114° 4′ O.
24 Oct.	12° 5′ Zuidelyk	143° 0′ O.
23 Nov.	20° 34′ Z. .	172° 30′ O.
13 Dec.	23° 14′ Z. .	165° 0 Westelyk (†)
21 dito	23° 30′ Z. .	150° 0 W.

243.

(*) De *Zon* passeert tusschen den 21 May en 21 Juny *Aldebaran*, en deze Ster welke te voren de *Zon* volgde, gaat nu de *Zon* voor uit, en daardoor is nu de afstand der *Zon Oostelyk* van *Aldebaran*.

(†) *Aldebaran* gaat nu weder *vóór* 12 uuren middernacht door den Meridiaan, en volgt dus de *Zon* weder, waarom wy den afstand der *Zon* wederom Westelyk van *Aldebaran* stellen.

243. Uit de hier boven opgegeeven afſtanden der *Zon* van *Aldebaran*, zien wy dat de *Zon* na één Jaar tyds weder tot denzelvden afſtand van *Aldebaran* komt, en leiden dus daaruit af, dat de *Zon* in den tyd van één jaar, of volgends naauwkeuriger waarnemingen, in den tyd van 365 dagen, 6 uuren, 9′ 10″, den ganſchen Sterrenhemel doorloopt en niet in den *Equator* of in eenigen aan den *Equator* paralellen Cirkel, maar in eenen Cirkel, welke op twee recht tegen elkander overſtaande punten den *Equator* ſnyt, (want op den 21 Maart en 24 Sept. had de Zon geen Declinatie, en die beide afſtanden maken te zaamen 180° of $\frac{1}{2}$ Cirkel,) en die in haaren grootſten afſtand $23\frac{1}{2}$ van den *Equator* afwykt; deze ſtanden der *Zon*, op den Hemel-Globe naargaande, en op dezelve afteekenende, verkrygen wy dien Cirkel, welken men *Zons Weg* (*Ecliptica*) noemt, en van welkers verdeeling wy § 73. reeds uitvoerig geſproken hebben, 't geen wy hier niet herhaalen zullen, maar 't geen aldaar moet worden nagelezen.

244. Wy hebben dus gezien dat de *Zon* in het tydverloop van één jaar den gantſchen Hemel doorloopt, en dus elken dag een zeker gedeelte van denzelven; dezelvde Ster komt daardoor elken dag ruim 4 minuten vroeger als na 24 uuren weder aan den *Meridiaan*, omdat de *Zon* in dat tydverloop iets minder dan een' graad in haaren weg gevorderd is, en wy van den eenen doorgang der *Zon* tot den anderen net 24 uuren gewoon zyn te tellen, en dit verſchil doet ons na verſcheiden omwentelingen des He-

mels,

mels, dat is naar verſcheiden dagen, dezelvde Sterren laater aan den *Meridiaan* zien, en is oorzaak dat wy, ſchoon anders omſtreeks den zelvden tyd van den avond, op andere tyden des jaars geheel andere Sterrenbeelden boven onzen *Horiſon* zien, gelyk men dit alles door het gebruik der Hemel-Globe nader zal bevestigd zien.

245. Deze jaarlykſche loop der Zon, geeft ons ook een gepast middel aan de hand, om een zeker vast punt op den *Equator* te bepalen, om van hetzelve onze telling aantevangen: de *Zon* pasſeert in haaren jaarlykſchen loop tweemaal den *Equator*, en deze beide punten worden dus daardoor de aanmerkelykſte punten van den *Equator*, waarom men dan ook één van dezelve, en wel dat, 't welk de *Zon* by den aanvang der *Lente* pasſeert, voor den aanvang der telling op den *Equator* heeft aangenomen, § 103; men vergelykt nu met dit punt den ſtand der *Zon* en van alle de vaste Sterren, en men noemt het verſchil van tyd, dat eene Ster naar dit punt door den *Meridiaan* gaat, de *Ascentio recta* eener Ster in tyd; men kan dus de *Ascentio recta* eener Ster in tyd vinden, door waartenemen hoeveel tyd die Ster naar dit punt door den *Meridiaan* gaat, en brengt dezen tyd in graaden over, na rede van 15° in één uur, § 234; om de *Ascentio recta* in graaden te bekomen. Zoo kunnen wy ook, uit de boven opgegeeven afſtanden der *Zon* van *Aldebaran*, de *Ascentio recta* der *Zon* afleiden, door de *Ascentio recta* van *Aldebaran*, welke 65° 56' is;

van den afſtand der *Zon* van *Aldebaran* aftetrekken, wanneer die afſtand Westelyk is; het overſchot is dan het compliment van de *Ascentio recta* der *Zon*, of de *Afſtand van het Nachteveningspunt van de Zon*, en deze Afſtand van het Nachteveningspunt van de Zon, in uuren overgebragt, geeft ons den tyd van den doorgang van het 1e. punt van ♈ door den *Meridiaan*; hierby nu opgeteld zynde de *Ascentio recta* eener Ster in tyd, bekomt men het uur van den doorgang dier Ster door den *Meridiaan*; b. v. den afſtand der *Zon* van *Aldebaran* vonden wy voor den 3. Dec. 180°, hier af 65° 56′ voor de *Ascentio recta* van *Aldebaran*, rest 'er 114° 4′ voor den afſtand van het Nachteveningspunt van de *Zon*, 't welk in tyd overgebragt zynde 7 uuren 36′ is, waarby nu geteld zynde de *Ascentio recta* van *Aldebaran* in tyd, welke 4 uuren 23′ is, bekomt men 12 uuren middernacht, voor den doorgang van *Aldebaran* door den *Meridiaan*; is de afſtand der *Zon* van *Aldebaran* Oostelyk, dan moet de *Ascentio recta* van *Aldebaran* by dien afſtand bygeteld worden, wanneer het product de *Ascentio recta* der *Zon* zelve is.

[redacted]

door haaren glans ons oog tot zich trekken, en welken wy, als mede eene byzondere beweging hebbende, zullen leeren kennen: dezen zyn het nu, welken men *Planeeten* (*Dwaalſterren*) noemt; wy zullen waarnemen, dat dezelven zich dan eens van het *Westen* naar het *Oosten*, en dan weder van het *Oosten* naar het *Westen* bewegen, dan eens eenigen tyd ſchynen ſtil te ſtaan, en dan weder voorwaards te gaan, en dus eene zeer onregelmatige beweging hebben.

247. Te recht zullen wy ons na dit alles vragen: Zyn deze bewegingen wezenlyk alzoo, of zyn dezelven alleenlyk ſchynbaar? De beantwoording van deze vraag heeft de Sterrekundigen van alle tyden bezig gehouden; verſchillende ſtelſels ontleenden daarvan hunnen oorſprong: onder dezen zyn die van *Ptolomeus* en *Tycho Brahé* de aanmerkelykſten, en het was niet dan voor 250 jaaren, dat *Copernicus* dat ſtelſel, 't welk thans als het alleen ware, algemeen aangenomen Waereldſtelſel beſchouwd wordt, uitdacht; wy verklaarden dit in het 2e. Hoofdſtuk van het 1e. Boek en in het 1e. en 2e. van dit Boek, en wy willen thans alleenlyk, daar het met ons oogmerk niet overeen zoude komen in alle byzonderheden de waarheid van dit ſtelſel te betogen, eenige algemeene Handleidingen geven, om tot de *reſultate*, die hetzelve bevat, uit de beſchouwing van de ſchynbaare beweging des Hemels, te geraaken.

248. De bewyzen voor de waarheid van het ſtelſel van *Copernicus* zyn niet allen van denzelvden aart; eenige waarheden van hetzelve rus-

ten op de *Analogie*, en worden door dezelve tot dien trap van waarſchynlykheid gebragt, welke zeer na aan de zekerheid grenst, en die, daar zy overeenſtemmen met alle de naderhand gedane waarnemingen, en met de door *Newton* ontdekte leere der aantrekkingskracht, thans als zekere waarheden moeten geſchat worden; anderen daarentegen rusten op wiskundige gronden, en kunnen met dezelvde ſtrengheid betoogd worden waarmede elk *Problema* der Wiskunde kan betoogd worden; zoo is by voorb. de ſtelling dat de *Aarde* in één jaar om de *Zon* zich beweegt, en in denzelvden tyd 365 maal om haar' As draait, eigentlyk gezegd, voor geen wiskunſtig betoog vatbaar, maar de eenvouwigheid van werking, die wy overal in de natuur waarnemen, maakt het veel waarſchynlyker dat een ligchaam, 't welk by het geheelal als eene ſtip moet geacht worden, om zyn' As draait, dan dat ligchaamen, die millioen maal millioen mylen, van elkander verwyderd zyn, zich als 't ware vereenigen zouden, om in den korten tyd van 24 uuren om dit ſtip zich te bewegen; daarentegen worden de afſtanden der *Zon* van onze Aarde en van de overige

[redacted]

de *Aarde* zich beweegt, dat de *Aarde* in 24 uuren om haaren As draait, en niet de gantſche Sterrenhemel in denzelvden tyd om onze *Aarde*, dan moeten wy ons niet verbeelden dat dit eenige wezenlyke verandering maakt, in de reſultaten onzer waarnemingen van den loop der *Zon*, neen, deze uitkomſten worden maar omgekeerd, en het geen wy van de *Zon* gezegd hebben moet van de *Aarde* verſtaan worden, en wy verkrygen daardoor dien zelvden ſtand en beweging der *Aarde*, van welken wy in het 2. Hoofdſt. van dit Boek geſproken hebben; laat ons dit zoo kort mogelyk betogen: wy zullen ten dien einde eerst eene algemeene waarheid vooraf bewyzen, en dezelve op de *Zon* en *Aarde* toepaſſen.

250. *Ten eerſte.* Wanneer men van een ligchaam A tot een ligchaam B eene rechte lyn trekt, en het ligchaam A rondom het ligchaam B in zoodanig eene richting doet bewegen, dat de lyn AB, beſtendig in alle ſtanden van het ligchaam A dezelvde oppervlakte ſnyt, dan wordt het ligchaam A gezegd zich in het zelvde vlak te bewegen, en dit vlak wordt het vlak van deszelvs loopkring genaamd, dan of wy nu het ligchaam A om het ligchaam B dan of wy het ligchaam B om het ligchaam A doen bewegen, de lyn AB blyft dezelvde, en het vlak der beweging is ook hetzelvde. —— *Ten tweede.* Wanneer twee ligchaamen, 't zy dezelven eene klootſche, dan wel eene andere gedaante hebben, in elkander geplaatst zyn, dan is de uitwerking volmaakt het zelvde, of wy het bin-

binnenſte, dan wel het buitenſte om doen draaijen; verbeelden wy ons in het midden eener kamer te ſtaan, dan zullen wy immers even zoo wel alle voorwerpen na elkander even goed zien, of wy ons in het ronde draaijen, dan of wy ons verbeelden dat wy ſtil ſtaan, en dat de gantſche kamer zich rondom ons beweegt, ſchoon het eerſte veel gemakkelyker is; een onderſcheid egter zal 'er plaats hebben, namelyk wanneer wy van de linker- naar de rechterhand ronddraajen, om de voorwerpen in eene zekere orde te zien, dan zal de kamer zich van de rechter- naar de linkerhand moeten bewegen, opdat wy de voorwerpen in dezelvde richting elkander zien volgen.

251. Op deze gelegde gronden nu voort redeneerende, zoo volgt uit het *eerſte*, dat de lyn, langs welke de *Zon* van onze *Aarde* gezien wordt, dezelvde is van welke onze *Aarde* uit de *Zon* gezien wordt, en dat derhalve de *Aarde* in het vlak van den ſchynbaaren Zonneweg, dat is in het vlak der Ecliptica, om de *Zon* loopt, en dat dus het vlak der Ecliptica het *vlak is van den loopkring der Aarde.*



Aarde van het *Westen* naar het *Oosten* zal moeten zyn. —— Natuurlyk moet ook de As der *Aarde* denzelvden ſtand hebben als de ſchynbaare As des Hemels, en de *Equator* der *Aarde* zal dus ook in hetzelvde vlak vallen met den *Equator* des Hemels.

253. Uit al het bovengeſtelde trekken wy verder dit gevolg, dat dezelvde betrekking, welke wy gevonden hebben, tusſchen de *Ecliptica* en *Equator* des Hemels, § 243. ook plaats heeft tusſchen het vlak van den *loopkring der Aarde* en den *Equator der Aarde*; het vlak van den *loopkring der Aarde* helt dus met een' hoek van $23\frac{1}{2}^{\circ}$ op het *vlak van den Equator*, en de *As der Aarde* maakt derhalven met het *vlak van derzelver loopkring* een' hoek van 66_2°. — Nog hebben ons onze waarnemingen geleerd, dat de grootſte afwyking der *Zon* van den *Equator* op dezelvde tyden des Jaars voorvalt, wanneer de *Zon* in het zelvde Teeken van de *Ecliptica* is, en hier uit volgt dus van zelf, dat de helling der beide vlakken, van de *Ecliptica* en *Equator* namelyk, naar hetzelvde punt des Hemels gekeerd blyft, en dat dus ook de *As der Aarde* naar het zelvde punt des Hemels gericht blyft; waaruit al verder volgt, dat de *Noordpool der Aarde* in zekere ſtanden van de *Aarde* in derzelver loopkring veel nader aan dien loopkring moet zyn dan in anderen, en dat dus ook de *Zon*, die in het vlak van den loopkring der Aarde, dat is, in de *Ecliptica* ſtaat, in die ſtan-

ſtanden veel nader by de *Noordpool* is dan in andere ſtanden der Aarde, en dat dus ook de dagen in de Noordelyke gewesten der *Aarde* ten dien tyde veel langer moeten zyn dan op andere tyden, al het welk dus met het te voren gezegde § 87–92. van de waare beweging der Aarde, en de helling van haar' As op derzelver looplkring, volkomen overeenſtemt.

254. Laat ons, na dus gevonden te hebben hoedanig de onderſtelde waare beweging der *Aarde* met de ſchynbaare beweging des Hemels volkomen overeenſtemt, onderzoeken, op wat wyze wy tot de kennis der afſtanden en de omloopstyden der andere *Planeeten* geraaken. —— Het eerſte, dat ons hier voorkomt om nader te onderzoeken, is den afſtand waartenemen van onze *Aarde* van de *Zon*: de berekening van denzelven rust eenvouwig in het oplosſen van een' klootſchen driehoek; wy hebben, § 110, verklaard wat men door de *Horiſontaale Parallaxis* te verſtaan hebbe, en wy moeten nu onze aandacht vestigen op den driehoek A S T, Fig. 24; wy zagen, § 110, dat de hoek I S H de *Horiſontaale Paralaxis* uitdrukt; nu is de hoek A S T gelyk aan den hoek

ℓ middenlyn der Aarde te berekenen, en men heeft dus van den driehoek AST bekend, de zyde AT, den hoek AST, en den hoek TAS, welke recht is; drie dingen nu van een' driehoek bekend hebbende, weeten wy, dat wy ook de overige kunnen vinden, en kunnen dus de zyde TS, welke de afſtand der *Zon* van onze *Aarde* is, berekenen. — Wy onderſtellen hier de *Horiſontaale Parallaxis* als bekend, wy willen egter, omdat alles hier op de kennis van dezelve aankomt, met een enkel woord aanwyze hoe dezelve te vinden: men kan dezelve op verſchillende wyze berekenen, doch zie hier het eenvoudigſte geval: laaten twee waarnemers onder denzelvden *Meridiaan* gelyktydig hetzelvde Hemellicht waarnemen; laat de eene in A, Fig. 24. en de andere in G geplaatst zyn, dan zal de waarnemer in G het Hemellicht in H in zyn *Zenith* zien, en de waarnemer in A zal hetzelve in zyn' Horiſon in E zien; de hoek AHT, welke de *Horiſontaale Parallaxis* is, zal gelyk zyn aan den hoek HTF, welke gelyk is aan het *Compliment* van den boog AG; de boog AG nu is het verſchil van *Breedte* tuſſchen de twee plaatſen alwaar zich de waarnemers bevinden, en de *Horiſontaale Parallaxis* is dus gelyk aan het *Compliment* van dit verſchil van *Breedte*.

255. Zoodra men den afſtand der *Zon* van onze *Aarde* bekend heeft, kan men ook de afſtanden der overige Planeeten van de *Zon* en van onze *Aarde* berekenen; dan men moet hiertoe eerst den omloopstyd der Planeet om de *Zon* bekend hebben: deze zou zeer gemakkelyk waartenemen zyn,

wan-

wanneer wy de Planeet uit de *Zon* zelve waarnamen, dan, daar wy dit niet kunnen doen, maar van onze *Aarde* de Planeeten moeten waarnemen, ſpreekt het van zelf, dat men ten dien einde een' anderen weg moet inſlaan; en welke is deze? 'Er zyn zekere ſtanden, in welken wy eene *Planeet* met hetzelvde punt des Hemels zien overeenkomen, als waren wy in de *Zon* zelve geplaatst, en deze zyn het van welken men zich moet bedienen om de omloopstyden der *Planeet* te berekenen; de bedoelde ſtand is de *Oppoſitie*, § 84; de *Planeet* ſtaat alsdan, uit de *Zon* gezien, in dezelvde lyn met onze *Aarde:* haare *Heliocentriſche Lengte* is dus dezelvde met die der Aarde, en verſchilt derhalven juist 6^t met de Lengte der *Zon*; twee aldus waargenomen *Oppoſitiën* geeven ons de *Heliocentriſche Lengte* der Planeet voor twee verſchillende tyden, en wy kunnen derhalve, weetende hoe veel tyd de Planeet beſteed om een' zekeren boog van den Cirkel te doorlopen, gemakkelyk berekenen, hoe veel tyd zy nodig heeft om den geheelen Cirkel te doorlopen; zie hier een voorbeeld, het welk, om de eenvouwigheid der berekening, dit gezegde zeer duidelyk maaken zal:



Jupiter was dus van den 6 April, 1768. tot den 8 May, 1769. 1t 0° 11' 9" in lengte toegenomen, en wy zien dus uit dit verſchil van Lengte, dat *Jupiter* nagenoeg in één Jaar één Teken in Lengte toeneemt, dus hy 12 Jaaren nodig heeft om alle de 12 Tekens te doorloopen, en alzo ééne omwenteling te volbrengen; naauwkeuriger bereekeningen egter hebben ons geleerd, dat hy geen volle 12 Jaaren tot eenen omloop om de *Zon* beſteed, § 66; doch het is genoeg dat wy hier in 't algemeen getoond hebben; hoe de omloopstyden der Planeeten, door middel der *Oppoſitiën* kunnen gevonden worden; want om dezelven naauwkeuriger te bereekenen, moet men op den ſtand van de *Apſidiën* der Planeeten acht geeven, naardien haare beweging in alle de deelen van haaren loopbaan niet even ſnel is; § 59. dat dit zoo is, wordt volkomen door de waarnemingen bevestigd: vergelyken wy daartoe twee anderen *Oppoſitiën* van *Jupiter*, en wy zullen dit duidelyk zien:

den 15 Sept. 1749. was de Lengte van *Jupiter*; in zyne *Oppoſitie* waargenomen, 11t 23° 32' 16"

den 23 Oct. 1750. was de Lengte van diezelvde Planeet op diezelvde wyze waargenomen : : 1 0 26 20

1t 6° 54' 4"

zoo dat wy hier eene beweging van *Jupiter* van 1t 6° 54' 5" in den tyd van 405 dagen verkrygen, daar wy te vooren ſlechts 1t 0° 11' 9" in 397 dagen vonden; en de beweging van *Jupiter*

dus in 't laatſte geval veel ſneller was, dan in 't eerſte voorbeeld.

256. De omloopstyden der Planeeten bekend hebbende, valt het niet moejelyk meer ook haare afſtanden te berekenen; want laat Fig. 18, S de Zon, D de Aarde, en N eene zekere Planeet zyn, dan zal de boog ♈ ♋ ♎ ♑ de *Heliocentriſche Lengte der Aarde* zyn, welke altoos 6 Teekens met de *Lengte der Zon* verſchilt; de boog ♈ ♋ ♎ G zal de *Heliocentriſche Lengte der Planeet* zyn, welke wy, zoo dra wy derzelver omloopstyd kennen, ten allen tyde kunnen berekeren; de boog ♈ ♋ ♎ β is de *Geocentriſche Lengte der Planeet*, die door ons kan worden waargenomen; wy hebben dus in den driehoek SDN bekend, den hoek NSD, welke gelyk is aan het verſchil van de *Heliocentriſche Lengte der Aarde en der Planeet*; den hoek SDN, die gelyk is aan de *Geocentriſche Lengte der Planeet*, min de *Lengte der Zon*; en eindelyk de zyde SD, welke de afland is der *Zon* van de *Aarde*; en wy zyn derhalven in ſtaat, door eene eenvouwige oplosſing van den driehoek SDN, den afſtand SN der *Planeet* van de *Zon*, of wel den afſtand DN der *Planeet* van de *Aarde* te bereekenen.

257. Dan, keeren wy na dezen uitſtap weder tot de Beſchryving der Hemel-Globe; wy meenen genoeg gezegd te hebben, om eene Handleiding te geeven, welke ons in ſtaat kan ſtellen, uit de beſchouwing van de *ſchynbaare* beweging des Hemels de *waare* beweging der *Aarde* en der *Planee-*

neeten afteleiden, of ten minſte die bewyzen voor de waarheid van het gezegde omtrent dezelve zelf optezamelen, welken ons by het genoegen dat het altoos geeft op eigen ondervinding iets voor waarheid aantenemen, de verzekering geeft, dat alles wat de Sterrekunde voordraagt voor het ſtrengſte wiskundig betoog vatbaar is.

258. Wy hebben den *Horiſon* en *Meridiaan*, welken de voornaamſte Cirkels zyn die de Hemel-Globe omringen, reeds leeren kennen, § 205. dan wy hebben nog niets van derzelver verdeeling gezegd: een woord dus nog van dezelve; wy hebben te vooren reeds aangemerkt, § 203. dat de verdeeling, welke eigentlyk *alleen* tot den *Horiſon* betrekking heeft, die is van het *Azimuth* en van de 32 *ſtreeken van het Compas*; wy zouden dus voldaan hebben met deze verdeeling alleen op *den Horiſon* te brengen, dan daar het gebruik wil, dat men ook op denzelven den *Almanak* plaatst, om, door middel van denzelven, voor elken dag des Jaars de plaats der *Zon* te kunnen vinden, hebben wy, te meer daar het een wezenlyk gemak in het gebruik der Globe verſchaft; denzelven ook op onzen *Horiſon* der Hemel-Globe geplaatst; wy hebben egter, opdat men zich nimmer verbeelde, dat dezelve eene verdeeling zy, welke tot den *Horiſon* behoort, dezen zorgvuldig afgeſcheiden van de eigentlyk tot den *Horiſon* behoorende verdeeling van het *Azimuth*, en van de *ſtreek des Winds*, en, om deze reden, deze verdeeling op den *Horiſon* het naast by de Globe geplaatst;

en dezelve door eene zwaare lyn van de verdeeling der *Ecliptica* en der *Maanden des Jaars* afgeſcheiden, terwyl wy, na deze mede door eene dikke lyn te hebben afgeſcheiden, ook die verdeeling op denzelven gebragt hebben, welke meer byzonder voor den loop der *Maan* geſchikt is; wy hebben de verklaring van deze beide laatſte verdeelingen, § 75. daar wy van de *Aard-Globe* ſpraken, reeds gegeeven; zy is op de *Hemel-Globe* volmaakt dezelvde, en behoeft dus geen afzonderlyke verklaring, en wy ſtappen dus, daar wy het *Azimuth* in het gebruik der Globe nader zullen leeren kennen, en ook reeds, § 113. van hetzelve geſproken hebben, hier van den Horiſon af. — De *Meridiaan* der Hemel-Globe is even op dezelvde wys verdeeld als die der Aard-Globe, § 126; men moet de graaden der Poolshoogte altoos op die zyde van denzelven tellen, alwaar de graaden van de Pool af, 10, 20, enz. beginnen te tellen, dan wyst de graad des *Meridiaans* welke met de *Breedte der Plaats* overeenkomt, en welke aan de andere zyde van de Pool gelegen is, altoos het *Zenith* aan, recht onder het welke men zich altoos de plaats, op welke de waarnemer zich bevind, moet voorſtellen te zyn; men moet dus, hoe zeer de veronderſtelde binnen in de *Hemel-Globe* geplaatſte *Aard-Globe* begreepen moet worden, onbewegelyk te zyn, zich altoos verbeelden, dat men, by het ſtellen der *Hemel-Globe* voor eene zekere plaats, de *Aard-Globe* zoodanig op haar' As draait, dat de plaats zel-

zelve boven, dat is in het *Zenith*, te ſtaan kome; dat dit noodzakelyk zy, zullen wy, over het gebruik der *Spheer* handelende, nader betogen.

259. Na den *Horiſon* en *Meridiaan*, komt op de *Hemel-Globe* nog in aanmerking eene beweegbaare ½ Cirkel DFE, Fig. 40, welke zich om de Poolen der Globe beweegt, die dus op elken graad des *Equators* geſteld kan worden, welke in graaden verdeeld is, en aan welken een beweegbaar *Zonnetje* is vastgemaakt, dat geſchikt is om op dien graad der *Ecliptica* te ſtellen, in welken de *Zon* zich op een' zekeren dag bevindt; deze ½ Cirkel is niet anders dan een *Declinatie-Cirkel*, dien wy, § 103. reeds beſchreven hebben.

260. Wy gebruiken tot *Uur-Cirkel*, voor onze nieuwe Hemel-Globe, den *Equator* derzelve, op welken de verdeeling der Uuren is afgedeeld, terwyl onze *Uurwyzer* geplaatst is aan eenen van koperdraad gemaakte ½ Cirkel BGH, Fig. 40. op welken dezelve verſchuifbaar is, om behoorlyk op het Uur geſteld te kunnen worden, gelyk ons het gebruik der Hemel-Globe nader zal leeren.

V. HOOFDSTUK.

BESCHRYVING VAN DE SPHÆRA ARMILLARIS.

261. De *Sphæra armillaris* is een werktuig, in het welke men de Cirkels, van dewelken men zich in de Sterrekunde pleeg te bedienen, in een zeker zamenſtel gebragt heeft, om door hetzelve hunnen betrekkelyken ſtand, gelyk ook hunnen ſtand met betrekking tot onze Aarde te leeren kennen; zy verſchilt daarin van eene Globe, dat deze beſtaat uit eene kloot, welke eene gelyke oppervlakte heeft, welke dus, niet doorzigtig zynde, toelaat op dezelve allerlei Figuuren en Cirkels in verſchillende rigtingen te trekken, daar de Spheer is te zamen geſteld uit ringen, of losſe Cirkels, 't welk haar den naam van Sphæra *armillaris* of *ring* Spheer heeft doen bekomen.

262. Even dus gelyk de *Globe*, is ook de *Spheer* geſchikt om de verſchillende Problema's der Sterrekunde door middel van dezelve optelosſen, met dit onderſcheid egter, dat deze Problema's zich meestal tot de *Zon* en *Maan* bepaalen, en niet zoo zeer tot de *vaste Sterren* betrekking hebben, alhoewel men dezelven ook voor de vaste Sterren geſchikt zoude kunnen toeſtellen, gelyk de Beſchryving, welke wy van de nieuwe inrichting onzer *Aard-Globe* gegeeven hebben, zulks bewyst.

263. Gewoonelyk word dezelve vervaardigd even als wy die in de II Pl. hebben afgebeeld: de *Horiſon* rust dan op vier ſtyltjens, welken de geheele *Spheer* dragen, en alzoo derzelver ſtoel uitmaaken; wy hebben in den loop van dit werkje reeds zoo veel van de Cirkels der Spheer gezegd, dat het eene noodelooze herhaling zoude zyn 'er hier iets meer van bytevoegen, dan het is ons oogmerk bepaaldelyk in dit Hoofdſtuk eene nieuwe inrichting der Spheer te beſchryven, welke gegrond is op de inrichting, welke wy aan onze *Aard-Globe* gegeeven hebben, en welke naar ons inzien beter geſchikt is ter verduidelyking dier denkbeelden, welken ons de beweging der Hemelſche ligchaamen, derzelver ſtand en verſchynſelen leeren kennen en naarſpooren.

264. De *Spheer*, zoo als dezelve door ons vervaardigd wordt, ziet men afgebeeld in de 46 Fig.; de *Ecliptica* ABC derzelve is even gelyk in onze nieuwe Aard-Globe *Horiſontaal* en onbeweeglyk geplaatst, en is in teekens en graaden afgedeeld; de *Equator* DBE helt op de *Ecliptica* met een' hoek van $23\frac{1}{2}$, en is in 360° verdeeld; op eenen afſtand van 90° van de beide Nachteveningspunten ziet men eenen anderen grooten Cirkel, FEGD, welke de *coulure der Zonneſtanden* is; de *coulure der Nacht-eveningen* wordt door eenen koperdraad Cirkel, welke in de afbeelding, om verwarring voortekomen, weggelaaten is, verbeeld; zoo wordook door Cirkels van koperdraad verbeeld de beide *Keerkringen* AH en CI, en de beide *Pool-*

zynde EL en MN; binnen in deze Spheer is een *Aard-Globetje* geplaatst, 't welk wy, wanneer de Cirkels der *Spheer* 6 duim diameter hebben, van 3 duim nemen; zyn de eerste grooter, dan nemen wy ook deze *Aard-Globe* grooter; deze *Aard-Globe* is in de Spheer beweegbaar met haar' As FG, en wordt door middel eener knop aan 't uitsteeksel G van den As geplaatst, rondgedraaid; aan het bovenste uiteinde van de Spil der Aarde, of aan de *N. Pool*, is een Uurwyzer vastgemaakt, welken met den As ronddraaijende, op een Uurplaatje de Uuren aanwyst; deze *Aard-Globe* is omringd door een' vlakken breeden rand welke in de Fig. duidelykheidshalve geschaduwd is: deze verbeeld ons het vlak des *Horisons*, en wordt door middel van een' $\frac{1}{2}$ Cirkel, die de *Meridiaan* verbeeld, om de *Globe* vastgehouden, draajende dus deze *Horison*, wanneer men denzelven met een paar papiere klemveertjens vastzet, met de Globe om, wanneer dezelve den *Horison* van een zekere plaats voorstelt; dat wy voor de beide *Keerkringen*, *Poolcirkels* en de *colure der Nachteeningen*, slechts Cirkels van koperdraad neemen is daarom, omdat deze Cirkels van veel minder

welke van te veel belang is, om niet duidelyk in derzelver grootte te worden aangeweezen; wy hebben niet verkozen in deze Spheer, gelyk men gewoonlyk doet, den *Zodiak* door eene ſoort van hoepelwyze band, even als men denzelven Pl. II. ziet, aftebeelden, omdat deze voorſtelling het denkbeeld van het *vlak* van de Ecliptica, en de verſchillende hoeken, welken hetzelve met den *Horiſon* maakt, te veel wegneemt, en dat het gantſche denkbeeld van den *Zodiak* niet van dat gewigt in de Sterrekunde is, dat men, om hetzelve duidelyk te maaken, gewigtiger voorſtelling behoeft ter zyde te ſtellen. — Een los ſtukje rond koper, op 't welk eene Zon geſneden is, en 't welk de *Artificieele Zon* door ons genoemd word, is by deze Spheer gevoegd, om op elken graad der Ecliptica geplaatst te worden, terwyl de *Maan*, aan een ½ Cirkeltje vastgemaakt, op elken graad van de Ecliptica kan geplaatst worden.

265. Deze Spheer, aldus te zamen geſteld, vertoont ons de *waare beweging der Aarde*, de verſchillende ſtanden des *Horiſons*, en de verſchillende hoeken, welken deze met den *Equator* en *Ecliptica* maakt, en wy kunnen aldus den *Op-* en *Ondergang* der *Zon*, der *Maan*, de *verwiſſeling der Saiſoenen*, enz. zeer duidelyk door dezelve afbeelden.

266. Dan, zoo zeer als wy de *waare* beweging der Aarde door eene Spheer afbeelden, behoeven wy ook de *ſchynbaare* beweging des Hemels

door middel der Spheer te kunnen afbeelden; dit door één en hetzelvde werktuig te doen valt moejelyk, ten minſte is aan zwarigheden onderworpen, welken de duidelykheid zouden kunnen benadeelen, en daarom niet verkiezelyk; wy gebruiken dus tot dit einde een eenigzins anders ingericht werktuig, te weeten: wy plaatſen de geheele *Spheer*, zoo als wy dezelve nu beſchreven hebben, alleenlyk den Uurcirkel en Uurwyzer, en de knop om de Aard-Globe te bewegen 'er afnemende, in eenen grooteren Cirkel OPQR, Fig. 47. zoo, dat de Spheer in denzelven zich vryelyk bewegen kan, doch dat de Aard-Globe ſtil ſta, en zetten vervolgends de Spheer met den Cirkel OPQR, in eenen op een' voet *Horiſontaal* geplaatſten Cirkel PSR, zoo, dat de Spheer met den Cirkel OPQR in den Cirkel PSR van de linker naar de rechter, en van de rechter naar de linker hand kan bewogen worden, om op de Poolshoogte van eene zekere plaats geſteld te worden; de Cirkel OPQR is niet anders dan een *algemeene Meridiaan*; de *Meridiaan*, zoo als dezelve op de Hemel-Globe gebruikt wordt, en de Cirkel PSR is een *algemeene Horiſon*, hetzelvde dat de

recht in 't Zenith kome, en vervolgends den *Horiſon*, die de Globe omringt, en in deze 47 Fig. ook door het geſchaduwde vlak is afgebeeld, op de Breedte der Plaats; dan zal deze in 't zelvde vlak met den *Horiſon* PSR te ſtaan komen, en de geheele Spheer zal ons de grond van de Conſtructie der *Hemel-Globe*, zoo als wy dezelve boven, § 205. verklaard hebben, zeer duidelyk aantoonen, terwyl wy, de beide Spheeren vergelykende, het verſchil en de overeenſtemming der *waare* en *ſchynbaare* beweging zeer duidelyk zullen kunnen leeren kennen.

hebben dat de *Uurwyzer* onzer nieuwe Aard-Globe is, op den gegeeven *Dag* in den Almanak, die op de *Ecliptica* der Globe gevonden wordt, achtgevende of het Jaar, van hetwelk men ſpreekt, een *Schrikkeljaar* zy, dan wel het 1e. 2e. of 3e. na het *Schrikkeljaar*, § 75, dit gedaan hebbende, verbeeld deze *Artificieele Zon* den *Zonneſtraal*, welke loodrecht op onze Aarde valt; en elke plaats der Globe, die by het ronddraajen derzelve, ('t welk altoos van de linker- naar de rechterhand moet geſchieden,) de punt van deze *Artificieele Zon* raakt, heeft de *Zon* in haar *Zenith*, terwyl het dan tegelyk op die plaats *Middag* is, als de *Zon* in derzelver *Zenith* is; dan elke ſtip van de Globe heeft haar' *Meridiaan*, § 118. en alle plaatſen, welken onder dezen zelvden *Meridiaan* gelegen zyn, hebben tegelyk *Middag*, § 120: dus is het niet alleen *Middag* voor die plaats in welker *Zenith* de Zon is, maar ook voor alle plaatſen, die onder denzelvden *Meridiaan* met deze plaats gelegen zyn; ligt nu deze plaats juist onder-een' der van 5° tot 5° getrokkene *Meridiaanen* op de *Aard-Globe*, dan valt het gemakkelyk te zien, welke plaatſen tegelyk *Middag*, dat is tegelyk de

270. Hieruit volgt nu van zelf, hoedanig men te werk gaan moet, *om den beweegbaaren Meridiaan op eene gegeeven plaats te ſtellen*: Men draaje, de Globe ſtil laatende ſtaan, den *beweegbaaren Meridiaan*, zoo dat deszelvs geteekende zyde, dat is die waar de graaden gevonden worden, over de plaats heenen ga, acht gevende om, wyl de *Meridiaan* op onze Globe een *geheele* Cirkel is, die zyde op de plaats te brengen, op welke de graaden van den *Equator* af beginnen te tellen.

271. Even door deze zelvde bewerking, dat is door den *Meridiaan* op eene gegeeven plaats te ſtellen, richt men ook den *Uurcirkel* voor die plaats; immers naardien men gewoon is op elke plaats der Aarde 12 uuren te tellen, wanneer de *Zon* in den *Meridiaan* is, daar de *Uurcirkel* aan den *Meridiaan* verbonden is, en daar het 12e. uur aldaar geteekend is, waar de Uurcirkel den Meridiaan ſnyd, zoo zal de *Artificieele Zon* altoos 12 uuren wyzen, wanneer zy in den *Meridiaan* van eene zekere plaats is, voor welke onze *beweegbaare Meridiaan* geſteld is.

272. Uit het boven gezegde volgt dus, dat daar alle plaatſen niet te gelyk de *Zon* in den *Meridiaan* hebben, het dus ook op alle plaatſen niet te gelyk 12 uuren is, en dat 'er dus een *verſchil van Uurtelling* op verſchillende plaatſen der Aarde plaats heeft; en wy worden dus als van zelven geleid tot het oplosſen dier Problema's, welken op deze verſchillende Uurtelling betrekking hebben; eene aanmerking egter over de wyze om

de

de Uuren op onze nieuwe Globe aantewyzen moeten wy nog vooraf laaten gaan.

273. De *Zon* heeft haaren ſchynbaaren loop in de *Ecliptica*; onze *Uurcirkel* ligt in het vlak des *Equators*, en deze beide vlakken zyn op ſommige plaatſen te verre van elkander verwyderd, dan dat men door middel der *Artificieele Zon* zelve, dan wanneer de *Zon* eenige graaden *Declinatie* heeft, met genoegzaame naauwkeurigheid op den *Uurcirkel* de Uuren zou kunnen aanwyzen: *hoedanig moet men zich in zodanige gevallen gedragen?*

274. Wy hebben, § 101. gezien, dat men tot het *vlak van den Equator* gewoon is den ſtand der vaste Sterren over te brengen, en, § 102. dat men dezen tot den *Equator* overgebragte ſtand de *Ascentio recta* eener Ster noemt; maar men kan ook op dezelvde wyze den ſtand der *Zon* tot den *Equator* overbrengen; en deze tot den *Equator* overgebragte plaats der *Zon*, dat is de *Ascentio recta* der *Zon*, zal altoos en in alle gevallen het Uur op den Uurcirkel naauwkeurig aanwyzen; men brenge derhalve den *Declinatie-Cirkel*, waarvan wy, § 103. reeds geſproken hebben, aan de *Artificieele Zon*, en plaatſe op dat punt van den koperen Cirkel DBE, Pl. VIII, die de *Equator* verbeeld, een' wyzer, welke de Uurwyzer zyn zal voor den gegeeven Dag.

II. PRO-

II. PROBLEMA.

Te vinden hoe laat het op eene gegeeven plaats zy, als het op eene andere plaats Middag is.

By voorbeeld: *Hoe laat is het te Petersburg als het te Amſteldam Middag is?*

275. Het is in dit geval hetzelvde wat Dag het ook zy, wyl het antwoord van deze vraag enkel van het verſchil van *Lengte* der beide gegeeven Plaatſen afhangt: wy plaatſen dus, gemakshalve voor het oplosſen van deze en dergelyke Voorſtellen, de *Artificieele Zon* in een der Nachteveningspunten, omdat de *Equator* de *Ecliptica* in deze punten ſnyd, en dus de aanmerking, § 274. in deze gevallen vervalt, brengen vervolgends den *Meridiaan* op *Amſteldam*, en draajen de Globe voorts zoo, dat het *Middag* zy te *Amſteldam*, dat is dat de *Artificieele Zon* den *beweegbaaren Meridiaan* ſnyd; voorts draaje men den *Meridiaan*, de Globe ſtil laatende ſtaan, en plaatſe denzelven op *Petersburg*, dan zal de *Uurwyzer* op den *Uurcirkel* 1 uur, 50′ naden middag voor den tyd aanwyzen, welke het te *Petersburg* is, als het te *Amſteldam Middag* is.

276. Hoe laat is het te *N. York als het te Petersburg* 12 *uuren op den Middag is?* de *Meridiaan* ſtaat nu op *Petersburg*, men draaje dus de Globe zoo, dat het *Middag* te *Petersburg* zy, en de Globe laatende ſtilſtaan, brenge men den *Meridiaan* op *N. York*; wanneer de Uurwyzer

5 uur 10′ voor den middag te *N. York* zal aanwyzen; uit vergelyking van deze twee voorbeelden, ziet men dus dat, daar *Petersburg* Oostelyk van *Amſteldam* gelegen is, het ook te *Petersburg* reeds nademiddag is, als het te *Amſteldam* Middag is, daar het te *N. York* nog voormiddag is, als het te *Petersburg* middag is, omdat dit Westelyk van *Petersburg* ligt; alle plaatſen dus, welken *Oostelyk* van eenige plaats gelegen zyn, hebben eerder Middag, daar alle plaatſen, welken *Westelyk* van eene zekere plaats gelegen zyn, laater Middag hebben: men kan dit, door het eenvouwig ronddraajen der Globe (mits men dezelve van de linker naar de rechterhand doe bewegen,) zeer duidelyk zien.

III. PROBLEMA.

Hoe laat is het te Peking, als het te Weenen 7 uur, 30′ voormiddag is?

277. Men plaatſe den *Meridiaan* op *Weenen*, draaje de Globe zoo, dat de Uurwyzer 7 uur, 30′ aanwyst (dat 7e uur namelyk 't welk ter



IV. PROBLEMA.

Waar is het Middernacht, als het te Peking Middag is.

278. Het is tegelyk *Middag*, zagen wy meermalen, voor alle plaatſen, die onder denzelvden *Meridiaan* gelegen zyn; dan de *Meridiaan* is eigenlyk maar een halve Cirkel, § 118, en de andere helft van denzelvden Cirkel is *Meridiaan* van eene plaats, welke 180° met de eerſte in Lengte verſchilt, § 122: dus is de andere helft van den *beweegbaaren Meridiaan* der Globe, *Meridiaan* van alle plaatſen, die 180° met *Peking*, by voorb: (de Meridiaan op Peking geſteld zynde,) in Lengte verſchillen; maar plaatſen, die 180° met elkander in Lengte verſchillen, verſchillen ook 12 uuren met elkander in Uurtelling, en hebben dus *Middernacht* als de eerſten *Middag* hebben, en dusdoende zien wy dat het aan *den Mond van de Rivier St. Laurens* — op de *Antilles* — in het *binnenſte gedeele van Zuid-America* — en op het *Eiland Falkland* Middernacht is, als het te *Peking* Middag is, wyl deze Landen en Eilanden onder de andere helft van denzelvden Cirkel, die Meridiaan van *Peking* is, gelegen zyn.

V. PROBLEMA.

Te vinden hoe laat het op eene zekere plaats is, als het Middernacht op eene andere is.

By voorbeeld: *als het te* Aſtracan *Middernacht is, hoe laat is het dan te* Amſteldam?

279. Men ſtelt den *beweegbaaren Meridiaan* op *Aſtracan*, en draait de Globe, tot dat het tegenovergeſtelde gedeelte des *beweegbaaren Meridiaans* aan den Uurwyzer kome (*), wanneer het Middernacht te *Aſtracan* zyn zal; vervolgends de Globe ſtil laatende ſtaan, draaje men den Meridiaan, en ſtelle dien op *Amſteldam*, wanneer de Uurwyzer 8 uuren, 50′ 's avonds voor den tyd van Amſteldam zal aanwyzen.

VI. PRO-

(*) Om alle dubbelzinnigheid voortekomen, moet men hier en altoos in 't vervolg opmerken, dat de *beweegbaare Meridiaan* van onze nieuwe Aard-Globe een *gebeele* Cirkel is, en dat de Meridiaan van eene zekere plaats maar een ½ Cirkel zynde, § 118, de *Meridiaan van Aſtracan*, eigenlyk gezegd, maar die ½ Cirkel van den beweegbaaren Meridiaan is, welke over *Aſtracan* gaat, en dat wy dus door het *tegenovergeſtelde gedeelte des beweegbaaren Meridiaans* verſtaan, de andere ½ Cirkel van denzelvden *beweegbaaren Meridiaan* van onze Globe: het is derhalve *Middag*, als die zyde van den beweegbaaren Meridiaan, die over de plaats gaat, aan de *Artificieele Zon* gebragt wordt, en *Middernacht* als de tegenovergeſtelde zyde van den *beweegbaaren Meridiaan* aan de *Artificieele Zon* gebragt wordt.

VI. PROBLEMA.

Te vinden waar het Middernacht is, als het 5 uuren, 30' nadenmiddag te Weenen is.

280. Men plaatst den *beweegbaaren Meridiaan* op *Weenen*, brengt vervolgends 5 uuren, 30' aan den Uurwyzer, door de Globe rond te draajen, en voorts de Globe ſtil laatende ſtaan, den Meridiaan aan de *Artificieele Zon*, wanneer alle die plaatſen *Middernacht* zullen hebben, welken onder de tegenovergeſtelde zyde van den *beweegbaaren Meridiaan* gelegen zyn; dusdoende zal men vinden, dat het *Middernacht* is in een gedeelte van *Siberiën — Chineer Tartaryën — China — 't Eiland Borneo*, op de *Oostkust van 't Eiland Java*, enz. als het 5 uuren, 30' nadenmiddag te *Weenen* is.

281. Wy achten deze voorbeelden genoegzaam om het gebruik des *beweegbaaren Meridiaans* duidelyk te leeren kennen; wy zullen van denzelven geduurig gebruik moeten maaken, doch willen, eer wy tot het gebruik van den *Heriſon* overgaan, noch het volgende doen opmerken. Het verſchil van *Uurtelling* ontſtaat enkel uit het verſchil van *Lengte* van twee plaatſen: dit heeft men duidelyk uit de oplosſing der voorgaande Problema's kunnen opmerken; derhalve kan men ook door eene zeer eenvouwige berekening het verſchil der *Uurtelling* weeten: om zich hiervan te overtuigen, behoeve men zich ſlechts te herinneren, dat wy boven, § 234, gezegd hebben, dat 'er 15° van

den *Equator des Hemels*, in één uur den *Meridiaan* pasſeeren: gevolgelyk pasſeeren 'er ook omgekeerd 15° van den *Equator der Aarde* de *Zon*, en bygevolg moet het ook op eene plaats, die 15° *Oostelyker* ligt dan de onze, één uur laater zyn, wyl die plaats, of de *Meridiaan* van die plaats, één uur vroeger de *Zon* gepasſeerd is; dat dit zoo is, daarvan kan men zich door middel onzer nieuwe *Aard-Globe* zeer duidelyk overtuigen; men plaatſe de *Artificieele Zon* ten dien einde op een' zekeren dag, en draaje de Globe eenmaal van de linker naar de rechterhand om, dan zullen alle de graaden van den *Equator* in één omwenteling de *Zon* pasſeeren: alle mogelyke Meridiaanen pasſeeren dus in één omwenteling de *Zon*; maar nu volbrengt de Aarde één omwenteling in 24 uuren, dus pasſeeren 360° in 24 uuren de *Zon*, ergo 180° in 12 uuren — 90° in 6 uuren — 45° in 3 uuren — 15° in 1 uur; en geeven wy acht op deze of geene plaats in 't byzonder, dan zullen wy zeer duidelyk bevestigd zien, 't geen wy zoo even zeide, dat eene plaats, die 15° met de onze in Lengte verſchilt, ook één uur vroeger *Middag* heeft, zoo ze *Oostelyk* van ons ligt, of één uur laater, zoo ze *Westelyk* van ons geplaatst is; dus behoeven wy het verſchil van *Lengte* van twee plaatſen maar in tyd te veranderen, om het verſchil van Uurtelling te kennen.

By voorb: *Batavia* ligt op de

Lengte van	. . . .	124°	33′ 46″
Copenhagen op	. . .	30	15 30
verſchilt van lengte		94°	18′ 16″

wel-

welke 94° 18′ 16″ van den Equator, uitmaken 6 uuren, 17′ 13″ in tyd: des het altoos 6 uuren 17 13″ laater te *Batavia* is dan te *Copenhagen*.

282. Ten einde dit verſchil van Uurtelling ſpoedig te kunnen berekenen, is de wyze om de *lengte* eener plaats *Oost-* of *Westwaards* van eene andere te tellen, zoo als wy die, § 119, opgaven, zeer gemakkelyk, en inzonderheid wanneer men die Lengte niet in *graaden* maar in *Uuren* berekent; want dan wordt die Lengte zelve te gelyk het verſchil van Uurtelling; zoo zagen wy, § 119, dat *Greenwich* 2° 20′ 15″, westelyk van *Parys* gelegen is, en het is om deze reden altoos 9′ 21″ vroeger te *Greenwich* dan te *Parys*; men ziet hier verder uit, waarom de Sterrekundige Tafelen altoos voor eenen zekeren *Meridiaan* berekend worden; omdat men, dezelven voor een zekeren bepaalden tyd moetende berekenen, die berekent voor den Middag van de plaats, voor welker *Meridiaan* zy geſteld zyn.

Van de Vereffening des Tyds.

283. Wy hebben in de voorgaande § §. geſproken over de wyze der Uurtelling, en in dezelve onderſteld, dat men altoos 12 uuren telt, of den Middag berekent, op het oogenblik dat de *Zon* in den *Meridiaan* is: dit is ondertuſſchen niet altoos waar; want, daar de *Aarde* ſneller of langzaamer loopt naar dat dezelve digter by de *Zon* of verder van dezelve af is, § 59. 60, zoo zou hier uit volgen, dat de eene dag

langer zou zyn dan de andere, en dat dus ook de Uuren niet allen even groot zouden zyn, 't geen men egter in het burgerlyke gebruik onderſtelt; de grondſlag egter van alle onze Uurtelling is de ſchynbaare beweging der *Zon*, en het is naar derzelver loop dat men de Uurtelling, welke wy gewoon zyn te gebruiken, regelt; hiervan is men gewoon in de Sterrekunde onderſcheid te maaken, tuſſchen den *waaren* en *middelbaaren* tyd, terwyl het verſchil tuſſchen deze beiden de *vereffening des tyds* genaamd wordt.

284. De *waare tyd* is die, welke door de *Zon* zelve word aangewezen, en de *middelbaare* die, van welken wy gewoon zyn gebruik te maaken; alle tyd word veronderſteld te beſtaan in eene opeenvolging van oogenblikken, welken allen gelyk zyn, en de *Zon* kan dus in dit opzicht geen juiſte maat van den tyd zyn, alhoewel wy ons egter van dezelve bedienen moeten om den *middelbaaren* tyd te vinden, daar het de *waare tyd* alleen is, welke kan waargenomen worden. — Indien men een Uurwerk veronderſtelt, dat een' eenpaarigen gang hield, en hetzelve op een' zekeren dag des Jaars 12 uuren aanwees, als de *Zon*

[redacted]

285. Wanneer de *Zon* den *Meridiaan* verlaat, en den volgenden dag wederom aan denzelven komt, heeft de *Aarde* in dien tusſchentyd éene omwenteling volbragt, en de *Zon* heeft dus ſchynbaar 360° doorlopen; doch daar de *Aarde* in dien tusſchentyd ook in haaren loopkring gevorderd is, zyn het eigentlyk 59′ 8″ meer als 360°, welken de *Zon* ſchynbaar heeft doorgelopen, als zy weder aan den *Meridiaan* komt: men ziet dit zeer duidelyk, wanneer men de *Artificieele Zon* op een' zekeren dag des Jaars op de *Ecliptica* plaatst, en den *beweegbaaren Meridiaan*, by voorbeeld, op *Amſteldam* plaatſende, de Globe draait tot de *Zon* in den *Meridiaan* van *Amſteldam* ſtaat: dan zal, wanneer men de Globe eens ronddraait, de *Zon* nog niet aan den *Meridiaan* zyn, omdat men veronderſtellen moet dat de *Zon* in dien tusſchentyd omtrent één' graad in de *Ecliptica* gevorderd is, en wy dus de *Artificieele Zon* op den volgenden dag moeten plaatſen, en derhalve de Globe nog eene kleine beweging geven, om de *Zon* wederom in den *Meridiaan* te doen komen; zvaren nu deze dagelykſche vorderingen der *Aarde* in haaren loopkring, en dus ook de ſchynbaare beweging der *Zon*, altoos gelyk, dan zouden ook alle dagen gelyke lengte hebben; dan daar de *Zon* in 't begin van July in 24 uuren, 57′ 11″ langs de *Ecliptica* door haare ſchynbaare beweging gevorderd is, en in 't begin van January 61′ 11″ in 't zelvde tydverloop aflegt, zoo zyn ook zeker de dagen in January 4′ langer dan in

July, en de Uuren dienvolgens ook (*): dit is de eerſte oorzaak, welke de dagen ongelyk maakt.

286. By deze *eerſte* oorzaak, welke van de ſchynbaare beweging der *Zon* afhangt, voegt zich nog eene *tweede*, welke uit den ſtand der *Ecliptica* met betrekking tot den *Equator* voortvloeit; het is niet genoeg dat de beweging der *Zon* in de *Ecliptica* gelyk is: zy moet het ook zyn in den *Equator*, omdat het op den *Equator* is, dat wy gewoon zyn onze uuren te tellen; al onderſtelt men nu dat de *Zon* eene gelyke beweging in de *Ecliptica* had, zoo zou dezelve zulks nog niet in den *Equator* hebben, omdat de verandering van de *Aſcenſio recta* der *Zon* in éénen Dag niet altoos gelyk is aan de verandering van de *Lengte der Zon*: om dit duidelyker te maaken, plaatſe men de *Artificieele Zon* eens in de *Ecliptica* op ♈ 0°, en dus in het Nachteveningspunt van de Lengte; de *Aſcenſio recta* der *Zon* is nu ook 0°; veronderſtellen wy nu dat de *Zon* in 10 dagen 10° op de *Ecliptica* gevorderd is, dan zal zy geen 10° op den *Equator* gevorderd zyn, maar ſlechts 9°: om dit te zien, plaatſe men de *Artificieele Zon*

[redacted]

van 0ᵗ 29°, haare *Ascenſio recta* ſlechts zyn 18° — op de Lengte van 1ᵗ of 30° zal de *Ascentio recta* zyn 28° — op de Lengte van 2ᵗ of 60° afſtand van 't Nachteveningspunt zal de *Ascenſio recta* zyn 58° — en op de Lengte van 3ᵗ of 90° afſtand van 't Nachteveningspunt zal de *Ascenſio recta* zyn 90° gelyk aan de *Lengte*; zie hier de tweede oorzaak van het verſchil van den *waaren* en *middelbaaren* tyd.

287. Om dus eenen tyd te verkrygen, welke eenpaarig is, moet men eene *ſchynbaare Zon* veronderſtellen, welke in den *Equator* met eene eenpaarige ſnelheid in één Jaar rondloopt; deze *ſchynbaare Zon* zal in ſommige tyden des Jaars met de *waare Zon* tegelyk aan den *Meridiaan* zyn, op anderen de *waare Zon* voor uitloopen, en op andere tyden de *waare Zon* volgen; wy zyn gewoon *Middag* te rekenen, als deze *ſchynbaare Zon* aan den *Meridiaan* is, en moeten dus, daar het enkel de doorgang van de *waare Zon* door den *Meridiaan* is, welken wy kunnen waarnemen, de hoegrootheid van de *Vereffening des tyds* kennen, om den *middelbaaren* tyd te kennen, van den welken wy ons gewoon zyn te bedienen.

288. Men heeft Tafels uitgedacht, door dewelken men voor elken dag des Jaars de *Vereffening des tyds* vinden kan, dan daar 'er nog andere kleine verſtooringen in den loop der *Aarde*, en dus ook in den ſchynbaaren loop der *Zon*, door de aantrekkingskragt der *Maan*, van *Venus* en van *Jupiter* veroorzaakt, plaats hebben, zoo kunnen deze Tafels voor alle Jaaren niet even naauwkeu-

rig

tig zyn; waarom men in de *Connoisfance des Temps* eene colom gewoon is te plaatſen, het opſchrift hebbende *Temps moyen au Midi vrai*, (Middelbaare Tyd op den waare Middag,) dat is de tyd, welken een goed Uurwerk moet aanwyzen, op het oogenblik dat het middenpunt der *Zon* in den *Meridiaan* is, en waardoor men dus ten allen tyde in ſtaat is den *middelbaaren* tyd te vinden, en alzoo zyn Horologie te reguleeren.

289. Wellicht vraagt men nu, *welke is dan de tyd, dien men, van eene Globe gebruik makende, vindt? is dit de waare of middelbaare tyd?* Indien men veronderſtelt, dat de *Lengte* der Zon, welke men op de *Ecliptica* der Globe vindt aangeteekend, de *waare* lengte zy, dan is het de *waare tyd*, die door eene Globe wordt aangewezen; doch daar men niet anders dan de *middelbaare* lengte op eene Globe kan aanteekenen, zal dezelve iets met den *waaren tyd* kunnen verſchillen, alhoewel ze egter meer met den *waaren* dan wel met den *middelbaaren tyd* overeen zal komen; wil men egter, om zich te oeffenen, hieromtrent met meer naauwkeurigheid handelen, dan gaa men op de volgende wyze op onze nieuwe Aard-Globe te werk.

VII. PROBLEMA.

Den waaren en Middelbaaren Tyd door middelder Globe aantewyzen.

290. Men zoeke in de *Connoisfance des Temps* voor den gegeeven Dag de *Lengte der Zon*, en plaat-

plaatſe op den gevonden graad de *Artificieele Zon*; vervolgends brenge men deze aan den *Meridiaan*, en zette den Uurwyzer op het Uur en Minuut, dat men voor dien dag vindt aangeteekend voor den middelbaaren tyd op den waaren Middag, dan zal deze Uurwyzer de *Middelbaare* en de *Artificieele Zon* (of wel den graad van den Equator, die met dezelve overeenkomt, § 274.) den waaren tyd aanwyzen; zoo vindt men by voorb: dat de Lengte der Zon op den 17 Nov. 1801. te *Parys* is, 7ᵗ 24° 42′ 23″, en dat het 11 uuren 45′ 10″ op den *waaren Middag* van dien dag is; derhalve plaatſe men de *Artificieele Zon* op 7ᵗ 24° 42′, den *Meridiaan* op *Parys*, en de Globe gedraaid hebbende dat de *Zon* in den *Meridiaan* is, den Uurwyzer op 11 uuren, 45′ dan kan men den *middelbaaren* en *waaren* tyd tegelyk, gelyk boven gezegd is, vinden; de Uurwyzer verbeeld dan de *ſchynbaare Zon*, die eenpaarig veronderſteld word in den *Equator* elken dag 59′ 8″ afteleggen, des men derzelver plaats voor dat geheele Jaar door eene eenvouwige bereekening gemakkelyk kan vinden, indien men niet verkoos dit telkens naar te zien; zullende men, dus voortgaande, vinden hoe deze *ſchynbaare Zon* ſomts voor- of agter de *waare* is, en op andere tyden tegelyk met dezelve aan den *Meridiaan*; zoo zal de *ſchynbaare Zon*, de *waare* na den 17 Nov. naderende, op den 26 Dec. 1801. te gelyk met de *waare Zon* aan den *Meridiaan* zyn, en de vereffening des tyds dus 0 zyn; wanneer na dien tyd de *ſchynbaare Zon* de *waare* vooruit gaat, den 11 Feb. 1802.

de grootſte afwyking heeft, en vervolgends de naare Zon weder nadert enz.

VIII. PROBLEMA.

Den Horiſon te ſtellen op eene bepaalde Breedte:

By voorbeeld: *van 60° Noorder Breedte.*

291. By het gebruik der Globe, naar de gewoone wyze gemonteerd, vindt men een Problema, *om de Globe te ſtellen op de Poolshoogte van eene zekere Plaats:* dit Voorſtel vervalt in het gebruik onzer nieuwe Aard-Globe, doordien de Globe zelve in derzelver ſtoel geen verandering van ſtand ondergaat, het geen men zich wel moet herinneren, daar wy integendeel, van een *beweegbaaren Horiſon* gebruik maakende, dezen die beweging geeven, welke men anders gewoonlyk aan de Globe geeft; wy hebben in Fig. 30. den *beweegbaaren Meridiaan — Horiſon-* en *Uurcirkel* van onze nieuwe Aard-Globe in haaren betrekkelyken ſtand afgebeeld, en in § 130. de Beſchryving van dezelve gegeeven: het is nodig, die § na te leezen,



Zuider Breedte is, gelyk is aan de gegeeven Breedte: dus moet de boog NA, welke op den *beweegbaaren Meridiaan* gemeeten wordt, in ons geval 60° zyn.

292. Men moet hierby aanmerken 1°. dat de boog NA of ZC altoos genomen moet worden op dat gedeelte des *beweegbaaren Meridiaans*, op hetwelk de getallen van de Pool af beginnen te tellen. — 2°. Dat het punt A van den *Horiſon* altoos dat punt van denzelven is, waar *Noord* gegraveerd ſtaat. — 3°. Merke men aan, dat als de *Horiſon* voor eene gegeeven *Noorder Breedte* geplaats is, hy tevens ook voor denzelvden graad van *Zuider Breedte* geplaatst is, omdat de Horiſon ABCD, Fig. 30, zoo wel *Horiſon* is van de plaats T als van de plaats V.

IX. PROBLEMA.

De Geographiſche Lengte en Breedte eener Plaats op de Globe te vinden.

By voorbeeld: *van Amſteldam.*

293. Ten dien einde plaatst men den *beweegbaaren Meridiaan* op *Amſteldam*, en ziet welken graad deze op den *Equator* der Globe aanwyst, welke graad de *Lengte* der plaats zyn zal; vervolgens zie men welke graad op den *beweegbaaren Meridiaan* door de plaats zelve wordt aangeweezen, en deze zal de *Breedte* der Plaats zyn: dusdoende vindt men voor de *Lengte* van *Amſteldam* 22° 31', en voor de *Breedte* 52° 21' Noorder Breedte.

X PROBLEMA.

Den beweegbaaren Meridiaan en *Horiſon te ſtellen overeenkomſtig de Lengte en Breedte van eene zekere plaats.*

By voorbeeld: *Amſterdam.*

294. Dit Voorſtel vervangt eigenlyk gezegd het gewoone Voorſtel, *om de Globe op de Poolshoogte van een zekere Plaats* te ſtellen, omdat wy niet alleen op de *Breedte* maar ook op de *Lengte* der plaats in het gebruik onzer Globe acht geeven; men plaatſe dus ten dien einde den *beweegbaaren Meridiaan* op *Amſteldam*, dat is op de Lengte van 22° 31′, en den *Horiſon* op de *Noorder Breedte* van 52° 21′, volgends het VIII Problema, § 291 en 292. en alles is in order; egter zal men weldoen, door middel van een paar papieren klemveêrtjens, den ſtand van den *Meridiaan* en *Horiſon* te verzekeren, opdat men ſtaat kunne make dat dezelven door het ronddraajen der Globe niet veranderen.

XI. PROBLEMA.



Breedte van *Amſteldam* geſteld hebbe. Zie de voorgaande §; door dit middel is ook de Uurcirkel voor *Amſteldam* geſteld; voorts plaatſe men de *Artificieele Zon* in de *Ecliptica* op 4° 18°; de Lengte der *Zon* voor den 10 Aug. en den Uurwyzer op den graad van de *Aſcenſio recta der Zon*, en draaije de Globe, tot dat de *Artificieele Zon* aan den *Ooster Horiſon* kome, wanneer de Uurwyzer 4 uuren 40′ voor den tyd van den *Opgang* der *Zon* zal aanwyzen. — Vervolgens gaa men voort met de Globe te draaije tot dat de *Artificieele Zon* aan den *Wester Horiſon* kome, en zie wat uur de Uurwyzer aanwyst, wanneer men bevinden zal, dat de *Zon* den 10 Augustus ten 7 uuren 20′ *Ondergaat*.

296. Wy moeten hier doen opmerken, dat wy, van den *Horiſon* ſpreekende, eigenlyk daardoor die zyde van denzelven verſtaan, op welke de graaden van 't *Azimuth* uitloopen, en dus den kant, welke naar de Noord-Pool gekeerd is.

XII. PROBLEMA.

De ſtreek des Winds te vinden in dewelke de Zon Op- of Ondergaat, als mede derzelver Azimuth by haaren Op- of Ondergang.

297. Wanneer men de *Artificieele Zon* aan den *Ooster Horiſon* brengt, om den tyd van derzelver Opgang te vinden, moet men opmerken welke *ſtreek des Winds*, en welken graad van het *Azimuth* de punt van de *Artificieele Zon* op den *Horiſon*

zelven aanwyst; dit doende, en ook by den Ondergang der *Zon* daar op acht gevende, zal men vinden, dat de *Zon* den 10 Augustus te *Amſterdam* in het Oost-Noordoosten *Opgaat*, dat derzelver *Azimuth* is 115°, en dat dezelve *Ondergaande* in het West-Noordwesten, onzen *Horiſon* verlaat met een gelyk *Azimuth* als by derzelver Opgang.

XIII. PROBLEMA.

Door middel van den Breedte-Cirkel den Tyd van den Op- en Ondergang der Zon voor een' zekeren Dag en Plaats te vinden.

298. Wy hebben, § 268. reeds niet onduidelyk te kennen gegeeven, dat wy van den *Breedte-Cirkel* onzer nieuwe Aard-Globe nog een ander gebruik wilde maaken, als het geen waartoe dezelve eigenlyk geſchikt is, te weeten om de *Breedte* van eene zekere Planeet of Ster aantewyzen, § 82 en 105, en het is hier de plaats van dit gebruik meer opzettelyk te ſpreeken. — Wanneer een kloots ligchaam door een ander



ken men op eene kloot trekt, cirkelvormig zyn moeten; deze Cirkel nu ſtaat altoos rechthoekig op den as der lichtkegel; want het is blykbaar dat de verlichting zich naar alle zyden van het middenpunt van het lichtgevend ligchaam even verre moet uitſtrekken; deze as nu der lichtkegel ligt, wanneer het duistere ligchaam eene beweging heeft om het lichtgevende, in het vlak van deszelvs loopkring: de Cirkel dan, die het verlichte van het duistere gedeelte afſcheid, ſtaat dus ook *rechthoekig* op dit vlak, en derhalve ſtaat de Cirkel, die het verlichte gedeelte der *Aarde* van het duistere gedeelte afſcheid, *rechthoekig* op het vlak der *Ecliptica*, en is dus een *Breedte-Cirkel*, § 82.

299. Voegt men nu hier in zyne gedachten by 't geen wy te voren hebben aangetoond, § 92. dat de As der *Aarde* beſtendig naar het zelvde punt des Hemels gekeerd ſtaat, dan volgt hier uit, dat deze Cirkel, die het verlichte van het duistere gedeelte der *Aarde* afſcheid, in éénen omloop der *Aarde* om de *Zon* ook eene omwenteling om de *Aarde*, met betrekking tot den ſtand van den As der Aarde, moet volbrengen; en hier uit volgt reeds van vooren, dat de Parallellen der Aarde niet dezelvde betrekking tot dezen Cirkel kunnende behouden, de deelen der Parallellen, die door dezen Cirkel (dien wy, kortheidshalve, ſlechts nu en in 't vervolg *Breedte-Cirkel* zullen noemen,) afgeſneden worden, niet altoos even groot kunnen zyn, § 18. en dat derhalve de tyd, dien eene plaats, by de dagelykſche omwen-

ning der *Aarde*, in het verlichte gedeelte derzelve doorbrengt, niet altoos even groot is, dat is: met andere woorden, dat *alle dagen* voor verschillende plaatsen der *Aarde* niet even lang kunnen zyn, behalve voor die plaatsen, die onder den *Equator* gelegen zyn, omdat de *Equator* en *Breedte-Cirkel*, beide *groote* Cirkels zynde, elkander altoos, in twee gelyke deelen, deelen, § 9. 300. De *Breedte-Cirkel* kan dus zeer gevoegelyk gebruikt worden, om het *verlichte* gedeelte der *Aarde* van het *onverlichte*, afgescheiden te verbeelden, en dus ook om den *Op-* en *Ondergang* der *Zon*, en dien tyd wanneer die voorvalt te kunnen vinden; dien plaatse derhalve (van het zelvde voorbeeld als by het XI. Problema gebruik makende,) den *beweegbaaren Meridiaan* op *Amsteldam* en de *Artificieele Zon* op 10 Augustus. Men zie vervolgends in wat graad der *Ecliptica* de *Zon* op dien dag staa, telle by dezen graad 3^{t} by, en stelle op dezen graad der *Ecliptica* (welke in dit geval 7^{t} 18° is,) den *Breedte-Cirkel*, dan zal de helft der Globe, die naar de *Artificieele Zon* toegekeerd is, het *verlichte* gedeelte der Aarde, en de andere helft der Globe het *onverlichte* gedeelte voor een zeker nu nog onbepaald uur, aanwyzen; voorts draaije men de Globe zoo, dat *Amsteldam* onder den *Breedte-Cirkel*, aan de linkerhand van de *Artificieele Zon*, waar altoos de *middag* van elke plaats in het *verlichte* gedeelte geschied, te staan kome: op dit oogenblik nu heeft *Amsteldam* in het verlichte deel en de *Zon* gaat dus aldaar op, wyzende de Uurwyzer 4 uuren,

18' voor haaren *Opgang* aan; de Globe verder voortdraaijende, zien wy *Amſteldam* het verlichte gedeelte doorlopen, en vervolgends weder onder den *Breedte-Cirkel* aan de rechterhand der *Artificieele Zon*, waar altoos de *uitgang* van elke plaats uit het *verlichte* gedeelte geſchied, gekomen zynde, het verlichte deel verlaaten, op welk oogenblik de *Zon* voor *Amſteldam* ondergaat, en de Uurwyzer 7 uuren, 20' aanwyst.

XIV. PROBLEMA.

Te vinden welke plaatſen de Zon te gelyk met Amſteldam zien Opgaan op den 5 May.

301. Men handele even als in de voorgaande §, zette den *beweegbaaren Meridiaan* op *Amſteldam*, de *Artificieele Zon* op den 5 May, en den *Breedte-Cirkel* op 10° 15°, zynde 3° van de *Artificieele Zon* af, en draaije de Globe, tot dat *Amſteldam* weder onder den *Breedte-Cirkel* komc, aan de linkerhand van de *Artificieele Zon*, dan zullen alle plaatſen, welken aan die zyde onder den *Breedte-Cirkel* gelegen zyn, te gelyk met *Amſteldam* op den 5 May de *Zon* zien *opgaan*, waaruit dus blykt dat op dien dag de *Zon* op de *Orcadiſche Eil.* — te *Mantua*, — *Romen*, — *op 't Eil. Sicilië*, —— in een *groot gedeelte van Africa*, — en op de *Z. W. Kust van Madagascar* te gelyk met *Amſteldam* opgaat.

XV. PROBLEMA.

Te vinden voor welke plaatſen de Zon Onder-gaat, als op den 5 May te Amſteldam de Zon Opgaat.

302. Tot dit Problema wordt de Globe even-eens geſteld als tot het vorige; alleenlyk moet men nu acht geven welke plaatſen te gelyk de *verlichte* zyde der Aarde verlaaten, als *Amſtel-dam* in dezelve *intreed*, en dus welke plaatſen onder den *Breedte-Cirkel* aan de rechterhand van de *Artificieele Zon* gelegen zyn, wanneer men bevinden zal, dat de *Zon* Ondergaat in een *ge-deelte van Groenland*, — in de *Baffins Baay*, — op de *N. W. Kust van Noord-America*, *op de Breedte van* 55°, —— in den *Stillen Oceaan* — en op de *Societyds Eilanden*, te gelyk als dezelve te *Amſteldam* opgaat.

XVI. PROBLEMA.

Te vinden voor welke plaatſen de Zon Op- en



(die als te vooren geplaatst moet zyn,) aan de linkerhand der *Zon*, gelegen zyn, en *onder* voor alle die plaatſen, welken onder denzelvden Cirkel gelegen zyn, aan de rechterhand der *Artificieele Zon*; wanneer men zien zal dat de Zon *opgaat*: in een *gedeelte van Canada* en *Louiſiana*, — in de *Golf van Mexico*, — in *Tucatan*, — de *Honduras*, — te Kaap *Blanc in Zuid-America*, — in een *gedeelte van Chili*, enz. en, dat de *Zon Ondergaat* in een *gedeelte van Siberiën*, — *Chineez Tartaryen*, — *China*, — *'t Konings Siam*, — *Sumatra*, enz. als het op den 5 May te *Amſteldam Middag* is.

XVII. PROBLEMA.

Te vinden voor welke plaatſen de Zon Op- en Ondergaat op een' gegeven Dag en Tyd buiten den Middag.

By voorbeeld: als het 10 uuren, 30' 's morgens is, op den 24 Aug. te *Amſteldam*.

304. Men plaatſe den *Meridiaan* op *Amſteldam* — de *Artificieele Zon* op den 24 Aug. — de *Breedte-Cirkel* op 8: 0°, zynde 3: van de *Artificieele Zon af*, en draaije vervolgends de Globe tot dat de Uurwyzer 10 uuren 30' voordenmiddag aanwyst, wanneer men op de te voren verklaarde wyze zien zal, dat de Zon *Opgaat* in de *Baay van Hudſon*, —— in *Canada*, —— de *Staaten van Newyork* en *Rhode-Eiland*, — *Antilles*, — in een *gedeelte van Guiana*, —— 't Land *der Amazoonen*

en op de *Kust van Brasil*; en *Ondergaat* te *Oloiskoy*, — op de *Kust van 't Schier-Eiland Corea*, — de *Philippynsche Eilanden*, — *Celebes*, — *Moluqsche Eilanden*, — een *gedeelte van N. Holland*, enz.

305. Men moet hier en by alle de *Problemas*, by welken men van den *Breedte Cirkel* gebruik maakt, om den *Op-* of *Ondergang* der *Zon* te vinden, opmerken, dat de beide punten, welken den *Op-* en *Ondergang* der *Zon* afscheiden, altoos de *Poolen der Ecliptica* zyn, en dat dezen altoos de punten zynde om welken de *Breedte* Cirkel zich beweegt, in de Poolcirkels gevonden worden.

XVIII. PROBLEMA.

Te vinden hoe laat het is te Amsteldam, als den 24 Aug. te Mexico de Zon opgaat.

306. Men stelt de Globe even als in de vorige § gezegd is, en brengt vervolgends *Mexico* onder den *Breedte Cirkel*, aan den linkerhand der *Artificieele Zon*, wanneer de Uurwyzer 12 uuren, 50' 's namiddags zal aanwyzen voor het oogenblik dat de Zon te *Mexico* opgaat.

volgends *Amſteldam* onder denzelven, en brenge (de Globe laatende ſtilſtaan,) den *Meridiaan* aan den Uurwyzer, beginnende dus de Uurtelling met het opgaan der *Zon*; men draait vervolgends de Globe om, tot *Amſteldam* onder den *Breedte Cirkel*, aan de rechterhand der *Zon*, kome, en de Uurwyzer zal de lengte van den dag op den Uurcirkel aanwyzen, doch hierby dient men optemerken, dat zoo de Uurwyzer meer dan 12 uuren aanwyst, men in dit geval by de 12 uuren de overigen moet bytellen; dusdoende bevind men de lengte van den dag te *Amſteldam* den 31 May 16 uuren, 10'; wyl de Uurwyzer 4 uuren, 10', na 12 uuren wyst. — Om de lengte van de Nacht te vinden, gaat men op dezelvde wyze te werk, alleenlyk ſtelle men nu den *Meridiaan* aan de *Artificieele Zon*, als dezelve voor die plaats *ondergaat*, en zie hoeveel tyd die plaats beſteed om het *duistere* gedeelte der *Aarde* te doorloopen; met dit al kan men wanneer men de lengte van den *Dag* kent, de lengte der *Nacht* vinden, door deze gevonden lengte van 24 uuren aftetrekken: dus is de lengte der *Nacht* te *Amſteldam* den 24 Aug. 7 uuren, 50'.

XX. PROBLEMA.

De nieuwe Aard-Globe als een Tellurium te gebruiken om de verwisſeling der Saiſoenen, en het langen en korten der dagen aantewyzen.

308. De voorgaande *Problema's*, in dewelken wy van den *Breedte Cirkel* gebruik gemaakt hebben,

om den *Op-* en *Ondergang* der *Zon* te vinden, geeven ons eene gepaste handleiding om dit *Problema*, dat zeker als een der ſchoonſte mag aangemerkt worden, zeer gemakkelyk en, zoo wy vertrouwen, zeer duidelyk optelosſen. — Wy beginnen hiertoe met den *dag der Lente Nachtevening*, plaatſen de *Artificieele Zon* in de *Lente ſtreede* en den *Breedte Cirkel* op 9 teekens afſtand van dezelve; wanneer men weldra bevind dat nu de groote *Breedte Cirkel*, de koperen ring, in welken de geheele Globe draait, de Cirkel is, welke het verlichte en onverlichte gedeelte van elkanderen ſcheid, omdat de *Breedte Cirkel*, nu op 9^t^ afſtands van de *Zon* geplaatst wordende, juist met de colure der *Zonneſtanden* invalt; en deze beſchouwing zal een' opmerkende direct doen zien, dat de dagen en nachten op dezen dag over de geheele *Aarde* even lang zyn moeten; immers daar nu de *Breedte Cirkel* door de *Poolen der Aarde*, en dus ook door de Poolen van alle de Paralellen der *Aarde* gaat, deelt ook dezelve allen in twee gelyke deelen. — Dan, men plaatſe den Meridiaan eens weder op *Amſteldam*, en brenge eene plaats, welke ook, onder den *Breedte Cirkel*,

uuren *Op-* en ten 6 uuren *Ondergaan*; hier voorbeelden optegeeven reekenen wy overtollig: de zaak is klaar, en voor welke plaats men het ook beproeve, men zal altoos vinden dat de Dag even lang gelyk de Nacht, en gelyk op elke andere plaats der Aarde is.

309. Gaan wy nu voort en zien wy welk verſchil de vordering der *Zon* in Lengte op het langen en korten der dagen heeft; dan, laat ons om onze vergelyking geregeld te kunnen doen, eenige plaatſen op verſchillende Breedten gelegen uitkiezen, om op verſchillende *Lengten* der Zon, de lengte der Dag voor dezelve te zoeken. — Wy kiezen hiertoe uit, de *Noord-Kaap*, het Noordelykſte punt van Europa op 71° 10′ N. B. gelegen. — *Amſteldam* op 52° 21′ N. B. — *Alexandrië* in Egypte op 31° 13′ N. B. — *Batavia* op 6° 12′ Z. B. — en *Kaap-Horn*, de Zuidelykſte punt van Zuid-America op 55° 58′ Z. B. — Men plaatſe nu de *Artificieele Zon* op den 1 April, en zette den *Breedte Cirkel* op 3 Teekens afſtand van de *Zon* als na gewoonte, en zoeke vervolgends volgens het XIX Problema de lengte van den dag voor ieder der opgegeeven plaatſen, wanneer men bevind, dat de lengte van den dag den 1 April aan de *Noord-Kaap* is 14 uuren 4′ — te *Amſteldam*, 13 uuren 0′ — te *Alexandrie* 12 uuren 32′ — te *Batavia* 11 uuren 50′ — en aan *Kaap-Horn* 11 uuren 38′; men ontdekt hier reeds aanſtonds een verſchil by den 21 Maart; gelyk ook de ſtand van den *Breedte Cirkel* reeds aanwyst, dat de *Paralellen* niet meer in gelyke ſtukken door denzelven gedeeld worden.

310.

310. Voorts plaatſe men de *Artificieele Zon* op den 1 May en den *Breedte-Cirkel* op den voor den 1 May geſchikten graad, en zoeke als boven gezegd is, de lengte van den dag voor de meergemelde plaatſen, en men bevind, dat de lengte van den dag den 1 May aan de *Noord-Kaap* is 20 uuren — te *Amſteldam* 14 uuren 50′ — te *Alexandrie* 13 uuren 8′ — te *Batavia* 11 uuren 38′ — en aan *Kaap-Horn* 8 uuren 54′.

311. Op deze wyze voortgaande, vinden wy de lengte van den dag.

te	den 1 Juny		den 21 Juny		den 19 July	
Noord-Kaap	24 uuren	0′	24 uuren	0′	24 uuren	0′
Amſteldam	16	12	16	30	16	6
Alexandrie	13	50	14	0	13	42
Batavia	11	40	11	28	11	38
Kaap-Horn	6	56	6	42	7	20

Wy zien dus uit deze proeven, dat de dagen aan de *Noord-Kaap* — te *Amſteldam* — en te *Alexandrie* van den 21 Maart tot den 21 Juny, al geduurig langer geworden zyn, daarentegen aan *Kaap-Horn* ſteeds korter, terwyl ze te *Batavia* genoegzaam op dezelvde lengte gebleven zyn; ge-

op den 15 Augustus plaatsende, en wy vinden de lengte van den dag voor *Noord-Kaap* 18 uuren — voor *Amsteldam* 14 uuren 24′ — voor *Alexandrie* 13 uuren 2′ — voor *Batavia* 11 uuren 34′ — voor *Kaap-Horn* 9 uuren 10′ — Even zoo vinden wy voor den 10 September de lengte van den dag aldus. — Voor de *Noord-Kaap* 13 uuren 50′ voor *Amsteldam* 12 uuren 50′ — voor *Alexandrie* 12 uuren 12′ — voor *Batavia* 11 uuren 54′ — en voor *Kaap-Horn* 11 uuren 0′. Wy beginnen dus te bemerken dat de dagen doorgaans gelyker van grootte worden, in de *Noordelyke* gewesten meer en meer korten, en in de *Zuidelyke* langer worden; en zoo wy de *Artificieele Zon* op den 21 September plaatsen, vinden wy even als den 21 Maart alle dagen even lang, van 12 uuren.

313. Op dezelvde wyze voortgaande, vinden wy dat de lengte der dagen vervolgends aldus is:

te	30 Oct.	20 Nov.	21 Dec.
Noord-Kaap	5 uuren 42′	1 uuren 20′	0 uuren 0′
Amsteldam	9 24	8 20	7 20
Alexandrie	10 48	10 16	9 52
Batavia	12 8	12 16	12 20
Kaap-Horn	15 0	16 22	17 20

en

te	22 Jan.	11 Febr.	10 Maart
Noord-Kaap	1 uuren 20′	5 uuren 42′	10 uuren 22′
Amsteldam	8 20	9 24	11 20
Alexandrie	10 16	10 48	11 32
Batavia	12 16	12 8	11 58
Kaap-Horn	16 22	15 0	12 50

ter-

XXI. PROBLEMA.

Te vinden den dag, op welken de Zon voor het eerst Op- en voor het laatst Ondergaat voor elke plaats, welker Noorder Breedte grooter dan $66\frac{1}{2}^{\circ}$ is.

315. Het is op $66\frac{1}{2}^{\circ}$ afstands van den *Equator*, dat de beide *Poolcirkels* getrokken zyn; wy zagen in de gevolgen, uit de oplosſing van het voorgaande Problema afgeleid, § 314, dat de Landen, welken tusſchen den Noord-*Poolcirkel* en de *Pool* in gelegen zyn, op en omtrent den 21 Juny geene Nacht hebben; dat dezelven het verlichte gedeelte der Aarde niet verlaaten, en dat de *Zon* voor hen als dan niet *Ondergaat*; men moet hier uit egter niet afleiden, gelyk men ſoms wel eens verkeerdelyk doet, als of deze Landen maar éénen Dag en maar ééne Nacht in 't geheele Jaar hadden, en of dus de *Zon* geduurende een half Jaar van hun niet gezien werd; dit is ondertusſchen zoo niet: dit heeft alleenlyk in den volſtrekſten zin plaats voor de landen, die bepaald onder de *Poolen* geleegen zyn; alle andere landen hebben eene afwisſeling van *Dag* en *Nacht*, hoezeer dan ook de lengte der Dagen zeer onderſcheiden zyn mag: wy willen dit vooraf aantoonen, en eindelyk de bepaalde oplosſing van het gevraagde opgeeven. — 1°. Zullen wy toonen dat bepaald onder de Poolen, dat is op 90° Breedte, 'er maar één Dag en maar ééne Nacht plaats heeft. — 2°. Dat op alle andere Breedten, zoo

verre

verre 'er de bewoonbaarheid onzer Aarde aan ons bekend is, eene afwisseling van Dag en Nacht plaats heeft. — 3°. Hoe lang de eigenlyke gezegde Nacht achtereen op plaatsen, die boven $66\frac{1}{2}^{\circ}$ N. B. gelegen zyn, duurt. — Wy bepaalen ons slechts tot Noorder Breedte, omdat 'er, zoo verre ons bekend is, op zulk eene hooge Zuider Breedte geen landen gevonden worden.

316. *Vooreerst.* 'Er heerscht eene volstrekte Nacht, geduurende 6 Maanden, aan de beide Poolen, dat is: de *Zon* gaat geduurende dien tyd nimmer *Op.* — Om zich hiervan te overtuigen, plaatse men de *Artificieele Zon* in het *Nachteveningspunt van den Herfst*, of in ♎: dan is, gelyk wy zoo even, § 308, zagen, de groote Breedte Cirkel, in welken de Globe draait, de Cirkel die voor dien dag het verlichte van het duistere gedeelte der Aarde affcheid; de beide Poolen staan net in het vlak van dezen Cirkel; de afstand der *Zon* tot de Poolen is dus net 90°, en de Zon word van de bewooners der beide Poolen in den Horison gezien, geduurende den geheelen Dag; de *Zon* klimt of daalt niet voor hen; dan, plaatsen wy de *Zon* op eene grooter lengte, welke

beſtendig Dag, en aan de *Zuidpool* eene gedurige Nacht, zoo gelyk ons dit de plaatſing der *Breedte-Cirkel*, op de verſchillende graaden van Lengte naar de vooren beſchreven wyze geplaatst, zeer duidelyk zal doen zien.

317. *Ten tweeden*, zeiden wy: op alle andere Breedten, zoo verre de bewoonbaarheid van onze Aarde ons bekend is, heeft 'er eene afwisſeling van Dag en Nacht plaats: wy zullen, als het Noordelykſte punt, waartoe men immer gekomen is, nemen de Noordelykſte Kaap van *Spitsbergen*, en ſtellen derzelver Noorder Breedte gemakshalve op 80°. —— Men brenge de *Artificieele Zon* weder op den 1e. graad van *Aries*, en ziet welhaast, dat op dezen Dag de *Zon* te *Spitsbergen* reeds *Opgaat*, dus de Dag aldaar langer als één half Jaar moet duuren, ondertusſchen, dat 'er eene afwisſeling van Dag en Nacht plaats heeft, dat is: dat de *Zon* 'er, gelyk by ons *Op-* en *Ondergaat*, tot dat dezelve zoodanig eene hoogte bereikt heeft, dat ze beſtendig boven den Horiſon blyft; dit zullen wy eerst recht kunnen aantoonen, als wy, gelyk dit *Problema* eigenlyk voorſtelt, den Dag gevonden hebben, dat de Zon aldaar voor het eerst opgaat.

318. Ten einde dezen te vinden, brenge men den *beweeghaaren Meridiaan* op *Spitsbergen*, en ſtelle de *Horiſon* voor de Poolshoogte van 80°; daar nu *Spitsbergen* Noorder Breedte heeft, moet de *Zon* noodwendig in de *klimmende Teekens* zyn, § 97, zal ze aldaar opgaan; men draaije dus de Globe, tot dat de *Ecliptica* der Globe (de Breedte-

losſen van dit Problema te gelyk bedient, dat op hetzelvde oogenblik, dat het *Zuider* punt des *Horiſons* de *Ecliptica* ſnyd, de plaats voor welke de *Horiſon* geſteld is ook voor het eerst den *Breedte-Cirkel*, dat is den rand van het verlichte en onverlichte gedeelte raakt, of voor de laatſte maal denzelven aandoet.

XXII. PROBLEMA.

Den dag te vinden voor welken de Zon voor het eerst niet Ondergaat, benevens den tyd dat dezelve beſtendig boven den Horiſon blyft, voor elke plaats wier N. Breedte grooter is dan 66½ graad.

322. Wy zagen, § 318, dat de *Zon* voor alle plaatſen, die benoorden den Poolcirkel gelegen zyn, geduurende eenigen tyd des Jaars niet ondergaat; wy moeten nu onderzoeken hoe lang deze tyd duurt, wanneer dezelve dus begint, en wanneer eindigt; ten dien einde ſtelle men den *Meridiaan* en *Horiſon* weder voor *Spitsbergen*,

dat het *Noorder* punt des *Horiſons* de *Ecliptica* aan de zyde van de *daalende* Teekens wederom ſnyd, 't welk op den 28 Augustus zyn zal; geduurende dezen tyd nu, dat is van den 16 April tot den 28 Augustus, verlaat de *Zon* den *Horiſon* van *Spitsbergen* niet, gelyk ook *Spitsbergen*, geduurende alle de omwentelingen der Aarde, geduurende dien tyd ook het *verlichte* gedeelte der Aarde niet verlaat, en 'er heerscht dus aldaar een beſtendige Dag geduurende $4\frac{1}{2}$ Maanden. — Op dezelvde wyze vinden wy, dat de *Zon* van den 15 May tot den 29 July aan de *Noord-Kaap* niet ondergaat, en het dus aldaar geduurende $2\frac{1}{2}$ Maand ſteeds Dag is.

XXIII. PROBLEMA.

De Hoogte der Zon boven den Horiſon op en buiten den Middag te vinden.

323. Door de *Hoogte der Zon* verſtaat men de hoegrootheid van den boog eens *Verticaals*, gemeeten van den *Horiſon* tot het *middenpunt der Zon*; wy moeten dus ter oplosſing van dit Problema van den *Verticaal* gebruik maaken, van welken wy tot hiertoe by het gebruik der Globe nog niet geſproken hebben; wy zullen, tot een voorbeeld, onderzoeken naar de hoogte der *Zon* te *Amſteldam* den 28 Augustus, op den *Middag*, en 's morgens ten 9 uuren.

324. Men plaatſe den *beweegbaaren Meridiaan* en *Horiſon* op de *Lengte* en *Breedte* van *Amſteldam*,

dam, de *Artificieele Zon* op den 28 Augustus, en draaije de Globe tot dat de *Zon* aan den *Meridiaan* zy; voorts ſchroeve men den *Verticaal* vast op den *Meridiaan*, dat het punt waar deszelve zich om beweegt net boven *Amſteldam* te ſtaan kome, brenge vervolgends den *Verticaal* aan den *Meridiaan*, en zie welke graad op denzelven door de *Artificieele Zon* wordt aangewezen, welke graad de hoogte der *Zon* op den *Middag* van den 28 Augustus zyn zal; vervolgends draaije men de Globe op 9 uuren voor den *Middag*, en den *Verticaal* onder de *Artificieele Zon*, wanneer deze wederom op den *Verticaal* de hoogte der Zon des morgens ten 9 uuren zal aanwyzen; dusdoende vindt men voor de hoogte der *Zon*, den 28 Augustus, des morgens ten 9 uuren 34° 20', en ten 12 uuren 43° 0'.

XXIV. PROBLEMA.

De Regte en Kunſt der Morgen en Avond-Schemering te vinden.

325. Wanneer de Zon nog niet zeer laag beneden den *Horiſon* gedaald is, verſpreid zy nog eenig licht aan den voor ons zichtbaaren hollen kloot des Hemels; dit licht wordt terug gekaatst op deze Aarde, en veroorzaakt aldaar nog een klaauw licht, 't welk men na Zonne ondergang de *Avond-Schemering*, en vóór derzelver opgang de *Morgen-Schemering* gewoon is te noemen: deze Schemering wordt allengskens minder naar dat de

Zon

Zon lager daalt, en verdwynt eindelyk geheel en al; doorgaands berekent men de ſchemering te eindigen, wanneer de *Zon* 18° onder den *Horiſon* gedaalt is, en dienvolgens kunnen wy het voorgeſtelde Problema in deze vraag veranderen: *Het uur te vinden dat de Zon vóór derzelver Opgang*, of *na haaren Ondergang* 18° *beneden den Horiſon ſtaat?* — Men maakt ten dien einde gebruik van den zo even beſchreven *Verticaal*, plaatst de *Artificieele Zon* op den gegeeven Dag; den *Meridiaan* en *Horiſon* voor de plaats geſteld hebbende, draait men, om het begin der *Morgenſchemering* te vinden, de Globe zoo, dat de *Zon* onder den *Oester* Horiſon te ſtaan kome, ziet welken graad zy op den *Verticaal*, die om deze reden 18° meer als een Quartcirkel moet groot zyn, wyst, en beweegt de Globe zoo lang voor- of achterwaart, tot dat de *Zon* net 18° op den *Verticaal* aanwyst, wanneer het Uur, dat de Uurwyzer teekent, het begin der *Morgenſchemering* aanwyst; terwyl men, hetzelve onder den *Wester* Horiſon herhaalende, het einde der *Avondſchemering* zal vinden; op deze wyze handelende, vind men voor het begin der *Morgenſchemering*, den 28 Augustus, te *Amſteldam*, 2 uuren 50′, 's morgens, en voor het einde der *Avondſchemering* 9 uuren 18′, 's avonds van dienzelvden Dag.

326. Men zou zich egter bedriegen, als men zich verbeeldde dat deze Schemering op alle tyden des Jaars even lang duurde: in onze Noordelyke gewesten duurt dezelve des Zomers veel langer als des Winters; de *Zon* daalt des *Winters*

meer recht beneden den *Horiſon*, daar zy des *Zomers* meer ſchuins onder denzelven langs gaat; men zal zulks zeer duidelyk zien, als men de *Artificieele Zon* eens op den 21 Juny plaatst, dezelve laat ondergaan, en oplet hoe langzaam deze alsdan beneden den *Horiſon* daalt, daar zy integendeel, de *Artificieele Zon* op den 21 December geplaatst zynde, meer recht naar beneden daalt, en den Horiſon ſchielyker verlaat; dus zal men vinden, dat op den 21 Juny deze ſchemering genoegzaam de geheele Nacht duurt, daar zy op den 21 December reeds 2 uuren na Zonne ondergang geëindigd is. —— In zulke plaatſen, die *Benoorden* den N. Poolcirkel gelegen zyn, duurt deze Schemering verſcheiden dagen en op ſommigen derzelven, gelyk aan de *Noord-Kaap*, die wy reeds meermaalen tot een voorbeeld genomen hebben, is zy nimmer geheel geëindigd, wyl de *Zon* zelfs op den 21 December geen 18° onder den *Horiſon* gedaald is.

XXV. PROBLEMA.

Het Azimuth der Zon voor een' gegeeven Dag, Uur en Plaats te vinden.

By voorbeeld: te *Amſteldam* den 6 July, des middags ten 4 uuren, 30 Minuuten.

327. Men brengt den *beweeghaaren Meridiaan* en *Horiſon* op de plaats, de *Artificieele Zon* op den 6 July, en draait de Globe dat de Uurwyzer 4 uuren 30' na den Middag aanwyst; ver-

vol-

volgends ſchroeve men den *Verticaal* in het Top-punt, 't welk by ons altoos de plaats zelve is, vast, brenge den *Verticaal* onder de *Artificieele Zon*; dan zal de *Verticaal* op den *Horiſon* den 86 graad ſnyden, 't welk het *Azimuth der Zon* voor dien tyd zyn zal, terwyl tevens de ſtreek des Winds, (het *Westen*,) waarin de Zon alsdan ſtaat, door den *Verticaal* word aangewezen.

---

328. Deze *Problema*'s achten wy genoegzaam om tot een' grondſlag van het gebruik onzer Nieuwe Aard-Globe in alle andere gevallen te dienen, en zy zullen, wél verſtaan zynde, de volgenden, die wy nu ook op de *Maan* en *Sterren* gaan toepaſſen, met te meer gemak doen oplosſen.

XXVI. PROBLEMA.

De Maans plaats, gelyk ook die der overige Planeeten, ten allen tyde op de Globe aantewyzen.

329. Wy hebben, § 193, aangewezen hoe men ten allen tyde, door middel van de *Tafel der Sterrekundige Epacten*, bladz. 132 van dit werk te vinden, en de beweging der *Maan* in *Lengte* en *Breedte*, op de *Ecliptica* onzer N. Globe aangeteekend, de *Lengte* en *Breedte* der *Maan* kan berekenen; wy gaven daarvan aldaar een voorbeeld voor den 29 May, 1801; wy zullen ons hier van

hetzelvde voorbeeld bedienen; wy vonden aldaar dat de *Lengte* der *Maan* den 29 May, 1801, 's avonds ten 10 uuren 9^{t} 4° 44' was, en derzelver *Breedte* 5° 8' 4'' *Zuidelyk*: men neme nu een zeker Teeken, 't welk wy de *Artificieele Maan* zullen noemen, en plaatse hetzelve op de *Ecliptica* der Globe op 9^{t} 4° 44', wanneer hetzelve de plaats der *Maan* in *Lengte* zal aanwyzen; voorts brenge men den *Breedte-Cirkel* aan dit Teeken, en neme met een' passer op den grooten koperen Cirkel de wydte van 5° 8', plaatse de ééne punt des passers op de van koperdraad gemaakte *Breedte-Cirkels* aan de *Ecliptica*, en de andere punt naar beneden (omdat de Maan *Zuider* breedte heeft,) aan den *Breedte-Cirkel* houdende, schuive men een der beweegbaare Sterretjens op dit door de laatstgemelde punt des passers aangewezen wordende punt, dan zal dit *Sterretje* ons de plaats der *Maan* aan den Hemel voorstellen.

330. Ook zoeke men in eene *Ephemerides*, *Connoissances des Temps*, of eenigen anderen Astronomischen Almanak, de *Geocentrische Lengte* der *Planeeten* voor dien dag, en plaatse op elk' der graaden van de *Ecliptica*, met de Lengte der byzondere Planeeten overeénkomende, een zeker Teeken, 't welk de plaats der *Planeet* zal aanduiden; men kan dit zeer gemakkelyk doen, door middel van een plat rond stukje koper, op hetwelk het karacter der Planeet gesneden is, en 't welk aan de eene zyde van eene scherpe punt voorzien is, om den graad te kunnen aanwyzen; wy verwaarloozen hierby de *Breedte* der Planeeten, omdat die

die zelden heel groot is; doch zoo men zulke verkiest, kan men op de boven, § 329, omſchreven wyze, ook derzelver plaats in *Breedte* mede aanwyzen.

XXVII. PROBLEMA.

Door middel van éene omwenteling der Globe den Op- en Ondergang der Zon, Maan en van alle de Planeeten voor eene gegeeven Plaats en Dag te vinden; of den ſtand der Zon, Maan en van alle de Planeeten voor eenen geheelen Dag, op eene gegeeven plaats, door middel der Globe te kunnen aanwyzen.

By voorbeeld: te *Amſteldam*, den 23 September, 1801.

331. Deze en dergelyke Problemas zullen ons het nut der vereeniging van Hemel- en Aard-Globe eerst recht leeren kennen, terwyl men den ſtand des Hemels, ten opzichte der *Zon*, *Maan* en *Planeeten*, als met een opſlag van het oog door dezelven leert kennen, en de naauwe betrekking, welke *Aardryks-* en *Sterrekunde* op elkander hebben, zal kunnen opmerken. — Men zoeke nu de *Lengte* der *Maan* en der *Planeeten*, zynde de *Lengte* der *Zon* bekend, en door den Almanak op de *Ecliptica* der Globe te vinden; wy maaken dus hier gebruik van de *Connoiſſances des Temps*, en vin-

vinden aldaar voor de *Lengte* en *Breedte* der *Maan* en *Planeeten*, den 23 September, 1801, 's namiddag ten 12 uuren.

	Lengte			Breedte		
Maan	0t 15°	23'	10"	1° 24'	44"	Noord.
Mercurius	6 3	41		1 7		Noord.
Venus	4 19	39		0 1		Noord.
Mars	6 9	37		0 37		Noord.
Jupiter	4 25	13		0 45		Noord.
Saturnus	5 1	38		1 24		Noord.
Herchel	6 2	10		0 41		Noord.

332. Men plaatſe nu op elk' dezer graaden van de *Ecliptica* het Teeken voor ieder *Planeet* geſchikt, brenge den *Meridiaan* en *Horiſon* op de *Lengte* en *Breedte* van Amſteldam, dan zal men, de Globe ronddraaijende, en ieder Planeet ſucceſſivelyk aan den *Ooster* Horiſon brengende, bevinden dat:

de Zon Opgaat	ten 5	uuren 57'	
de Maan . . .	— 6	28	's avonds
Mercurius . . .	— 6	15	's morgens
Venus	— 2	14	dito

[redacted]

de Maan dr. den Merid. gaat ten 1 uuren 21' 's morgens van den 24e.

Mercurius . . .	— 0 u.	16'	's middags
Venus	— 9	29	's morgens
Mars	— 0	96	's middags
Jupiter	— 9	49	's morgens
Saturnus	— 10	13	dito
Herchel	— 0	10	's middags

en dezelve aan den *Wester* Horiſon brengende, vinden wy voor den *Ondergang*

der Zon . .	6 uuren	2'	
der Maan . .	7 uuren	11'	's morgens van den 24e.
van Mercurius .	6	17	's avonds
van Venus . .	4	44	dito
van Mars . .	6	24	dito
van Jupiter . .	4	58	dito
van Saturnus . .	5	14	dito
van Herchel . .	5	12	dito

333. Wy zien verder, dat, wanneer wy de Globe terug draaijen op 4 uuren des Morgens, dat de Planeten *Venus* — *Jupiter* — en *Saturnus* alle drie tegelyk boven den *Horiſon*, en dus voor ons oog zigtbaar zyn, ſtaande *Venus* in 't Oosten, en *Jupitur* en *Saturnus* in 't Oost ten Noorden; en wanneer wy, by den ſtand dezer drie Planeten, tevens acht geven, op den ſtand der *Aarde*, dan vinden wy dat *Venus* op dat tydſtip in 't *Zenith* ſtaat van een punt der Globe, gelegen in de *Golf van Bengalen*, op de *Lengte* van 92° Oostwaart van Amſteldam, en op de *Breedte* van

van 14° N. B. *Jupiter* in 't *Zenith* van 't *Eiland Man*, mede in de *Golf van Bengalen* gelegen, en *Saturnus* recht boven *de* landengte, welke het *Koningryk Siam* met het Schier-eiland *Malakka* verbind; want deze drie Planeten ſtaan net boven deze opgegeeven plaatſen der *Aard-Globe*, en dus in derzelver *Zenith*, wy leeren dus hieruit dat wy, naar de Planeeten *Venus* en *Jupiter* op dit tydſtip ziende, zeggen kunnen recht onder deze Planeeten ligt de *Golf van Bengalen*, en dezelve is dus in dezelvde richting van ons gelegen als deze Planeeten thans ſtaan; ſchroeven wy den *Verticaal* aan den *Meridiaan* vast, dan zien wy dat wy *Venus* in 't Oosten moeten zoeken, en wy beſluiten dus daaruit dat de *Golf van Bengalen* Oostwaart van ons gelegen is.

334. De Planeeten *Mercurius*, *Mars* en *Herchel* zyn ten dezen tyde voor ons niet zigtbaar, omdat zy te digt by de *Zon* ſtaan, na derzelver *Opgang* eerst *Opgaan*, en vóór Zonne *Ondergang* reeds *onder* zyn.

XXVIII. PROBLEMA.

Zon aan den *Oosten* Horison, en ziet dus dat de *Zon*, *opgaande*, in 't *Zenith* staat van een gedeelte van de *Indische Zee*; vervolgends de Globe ronddraaijende, zien wy de *Zon* gaan over de *Indische Zee* naar de Kust van *Africa*, ontmoetende dezelve by *Melinde*, voorts dwars door *Ethiopie* naar de Westkust van *Africa*, gaande vervolgends over den *grootten Oceaan* naar *Zuid-America*, en hetzelve dwars overstekende tot dat zy by haaren *Ondergang* boven de *Wester Oceaan*, even bewesten Kaap *St. Helena*, te staan komt; derhalve, willen wy weten boven welke plaats de *Zon* des morgens ten 9 uuren 45′ van den 23 September staat, hebben wy de Globe nu maar op 9 uuren 45′ des morgens te zetten, en wy zien dat de *Zon* in 't *Zenith* staat van *Melinde* op de Oostkust van *Afrika*; derhalve des morgens *quartier* voor 10 uuren, van den 23 September, naar de *Zon* ziende, kan men zeggen, in dezelvde richting als de *Zon* nu van ons staat, is *Melinde* gelegen.

336. Hetzelvde zou men ook met de *Maan* kunnen doen, dan de snelle beweging der *Maan* zou hieromtrent eenige hindernis te weeg kunnen brengen, wyl de stand der *Maan* geduurende één omwenteling der Aarde niet dezelvde blyft; dus zou men verpligt zyn de juiste plaats der *Maan* voor een bepaald Uur te berekenen, en dit zelvde willen wy ook dat men, het Uur van den *Op-* of *Ondergang* der *Maan* zoekende, in het oog houde; want men verkrygt door de Handelwyze die wy, § 193, hebben opgegeeven, en door geene handelwyze welke ook, de *Lengte* der *Maan*

op

op 't oogenblik dat zy Op- of Ondergaat; men moet dus, de *Lengte* der *Maan* gevonden hebbende, en den tyd van derzelver Opgang naauwkeurig willende weten, *eerst* den tyd zoeken op welken de *Maan Opgaat*, volgens de gevonden *Lengte*, dan voor dat oogenblik de *Lengte* der Maan berekenen, en voor die gevonden *Lengte* het Uur van den Op- of Ondergang zoeken, gelyk het volgende voorbeeld ons nader leeren zal.

XXIX. PROBLEMA.

Den juisten tyd van den Op- en Ondergang der der Maan te vinden, op den 31 *Augustus*, 1801, *te Amsteldam.*

337. *Vooreerst* zoeke, men door middel der *Sterrekundige Epacten*, Tab. VII. bladz. 132 den dag van de middelbaare Conjunctie der *Maan* in de Maand *Augustus*, 1801., aldus:

Sterrek. Epacta 1801.	15 dagen	4 uuren	56′	10″
voor Augustus	5	6	51	41

[redacted]

halve zoeke men, op de Ecliptica der Globe, de beweging der *Maan in Lengte* voor 22 dagen, waarvoor men vindt . . 10t 19° 50'
hier bygeteld de Lengte der *Zon*, den 9 Aug. § 187. . . 4 18 35

3t 8° 25'

bekomt men 3t 8° 25' voor de Lengte der *Maan* den 31 Augustus, *'s Middags*, ten 0 uuren 56' 12"

Ten tweeden zoeke men het *Supplement van den Knoop* der *Maan* voor den 31 Augustus, 1801, in de VIIIe Tafel aldus:

Suppl. van den Koop der ☾ 1801.	11t	16°	3'	45"
voor Aug. . . .	0	11	16	46
30 dagen . .	0	1	35	19
1 dito . .	0	0	3	10
	11t	28°	59'	0"
by de Lengte der ☾ . .	3	8	25	0
rest de Afstand der ☾ van den Knoop	3t	7°	24'	0"

door middel nu van dezen Afstand der *Maan* van den Knoop, zoekt men op de *Ecliptica* der Globe de *Breedte* der *Maan*, voor welke men vindt 5° 6' 30" Noorder Breedte, voor den 31 Aug. 's Middags.

338. De *Lengte* en *Breedte* der *Maan* nu gevonden hebbende, stelt men de *Artificieele Maan* op dezelve, volgens § 329, plaatst den *Meridiaan* en *Horison* op *Amsterdam*, de *Artificieele Zon* op den dag der Maand, en zoekt op de reeds aangetoonde wyze den tyd van den *Op- en Ondergang* der *Maan*, wanneer men vindt voor den middelbaaren *Opgang* 10 uuren 40' 's avonds,

[redacted]

bekomt, men 3ᵗ 23° 55′ voor de *Lengte der Maan*, den 1 September, 's middags ten 5 uuren 10′, waardoor men voor den *Ondergang der Maan* bekomt 5 uuren 55′, 's middags; wy onderſtellen de *Breedte* der Maan in dit tydverloop dezelvde te blyven; deze ondergaat zeker ook eene kleine verandering, doch is niet van dat belang dat wy daarop behoeven acht te geven. — Om den tyd van den doorgang der *Maan* door den *Meridiaan* te vinden, moet men op dezelvde wyze te werk gaan.

XXX. PROBLEMA.

De Plaats eener vaste Ster op de Globe aan te wyzen.

339. Wy kunnen, volgends, § 335, door middel van den ſtand der *Zon* en der *Planeeten*, kennis bekomen van de ligging der Plaatſen op onze *Aarde*, dan daar men de *Zon* en *Planeeten* aan geene andere ſtreek des Hemels dan *in* of *nâby* de *Ecliptica* ziet, zoo zouden dezen, bediende men zich ſlechts enkel van dezelven, ons alleen den betrekkelyken ſtand der Landen, welken tuſſchen de beide keerkringen gelegen zyn, doen kennen; wy behooren van de ligging van *alle* plaatſen der *Aarde*, door de Sterrekunde, een denkbeeld te kunnen ontvangen, en het zyn de *vaste Sterren*, welken wy aan alle oorden des Hemels ontmoeten, die ons hier in behulpzaam kunnen zyn: het is derhalve noodzaakelyk, dat

XXXI. PROBLEMA.

Den Op- en Ondergang eener vaste Ster op de Globe te vinden.

342. Wy onderſtellen dat 'er gevraagd worde hoe laat *Arcturus* op den 31 Augustus te *Amſteldam* opgaat? — Men ſtelle den *Meridiaan* en *Horiſon* voor *Amſteldam*, de *Artificieele Zon* op den 31 Augustus, en een der Sterretjes op de *Ascenſio recta* en *Declinatie* van *Arcturus*, draaije vervolgends de Globe zoo, dat *Arcturus* (want zoo mag men dit Sterretje nu noemen,) aan den *Ooster* Horiſon kome, en zie hoe laat de Uurwyzer aanwyze, het geen 7 uuren 15' 's morgens, voor den *Opgang* van *Arcturus*, zyn zal; vervolgends draaije men de Globe dat *Arcturus* aan den *Wester* Horiſon kome, wanneer men zien zal dat deze Ster des avonds ten 11 uuren 25' *Ondergaat:* deze Ster komt dus na Zonne Opgang boven onzen Horiſon, en is dus des morgens niet zigtbaar, maar blyft daarentegen des avonds na Zonne Ondergang lang genoeg boven den Horiſon, om te kunnen worden waargenomen.

XXXII. PROBLEMA.

Te vinden alle Sterren, die op eene gegeeven Plaats niet ondergaan.

343. Men plaatst de *Horiſon* op de *Breedte* der plaats, draait de Globe tot het *Noordpunt* des *Horiſons* den *beweeghaaren Declinatie-Cirkel*, waar ook geplaatst, ſnyde, en zie welke graad derzelve door dit punt des *Horiſons* geſneeden wordt: alle Sterren, die deze of nog grooter *Declinatie* hebben, gaan op die plaats *nimmer* onder. — Dusdoende vindt men dat alle Sterren, die eene grooter *Noorder-Declinatie* hebben dan 37° 30′, te *Amſteldam nooit* ondergaan; en nu in de *Catalogus van Sterren* zoekende welke dezelven zyn, vindt men dat onder andere de volgende voorname Sterren te *Amſteldam* nooit *Ondergaan*, als: α van Caſſiopea — γ van Perſeus — ε van Perſeus — α Capella — β van den Koetſier — α van den grooten Beer, en meest alle de tot dit geſternte behoorende Sterren — λ van den Draak — het geſternte van den kl. Beer — β van den Osſendryver — ε van den Draak — α van de Lier — β van Caſſiopea, enz.

344. Wy leiden uit het boven gezegde dit gevolg af: dat alle Sterren, wier *Declinatie gelyk* of *grooter* is dan het *Compliment van Breedte* eener Plaats, op die Plaats *nooit Ondergaan*, wel verſtaan zynde, dat de *Declinatie* gelykraamig met de *Breedte* moet zyn, beiden *Noordelyk* of beiden *Zuidelyk*.

XXXIII. PRO-

XXXIII. PROBLEMA.

Te vinden alle die Sterren, welken op eene zekere Plaats nooit opgaan, of altoos onzigtbaar zyn.

345. Men plaatst, even als by het voorgaande *Problema*, den *Horiſon* op de *Breedte* der Plaats, brengt het *Zuider* punt des *Horiſons* aan den *Declinatie-Cirkel*, en zie welke graad van dezelven den *Horiſon* aldaar ſnyd, en deze zal de *Declinatie* zyn van die Sterren, welken, wanneer zy aan dezelven gelyk of grooter is, nooit *Opgaan:* dus *gaan* alle Sterren, die 37° 10′ of meerder *Zuider-Declinatie* hebben, te *Amſteldam* nooit *Op*.

346. Derhalve gaan alle die Sterren nooit op, welker *Declinatie gelyk* of *grooter* is dan het *Compliment van Breedte* eener Plaats, ongelyknamig zynde met de Breedte, dat is *Zuidelyk* als de Breedte *Noordelyk* is, en *Noordelyk* als de Breedte *Zuidelyk* is.

XXXIV. PROBLEMA.

Den Tyd van 't Jaar te vinden, op welken eene Ster Cosmice of Acronice Op- of Ondergaat.

347. Wy hebben, § 167, verklaart wat men door den *Cosmiſchen* en *Acroniſchen* Op- en Ondergang der Sterren te verſtaan hebbe, en dus, deze verklaaring volgende, heeft men 1°. om den *Cosmi-*

ſchen Opgang eener Ster te vinden, die Ster (wy onderſtellen hier dat het beweegbaare Sterretje en *Horiſon* en *Meridiaan* op hunne behoorlyke plaats geſteld zyn,) aan den *Ooster* Horiſon te brengen, en de *Artificieele Zon* te plaatſen op dien graad der *Ecliptica*, welke op hetzelvde oogenblik den *Ooster* Horiſon ſnyd, wanneer de daarmede overeenkomende Dag in den Almanak de gezochte Dag zyn zal. — 2°. Om den *Cosmiſchen Ondergang* eener Ster te vinden, brengt men de Ster aan den *Wester* Horiſon, plaatst de *Artificieele Zon* op den graad van de *Ecliptica*, die te gelyk den *Ooster* Horiſon ſnyd, wanneer de daarmede overeenkomende Dag, wederom de begeerde zyn zal.

348. 3° Om den *Acroniſchen Opgang* eener Ster te vinden, brengt men die Ster weder aan den *Ooster* Horiſon, en plaatst de *Artificieele Zon* op den graad der Ecliptica, die te gelyk den *Wester* Horiſon ſnyd, om den gezochten Dag te vinden. — 4°. Brengt men de Ster aan den *Wester* Horiſon, en de *Artificieele Zon* mede op dien graad der *Ecliptica*, die tegelyk den *Wester* Horiſon ſnyd, om den Dag van den *Acroniſchen Ondergang* eener Ster, te vinden.

349. Dusdoende vinden wy dat: te *Amſteldam*, *Arcturus*,

Cosmice Opgaat den	5 September.
Cosmice Ondergaat . . .	25 Juny.
Acronice Opgaat . . .	23 Maart.
Acronice Ondergaat	25 September.

en,

en, dat *Sirius*

Cosmice Opgaat den . . . . 11 Augustus.
Cosmice Ondergaat den . . . 15 November.
Acronice Opgaat den . . . . 6 February.
Acronice Ondergaat den . . . 15 May.

XXXV. PROBLEMA.

Den Tyd van den Heliaſchen Op- en Ondergang eener Ster te vinden.

350. Over den *Heliaſche* Op- en Ondergang der Sterren hebben wy, § 166, reeds geſproken: men herleeze het aldaar gezegde, en zal daaruit kunnen opmaaken, dat het nodig zy den afſtand tuſſchen de *Zon* en eene zekere Ster te bepaalen, op welke men onderſtelt dat dezelve zich in de ſtraalen der *Zon* verliest; deze afſtand nu hangt af van de grootte der Sterren: Sterren van de 1e grootte worden op eenen kleinderen afſtand by de *Zon* gezien dan die van de 2e grootte; dezen weder op eenen kleinderen dan die van de 3e grootte, enz. — Om deze reden is men gewoon aan te neemen dat men Sterren van de 1e grootte nog zien kan in de Morgenſchemering, zolang de *Zon* nog 12 graaden onder den *Horiſon* is. — Dat men die van de 2e grootte ziet, wanneer de *Zon* 13 graaden onder den *Horiſon* is. — Dat men die van de 3e grootte ziet, wanneer de *Zon* 14 graaden onder den *Horiſon* is; aldus voortgaande zou de *Zon* 18 graaden onder den *Hori-*

ſon moeten zyn, om de Sterren van de 7e grootte te kunnen zien.

351. Op dezen grond nu voortgaande, kunnen wy den *Heliaſchen* Op en Ondergang der Sterren aldus vinden. — Geſteld dat men den *Heliaſchen* Op- en Ondergang van *Sirius* te *Amſteldam* zoekt: dan zette men een der *beweegbaaren Sterretjes* op de *Aſcenſio recta* en *Declinatie* van *Sirius*, en den beweegbaaren *Meridiaan* en *Horiſon* op de Lengte en Breedte van *Amſteldam*; men brenge vervolgends *Sirius* aan den *Ooster* Horiſon, ſchroeve den *Verticaal* in 't *Zenith* vast, brenge denzelven aan den *Ooster* Horiſon, en beweege denzelven zoo dat de 12e graad des *Verticaals*, onder de 0, de *Ecliptica* ſnyde, plaatſe vervolgends de *Artificieele Zon* in het punt, waar de *Ecliptica* den *Verticaal* op den 12e graad *onder* den Horiſon ſnyd, en zie welken Dag dezen in den Almanak aanwyst, voor welken men den 26 Augustus vinden zal, welke de Dag van den *Heliaſchen Opgang* van *Sirius* voor *Amſteldam* zyn zal.

352. Op dezelvde wyze de Ster aan den *Wester* Horiſon brengende, en ziende welken graad der *Ecliptica* de 12e graad des *Verticaals* onder den Horiſon ſnyd, vindt men voor den *Heliaſchen Ondergang* van *Sirius* te *Amſteldam* den 26 April.

XXXVI. PROBLEMA.

De Plaats te vinden, welke eene Ster in 't Zenith heeft, op een' gegeeven Dag en Uur.

By voorbeeld: Boven welke plaats ſtaat *Arcturus*, als het op den 31 Augustus te *Amſteldam* 8 uuren 31 's avonds is?

353. Alles wederom ſtellende zoo als by het XXXI Problema is opgegeeven, draait men de Globe op het gegeeven Uur, en ziet welke plaats der Aard-Globe recht onder de Ster ſtaat, en dezelve aldus in haar Zenith heeft: dusdoende, vindt men, dat ten 8 uuren 31' van den 31 Augustus *Arcturus* boven het Zuidelykſte punt van het Eiland *St. Domingo* ſtaat, en eenige minuten laater over *Jamaica* heen gaat. —— Eene Ster, welke door het *Zenith* van eene zekere plaats gaat, noemt men de *Correspondent* van zoodanig eene plaats.

XXXVII. PROBLEMA.

Den Correspondent van eene zekere plaats te vinden.

354. Ten einde eene Ster *Correspondent* zyn kan van eene zekere plaats, moet de *Declinatie* dier Ster gelyk zyn aan de *Breedte* der Plaats; dit volgt uit het geen wy, § 120, reeds gezegd heb-

hebben, dat hetzelvde dat men *Declinatie* noemt ten opzigte der *Sterren*, *Breedte* is, ten opzigte der Plaatſen op onze *Aarde*; en hieruit volgt dus wederkeerig, dat, om den *Correspondent* van eene zekere plaats te vinden, men eene Ster zoeken moet, welker *Declinatie* gelyk is aan de *Breedte* der Plaats.

355. Men zoekt dus eerst volgens, het IX *Problema*, de *Breedte* der Plaats, en ziet vervolgends op de Hemel-Globe, of in de *Catalogus van Sterren*, welke wy achter deze Handleiding zullen laaten volgen, of men eene Ster vinde welker *Declinatie* gelyk is aan deze gevonden *Breedte*; dus vindt men de *Breedte* van *Amſteldam* te zyn 52° 21' *Noord*, en de *Declinatie* van de Ster, geteekend β in den *Draak*, 52° 27' *Noord*, zynde dit de eenige Ster van eenig aanzien, welke men als *Correspondent* van *Amſteldam* gebruiken kan. — Zie hier eene Lyst van de *Correspondenten* der voornaamſte ſteden van *Europa*, welken allen wel niet juist door het *Zenith* van deze plaatſen gaan, doch welken egter die Sterren zyn van eene aanzienlyke grootten welken zoo naby het *Zenith* door den *Meridiaan* gaan, dat men ze als *Correspondenten* mag aanmerken, en welken ons dus kunnen dienen om de ligging dier plaatſen ten onzen opzigte te leeren kennen; de meesten van deze Sterren zyn van de 1, 2 en 3 grootte; *twee* van dezelven, te weeten: de *Correspondent* van *Florence* en *Napels* zyn van de 4 grootte; wy hebben de *Declinatie* der Sterren en de *Breedte* der plaatſen er bygevoegd, om daardoor te kunnen zien

zien hoe groot haar afſtand is van het Zenith, als zy door den Meridiaan der plaats gaan, van welke zy *Correſpondent* zyn.

Naamen der Steeden.	*Breedte.*		*Correſpondent.*	*Declinatie.*	
Berlyn . . .	52°	31′	θ gr. Beer .	52°	34′
Bude	47°	29′	δ van Perſeus	47°	8′
Cadix . . .	36	32	δ van Lyra	36	39
Coppenhagen .	55	41	α Caſſiopea	55°	26
			ζ groote Beer	55	58
Conſtantinopolen	41	1	γ Andromeda	41	21
Florence . .	43	46	ε Koetſier .	43	30
Liſſabon . .	38	42	α Lyra . .	38	36
Londen . .	51	30	γ Draak .	51	31
Madrid . .	40	25	β Perſeus .	40	10
Moscow . .	55	45	α Caſſiopea	55	26
Milaan . . .	45	28	α Capella .	45	46
Napels . . .	40	50	ζ Koetſier .	40	46
Praag . . .	50	5	μ groote Beer	50	19
Parys . . .	48	50	ι groote Beer	48	49
Petersburg . .	59	56	ι Draak .	59	40
Presburg . .	48	8	κ groote Beer	47	56
Rome . . .	41	53	γ Andromeda	41	21
Stokholm . .	59	20	δ Caſſiopea	59	11
Turyn . . .	45	4	β Koetſier .	44	54
Weenen . .	48	12	θ Perſeus .	48	21

356. Wy moeten hier nog by doen opmerken, dat, daar de *Correſpondenten* dienen, om ons de ligging der plaatſen, van welken zy *Correſpondent* zyn, te leeren kennen, wy ons hieromtrent be-

paa-

Sterrenbeelden, die tusſchen hetzelve en het *Westen* in gelegen zyn, te bezien: in 't *Zuid Westen*, tusſchen de 10 en 30 graaden hoogte, zien wy de *Weegſchaal*, gedeeltelyk over de Kust van *Breſil*, en gedeeltelyk over de Zee ſtaan; hooger in het *Zuid Westen* ſtaat *Arcturus*, midden boven den grooten Oceaan. — Onder deze de *Maagd*, zich van 't *Westen* tot door het *Zuid Westen* heen uitſtrekkende, over de *Golf van Mexico*, de *Landengte van Panama*, *Terre Ferme* en *Guiana* gaande — keeren wy ons vlak ten *Noorden*, dan ontmoeten wy, van 't *Zenith* af ziende, eerst den *Draak*, al kronkelende over de *Oostzee*, *Zweeden*, *Noorwegen*, en de *Britſche Eilanden* gaande, en met zyn' Staart zich over *Groenland* en de *Hudſons Baai* uitſtrekkende — verder den *kleinen Beer*, *Groenland* bedekkende — voords laag in 't *Noorden* *Capella*, boven de *Aleutiſche Eilanden* ſtaande — in 't N. N. Oosten ſtaat *Cepheus*, boven *Nova Zembla*, en *Aſiatisch Rusland* — *Caſſiopea* boven *Kamſchatka* — en *Perſeus* boven de *Zee*, die *Kamſchatka* van *Japan* ſcheidt — terwyl wy, in 't *Noord Oosten*, *Andromeda* boven *China* zien ſtaan — in 't *Noord Westen*, zien wy den *grooten Beer* bykans geheel *Noord-America* bedekken — en eindelyk, laag in 't *West-Noord-Westen*, den *Leeuw* boven *Mexico* ſtaan.

XXXVIII. PRO-

XXXVIII. PROBLEMA.

Te vinden hoe laat het is te Amſteldam, als eene der boven opgenoemde Sterren in het Zenith is der Plaats, van welke zy Correspondent is.

By voorbeeld: Hoe laat is de Ster, geteekend α van *Caſſiopea*, in het Zenith van *Moscow*, op den 10 September.

358. Men plaatst den *Meridiaan* en *Horiſon* voor *Amſteldam*, de *Artificeele Zon* op den 10 September, den *Declinatie-Cirkel* op de 7° 18′, de *Ascenſio recta* van de Ster α in *Caſſiopea*, en het *Sterretje* op 55° 26′ *Noorder Declinatie*, draait vervolgends de Globe, tot dat *Moscow* onder de Ster te ſtaan komt, wanneer de Uurwyzer 11 uuren 5′ voor het Uur, dat het te *Amſteldam* is, als α van *Caſſiopea*, op den 10 September, in den *Meridiaan* van *Moscow*, en ook nagenoeg in derzelver *Zenith* is, zal aanwyzen.

XXXIX. PROBLEMA.

Welke Ster ſtaat 'er boven de Straat van Gibraltar, als het 5 uuren 35′ 's avonds, op den 15 November, te Amſteldam is?

359. De Globe wederom voor *Amſteldam* geſteld zynde, en de *Artificieele Zon* op den gegeeven Dag geſteld hebbende, draait men de Globe tot dat de Uurwyzer 5 uuren 35′ 's avonds aanwyst,

brengt voorts den *Declinatie-Cirkel* over de ſtraat van *Gibraltar*, en ziet welken graad van *Ascenſio recta* dezelve op den *Hemel-Equator* aanwyst: dit zal de *Ascenſio recta* der Ster moeten zyn, die op dit tydſtip boven *Gibraltar* ſtaat; terwyl de *Breedte* van *Gibraltar* (de graad des *Declinatie-Cirkels*, onder welken *Gibraltar* op de Globe gevonden wordt,) de *Declinatie der Ster* zyn zal; dus zal eene Ster, welke den 15 November, des avonds ten 5 uuren 35′ boven de ſtraat van *Gibraltar* ſtraat, moeten hebben eene *Ascenſio recta* van 303° 45′, en eene *Noorder Declinatie* van 36° 6′; nu zoeke men in de *Catalogus van Sterren*, of 'er eenige Ster zy, welke hier aan beantwoord; de naatſte Ster, welke men hier voor vindt, is γ van de *Zwaan*: deze heeft eene *Ascenſio recta* van 303° 45′; doch eene *Declinatie* van 39° 37′, dus ruim 3° te veel; dan dewyl men geene Ster vindt, welke nader by komt, moet men zich met deze vergenoegen.

XL. PROBLEMA.

Het punt des Hemels te vinden, onder hetwelk eene zekere plaats op een' gegeeven Dag en Tyd gelegen zy, dat is dat punt des Hemels, 't welk op den bepaalden tyd met het Zenith van de gegeeven plaats overëénkomt.

360. Daar men uit het even voorgaande *Problema* gezien heeft, dat het niet altoos gebeurd, dat

dat men eene kennelyke Ster kan vinden, welke op een' gegeeven tyd in 't *Zenith* van eene zekere plaats ſtaat, behoort men dit *Problema* te kunnen oplosſen, om, alſchoon men geene Ster aldaar vindt, egter het juiste punt, onder hetwelk de gezochte plaats gelegen is, te kunnen vinden; wy zullen van hetzelvde voorbeeld gebruikt maken, en het punt des Hemels zoeken, 't welk op den 15 November, des avonds ten 5 uuren 35′ in 't Zenith van *Gibraltar* ſtaat: om dit te doen, behooren wy de twee volgende *Problema's* te kunnen oplosſen.

XLI. PROBLEMA.

Eene Ster te vinden, welke op een' gegeeven tyd in denzelvden Verticaalen Boog met eene zekere Plaats van ons gelegen is.

361. Men richte de Globe in alles zoo, als wy, § 359, gezegd hebben, ſchroeve den *Verticaal* in 't *Zenith* des *Horiſons* vast, en brenge denzelven op *Gibraltar*; alles nu ſtil laatende ſtaan, brenge men den *Declinatie-Cirkel* over den *Verticaal*, zoo dat hy den 10e graad van hoogte by voorbeeld ſnyd, en zie nu welken graad van *Aſcenſio recta* hy op den *Equator* aanwyst, en welke graad des *Declinatie-Cirkels*, door den *Verticaal* geſneden wordt, het geen op den *Equator* is 283° 10′, en op den *Declinatie-Cirkel* 22° Zuider-Declinatie; zoekende nu in de *Catalogus van Sterren* of 'er

eene Ster aan deze *Ascenſio recta* en Declinatie beandwoord, vindt men dat de *Ascenſio recta* en *Declinatie* van de Ster o, van den *Boogſchutter*, juist dezelvde zy; deze Ster ondertusſchen is van de 4e. grootte, en dus niet zeer kennelyk; ook had het kunnen zyn, dat men geene Ster op die hoogte gevonden had: in dit geval zet men den *Declinatie-Cirkel* op eenen anderen graad van den *Verticaal*, en doet hetzelvde onderzoek; dan, wellicht zou men veele vruchtelooze pogingen kunnen doen, eer men de bedoelde Ster vondt, en wy willen daarom eene kunstgreep aan de hand geeven, om ten naaste by te vinden, waar de bedoelde Ster te zoeken.

362. Wy hebben, den *Declinatie-Cirkel* den *Verticaal* op den 10e graad laatende ſnyden, gevonden dat de graad, waar de *Declinatie-Cirkel* den *Equator* ſnyd, was 283° 10′, en dat de *Verticaal* den *Declinatie-Cirkel* ſnyd op 22°; dan, laat ons nu eene veel grooter hoogte neemen, b. v. van 50°: wy ſtellen dus den *Declinatie-Cirkel* over den Verticaal zoo, dat hy de 50° ſnyd, en zien nu welken graad des *Equators* de *Declinatie-Cirkel* ſnyd, en welke graad des *Declinatie-Cirkels* door



hebben *Ascenſio recta* 296° 30′ en 16° *Noorder Declin.* dus moeten wy, om van de 10° tot 50° hoogte eene Ster te zoeken, welke in den meergemelden *Verticaal* ſtaat, 'er eene vinden, welke tuſſchen de 283° en 296° *Ascenſio recta*, en daarby tuſſchen de 22°, *Zuider-Declinatie*, en de 16° *Noorder-Declinatie* heeft; zoeken wy nu in de *Catalogus van Sterren*, dan vinden wy de volgende Sterren, welken in of ten naaste by in dezen *Verticaal* kunnen ſtaan

λ in Antinous	Asc.Rec.	283°	54′	5°	10′	Z. Decl.
∂ in den Arend	. .	288	51	2	43	N. dito
μ dito	. .	291	4	6	58	dito
γ dito	. .	294	11	10	8	dito
α dito	. .	295	15	8	21	dito

363. Wy hebben dus maar *vyf* Sterren, welken in 't geval kunnen zyn; de 1e, 2e en 4e zyn van de *derde* grootte, de 3e van de *vierde* grootte, en de 5e van de 2e grootte; plaatſen wy nu den *Declinatie-Cirkel* op 283° 54′, dan zien wy dat de 5° 10′ *Zuider-Declinatie* te veel *Weſtelyk* valt, om den *Verticaal* te ſnyden; op dezelvde wyze vinden wy dat de 2e, 3e en 4e der boven opgenoemde Sterren allen te veel *Weſtelyk* vallen; doch nu den *Declinatie-Cirkel* op 295° 15′ brengende, zien wy de 8° 21′ *Noorder-Declinatie* zeer na onder den begeerden *Verticaal* te zyn, en wy neemen dus α in den *Arend*, anders ook *Athaïr* genoemd, voor de kenmerkende Ster des *Verticaals* van *Gibraltar*.

XLII. PROBLEMA.

De Hoogte te vinden, boven den Horiſon, van een zeker punt des Hemels, dat met eene zekere plaats overéénkomt.

364. Wy vervolgen hetzelvde voorbeeld, laaten de Globe even zoo ſtaan, en obſerveeren alleen, welke graad des *Verticaals* met *Gibraltar* overeenkomt, hetwelk is 71° 50′, en zyn nu in ſtaat het XL *Problema* optelosſen: men richte het Quadrant, § 212. omſchreven, op den 15 November, des avonds ten 5 uuren 35′ naar de Ster *Athair*, verheffe hetzelve vervolgends in denzelvden *Verticaalen* boog, dat de loodlyn 71° 51′ aanwyst, en men heeft, door deszelvs *Viſieren* ziende, het punt des Hemels gevonden, 't welk met *Gibraltar* overéénkomt, of, met andere woorden, dat punt, dat juist in 't *Zenith* van *Gibraltar* op dit tydſtip is.

365. Het *Compliment der Hoogte*, dat is de afſtand van het *Zenith*, van dit punt des Hemels, of van eenige Ster, in 't *Zenith* van eene zekere plaats ſtaande, is altoos gelyk aan den afſtand van die plaats, van ons in graaden uitgedrukt, welken men door 15 multipliceerende tot Duitſche mylen maaken kan; des men op deze wyze den afſtand van elke plaats van ons, gelyk ook de afſtanden der onderſcheiden plaatſen van elkander, berekenen kan; gebruikt men hier de *nieuwe Franſche Maaten*, dan behoeft men geene reductie hoegenaamd; men behoeft dan ſlechts een' Verticaal te hebben, welke in

100 deelen verdeeld is: elk van deze deelen bevat 10 *Myriametres* of 100000 *Mètres*, en twee plaatſen, welken dus op 15 graaden afſtands (van 100 namelyk in één' Quartcirkel,) van elkander gelegen zyn, liggen op 150 *Myriametres* afſtand, of 1,500,000 *Mètres*.

XLIII. PROBLEMA.

Alle de plaatſen te vinden, welken op verſchillende tyden dezelvde Ster in haar Zenith hebben.

of

Alle de plaatſen te vinden, welken op eene zelfde Breedte als eene opgegeeven plaats liggen.

By voorbeeld: Alle de plaatſen te vinden, van welke *het Geitenbokske*, *Capella* genaamd, Correspondent is; dat is, met andere woorden, alle die plaatſen te vinden, welken dezelvde Breedte met *Milaan* hebben, § 355.

366. Wy veréénigen met opzet deze beide *Problema's*, omdat zy volmaakt dezelvde oplosſing hebben; men ſtelle dan het *beweegbaare Sterretje* op 75° 29′ *Aſcenſio recta*, en 45° 46′ *Noorder Declinatie*, (de *Aſcenſio recta* en *Declinatie* van *Capella*,) en beginnende, by voorbeeld, met *Milaan*, ziet men, de Globe ronddraaijende, allé Landen en Steden onder de Ster paſſeeren, die dezelve in haar *Zenith* hebben, en dus dezelvde

Breedte met *Milaan* hebben: dus ziet men deze Ster gaan over 't Zuider deel van *Vrankryk*, de *Golf van Gascogne*, den *Oceaan*, *N. Schotland*, 't *Noordelykſte van de Staat* van *N. York*, 't *Meer Ontario*, verder over 't *Noordlykſte van Louiſiana*, *N. Albion*, den *Wester Oceaan*, de *Kurilliſche Eilanden*, *Chinees Tartaryen*, *Thibet*, *Usbec*, de *Caſpiſche Zee*, *Circaſſie*, den *Crim*, *Wallachye*, *Belgrado* en de *Adriatiſche Zee*.

XLIV. PROBLEMA.

De Aſcenſio recta en Declinatie der Zon op een' gegeeven Dag te vinden.

367. Wy meenen in de voorige §§ genoeg gezegd te hebben, om het naauwe verband, dat *Sterre-* en *Aardrykskunde* op elkander hebben, te betoogen; dan, wy moeten ook nu zien op welk eene wyze men tot het bepaalen van de ligging der Plaatſen op den Aardbodem door middel der *Sterrekunde* komt; want ſchoon de Correspondentie der vaste Sterren met zekere plaatſen van onze Aarde ons een algemeen denkbeeld van dezelver ligging geven kan, zoo is zulks geenzins toereikende om haare juiste Lengte en Breedte te bepaalen; wy moeten egter het tegenwoordige *Problema* vooraf kunnen oplosſen, omdat wy van de *Declinatie* der *Zon* ten dien einde zullen moeten gebruik maaken.

368. De *Aſcenſio recta* en *Declinatie der Zon*, by voorbeeld, voor den 1 May willende weeten,

ſtelt

ſtelt men de *Artificieele Zon* op den 1 May, brengt den *Declinatie-Cirkel* aan dezelve, en ziet welke graad door dezen laatſten op den *Equator* des Hemels word aangewezen; tevens ziet men welke graad van den *Declinatie-Cirkel* door de *Ecliptica*, op dat punt, hetwelk de plaats der *Zon* voor den 1 May bepaald, geſneden wordt, en dusdoende vindt men voor de *Ascenſio recta* der *Zon*, op den 1 May, 37° 55′, en voor de *Declinatie* der *Zon* 15° *Noordelyk*; men behoeve ſlechts zich te herinneren, dat de *Declinatie der Zon Noordelyk* is, als de *Equator* beneden ds *Ecliptica* ſtaat, en *Zuidelyk*, als het omgekeerde plaats heeft.

XLV. PROBLEMA.

Door middel van de Declinatie der Zon, of van eenige Ster, de Breedte der plaats te vinden.

369. Wy onderſtellen nu altoos de *Declinatie der Zon* en der *Sterren* bekend, en gaan ons nu van dezelve bedienen, om de ligging der plaatſen ten opzigte der *Breedte* te bepaalen; ten dien einde brenge men de *Zon* of Ster aan den *Meridiaan*, en zie welke derzelver hoogte in den *Meridiaan* zy, § 324; van deze gevonden hoogte trekt men de *Declinatie* af, zoo die *Noordelyk* is, en bekomt de hoogte van den *Equator* boven den *Horiſon*, of telt de *Declinatie* by de *hoogte* by, als de *Declinatie Zuidelyk* is, wanneer men mede de hoogte des *Equators* bekomt, welke altoos gelyk

is aan het *Compliment van de Breedte* der plaats; § 35, 2e gevolg.

I. Voorbeeld: Men begeert de *Breedte* eener plaats te weeten, op welke de *Zon* den 14 Augustus 50° hoogte op den Middag heeft: men zoeke nu, volgens het voorgaande voorbeeld, de *Declinatie der Zon* voor den 14 Augustus, welke 20° 20′ is; deze 20° 20′ trekke men af van 50° hoogte, en bekomt 29° 40′ voor de hoogte des *Equators* boven den *Horiſon*, of het *Compliment van Breedte*, en de *Breedte* dezer plaats is dus 60° 20′. — Men plaatſe nu den *Horiſon* op de *Breedte* van 60° 20′, ſtelle de *Artificieele Zon* op den 14 Augustus, brenge den *Meridiaan* aan de *Zon*, en zie op den *Verticaal* hoe hoog de *Zon* boven den *Horiſon* ſtaat, 't welk men wederom bevinden zal te zyn 50°.

II. Voorbeeld: Men begeert de *Breedte* der plaats te kennen, op welke *Rigel* de heldere Ster in den voet van *Orion*, als dezelve in den *Meridiaan* is, 25° 30′ hoog ſtaat. — De *Declinatie* van *Rigel* is 8° 26′ *Zuidelyk*; deze geteld by 25° 30′, de onderſtelde hoogte van *Rigel*, verkrygt men 33° 56′ voor het *Compliment der Breedte*, en dus 56° 4′ voor de Breedte zelve. — Men plaatſe nu een der *beweegbaare Sterretjes* op de *Aſcenſio recta* en *Declinatie* van *Rigel*, brenge *Rigel* aan den *Meridiaan*, plaatſe den *Horiſon* op de *Breedte* van 56° 4′, wanneer men zien zal dat *Rigel* ook tevens de hoogte van 25° 30′ in den *Meridiaan* bereikt zal hebben.

370. De reden van het *bytellen*, of *aftrekken* van

van de *Declinatie* eener Ster by de waargenomen *hoogte*, willen wy nu nog met een enkel woord doen opmerken, moetende men daarby de Globe (derzelver ſtand veronderſtellende als in de vorige § gezegd is,) voor zich hebben; van den *Horiſon* dan af langs den *Meridiaan* opklimmende, ontmoet men (by eene *Zuidelyke Declinatie*,) eerſt de *Ster*, en vervolgends den *Equator*: de boog des *Meridiaans*, van den *Equator* tot den *Horiſon*, beſtaat dus uit twee deelen; het eerſte is de *Declinatie* der *Ster*, of de afſtand der Ster van den *Equator*; en het tweede is de *hoogte* der *Ster*, of de afſtand der *Ster* van den *Horiſon*; de eerſte nu wordt veronderſteld bekend te zyn, de laatſte wordt waargenomen, en beide te zamen maken zy den gezochten boog, of de hoogte des *Equators* boven den *Horiſon*. — By eene *Noordelyke Declinatie* ontmoet men eerst den *Equator*, vervolgends de *Ster*, en de hoogte der *Ster* is dus gelyk aan de *hoogte des Equators*, *plus* de *Declinatie der Ster*; waarom men, deze laatſte van de hoogte der Ster aftrekkende, overhoud de *hoogte van den Equator* boven den *Horiſon*, of het gezochte *Compliment van Breedte*. De *Breedte* eener plaats bekend hebbende, en de *Hoogte* der *Zon* op den *Middag* waargenomen hebbende, kan men dus ook door eene omgekeerde Handelwyze de *Declinatie der Zon* vinden; is de middaghoogte der *Zon*, by voorbeeld te *Amſteldam*, 47° 30', dan is derzelver *Declinatie* 9° 51' *Noordelyk*, omdat de *Equator* te *Amſteldam* 37° 39' hoogte in den *Meridiaan* heeft.

371. Wy zien dus, dat het niet ongemakkelyk is de *Breedte* eener plaats door de *Middaghoogte* der Zon of Sterren te vinden; wy moeten nu nog zien hoe men ook de *Lengte* eener plaats door middel der *Sterrekunde* vinden kan: dit *Problema* is niet zoo gemakkelyk als het vorige optelosfen; wy zullen egter trachten ook hierin zoo duidelyk mogelyk te zyn; willen wy hierin ſlaagen, dan zullen wy vooraf nog eenige *Problema's* moeten oplosfen, waartoe wy nu overgaan.

XLVI. PROBLEMA.

Den tyd te vinden van den doorgang eener Ster door den Meridiaan op een' zekeren Dag.

372. Onafhangelyk van de plaats waar, kan dit *Problema* opgelost worden, wyl de tyd van den doorgang der Sterren door den *Meridiaan* alleen afhangt van het verſchil van *Ascenſio recta* der *Zon* en der *Ster*, zonder opzigt op *Geographiſche* Lengte of Breedte: dit dient men zich vooraf wel te herinneren; de waarheid hiervan zal ons door de oplosfing van dit Problema bevestigd worden.

373. Wy onderſtellen dat 'er gevraagd zy, *hoe laat* REGULUS *op den* 11 *Maart door den Meridiaan gaat?* — Men ſtelt de *Artificieele Zon* op den 11 Maart, een der *beweegbaare Sterretjes* op de *Ascenſio recta* en *Declinatie* van *Regulus*, en brengt vervolgends *Regulus* aan den *Meridiaan*; dan zal ons de *Uurwyzer* 10 uuren 30' 's avonds voor

voor den doorgang van *Regulus* door den *Meridiaan* aanwyzen, het zelvde op wat plaats ook de *Meridiaan* geſteld zy.

374. Om de reden hiervan te vatten, brenge men de *Zon* eerst aan den *Meridiaan*: de Uurwyzer wyst nu 12 uuren op den middag, en tegelyk met de *Zon* is nu ook die graad van den *Equator* aan den *Meridiaan*, welke de *Ascenſio recta* der Zon aanwyst; de Globe nu voortdraaijende, zien wy elken volgenden graad des *Equators* ſucceſsivelyk aan den *Meridiaan* komen, tot dat eindelyk ten 10 uuren 30′ die graad van den *Equator* aan denzelven komt, welke de *Ascenſio recta* van *Regulus* aanwyst; dan, verplaatſen wy de Zon, welke den 11 Maart 351° 0′ *Ascenſio recta* had, zoo veele graaden dat zy 6° *Ascenſio recta* krygt, zoo zien wy dat *Regulus* ook één Uur vroeger aan den *Meridiaan* komt, omdat de *Zon*, op den *Equator* geteld, 15° nader aan *Regulus* ſtaat, men kan dus den doorgang der Sterren door den *Meridiaan* vinden, als men, het verſchil van de *Ascenſio recta der Zon* en der *Ster* kennende, dit in tyd verandert, naar reden van 15° in één Uur, § 234; dan, 'er is nog een ander middel om den tyd van den doorgang der Sterren door den *Meridiaan* te vinden, te weeten, door de *Ascenſio recta* der Sterren in tyd: dezelve is niet anders, dan de *reductie* van het getal graaden en minuten van de *Ascenſio recta* eener Ster, in tyd veranderd; men vind dezelve by ieder Ster in onze *Catalogus van Sterren* aangeteekend; wy gaan 'er het gebruik van aanwyzen.

XLVII. PRO-

XLVII. PROBLEMA.

Te vinden den tyd van den doorgang van het 1e *punt van Aries door den Meridiaan.*

375. Dit *Problema* wordt eveneens als het zoo even voorgaande opgelost, by voorbeeld: willende weeten den doorgang van het 1e *punt van Aries op den* 1 *January*, ſtelt men de *Artificieele Zon* op den 1 January, en brengt vervolgends den 1e *graad van Aries* aan den *Meridiaan*, wanneer de Uurwyzer 5 uuren 14', voor den doorgang van het 1e punt van ♈ door den *Meridiaan* aanwyst; het is deze tyd, welken men noemt de *afſtand der Zon van het Nachteveningspunt*, (en niet de afſtand van het Nachteveningspunt van de Zon;) dezelve is niet anders dan het *Supplement van de Ascenſio recta* der Zon in tyd overgebragt.

376. Telt men nu by dezen gevonden tyd, van den doorgang van het *Nachteveningspunt* door den *Meridiaan*, de *Ascenſio recta* eener Ster in tyd, dan heeft men den tyd van den *doorgang van die Ster* door den *Meridiaan*; b. v. het Nachtevenings-

II. Voorbeeld:

het Nachteveningspunt van de Lente gaat den 20 April door den Meridiaan ten . 22 uuren 9'
Ascenſio recta van α van *Ophiucus* 17 uuren 26

39 uuren 35'
af 24 0
rest 15 uuren 35'

dus gaat α van *Ophiucus* door den *Meridiaan* den 21 April, ten 15 uuren 35', dat is in Burgerlyken tyd den 22e, ten 3 uuren 35' 's morgens.

XLVIII. PROBLEMA.

Te vinden hoe laat het is op zekere plaats, wanneer eene bekende Ster eene bepaalde hoogte bereikt heeft.

By voorbeeld: Hoe laat het zy te *Amſteldam*, op den 5 Maart, als de Ster *Aldébaran* de hoogte van 40° boven den *Horiſon* bereikt heeft, en reeds door den *Meridiaan* gegaan is.

377. Men ſtelt den *beweeghaaren Meridiaan* en *Horiſon* voor *Amſteldam*, de *Artificieele Zon* op den 5 Maart, het *Sterretje* op de *Ascenſio recta* en *Declinatie* van *Aldébaran*, en nu de Globe draaijende tot dat *Aldébaran* door den *Meridiaan* gegaan is, ſchroeft men den *Verticaal* in 't *Zenith* des *Horiſons* vast, en beweegt de Globe zoo lang tot

tot dat *Aldébaran* net boven den 40° graad des *Verticaals* te ſtaan kome, wanneer de *Uurwyzer* 8 uuren 5' voor het gezogten Uur zal aanwyzen.

378. Wanneer men alles in dezelvde poſitie laat ſtaan, en den *Declinatie-Cirkel* op de *Ascenſio recta* van *Aldébaran* plaatst, zoo maakt deze *Declinatie-Cirkel* met den *Meridiaan* van *Amſteldam* een' hoek, welken men de *Uurhoek* gewoon is te noemen, en welken men, als men dit *Problema* door rekening oplost, eigentlyk zoeken moet; het is deze *Uurhoek*, welke ons het tydverloop aanwyst, ſints den doorgang van *Aldébaran* door den *Meridiaan*, en welke dus by den tyd van dien *doorgang* moet *opgeteld* worden, zoo de Ster *bewesten* den *Meridiaan* ſtaat, of van den doorgang door den *Meridiaan* moet *afgetrokken* worden, zoo de Ster ten *Oosten* van den *Meridiaan* ſtaat, om het gezochte Uur te vinden; de grootte van dezen *Uurhoek* vindt men op de *Globe*, als men op den *Uurcirkel* ſlechts telt hoe veel Uuren en Minuten 'er tusſchen den *Meridiaan* en *Uurwyzer* gevonden worden.

halve wyst ons ook, omgekeerd, het verſchil van *Uurtelling* het verſchil van *Lengte* aan, en de geheele oplosſing van dit *Problema* komt dus hierop neêr, dat men weete hoe laat men telt op eene zekere plaats, als men op de plaats waar men zich bevind den tyd bekend heeft: hoe men dit door de Globe kan vinden, hebben wy reeds in de II, III, en volgende *Problema's* aangetoond; de vraag is hier, hoe men zulks door Sterrekundige waarnemingen weeten kan, en het is dus van de oplosſing van dit *Problema* dat het groote *Vraagſtuk, om ten allen tyde de Lengte op Zee te kunnen vinden, afhangt*; wy willen door middel onzer Globe een denkbeeld trachten te geeven, hoe men hierin gewoon is te werk te gaan.

380. Onderſtellen wy vooraf dat 'er aan den Hemel een zeker kennelyk teeken of verſchynſel plaats had, 't welk op genoegzamen afſtand van onze Aarde verwyderd was, om op twee byzondere plaatſen (*Amſteldam* en *Weenen*, by voorbeeld,) volſtrekt gelyktydig te kunnen gezien worden; dat hetzelve maar één oogenblik duurde, en dus een juist tydſtip aanduidde; dan is het zeker dat, daar *Amſteldam* zyne Uurtelling heeft, en *Weenen* de zyne, men op beide plaatſen den tyd van het verſchynſel waarnemende, hetzelve op een' verſchillenden tyd zoude ſchynen te zien, hoewel men het volſtrekt gelyktydig zag; en dit verſchil van tyd van het verſchynſel zou wezenlyk het verſchil der *Uurtelling*, en, in graaden overgebragt, het verſchil van *Lengte* tuſſchen deze twee plaatſen zyn: dat dit zoo is, blykt

klaar uit het gebruik onzer Globe; herinneren wy ons ſlechts de oplosſing van het IIe *Problema*: *Amſteldam* en *Petersburg* zagen beiden de *Zon*, zagen die beiden op hetzelvde oogenblik; *Amſteldam* zag die in den *Meridiaan*, en, de Globe ſtil laatende ſtaan, (dus volſtrekt geen tydverloop onderſtellende,) verplaatſten wy den *Meridiaan van Amſteldam* op *Petersburg*, dat is verplaatſten onszelven, om zoo te ſpreeken, in één oogenblik van *Amſteldam* naar *Petersburg*, en zagen dat het daar reeds 1 uur 50′ na den middag was.

381. Zoodanige verſchynſelen nu zyne 'er werkelyk voor eenen waarnemer van den Loop der Hemelſche Ligchaamen voorhanden: de *Eclipſen der Maan*, en die der *Satelliten van Jupiter* inzonderheid, omdat dezelven dikwyler voorvallen, zyn daartoe zeer geſchikt, en het is door derzelver waarneming dat men de *Geographiſche poſitie* der plaatſen op onzen *Aardbodem* meer en meer met naauwkeurigheid bepaalt; dan zoo nuttig dezen zyn in de *Aardrykskunde*, zoo weinig geſchikt zyn dezelven in de *Zeevaartkunde*: de *Eclipſen der Maan* vallen niet dikwils genoeg

wy zien dezelve aan den Hemel des avonds, als 't waare, van de eene Ster tot de andere gaan, kunnen den afſtand, welken zy heeft van de eene of andere Ster, door daartoe geſchikte werktuigen, meeten; deze afſtand verandert elk oogenblik, uit hoofde van de ſnelle beweging der *Maan*; deze afſtand word op alle de plaatſe, waar de *Maan* zigtbaar is, (parallaxis en refractie niet mede gerekend,) even groot op 't zelvde oogenblik waargenomen; en, dat alles afdoet, men is in ſtaat, zedert men in de kennis van den loop der *Maan* zulke groote vorderingen gemaakt heeft, denzelven te vooren te berekenen, daar Tafels van te maaken, en aldus den Zeeman in ſtaat te ſtellen den afſtand, dien hy, op Zee zynde, zelf waarneemt, in zyne Tafels optezoeken, te zien *hoe laat* die afſtand op de plaats, voor welke de Tafels berekend zyn, en welker *Lengte* hem bekent is, voorvalt, en, den tyd op het Schip waarnemende, aldus het verſchil van *Uurtelling*, het verſchil van Lengte, en dus (de Breedte bekend hebbende,) de juiste plaats, waar hy zich op Zee bevind, te bepaalen; is de *Maan* te naby de *Zon* om des avonds te kunnen gezien worden, dan bedient men zich van den afſtand der *Zon* en *Maan* zelven, en is dus in ſtaat elken dag deze waarneming te vernieuwen.

383. Zie hier een Voorbeeld, om, zoo het noodzakelyk zy, het gezegde door behulp der Globe nog meer duidelykheid by te zetten: men plaatſe den beweegbaaren *Meridiaan* op 343° *Lengte*, en den *Horiſon* op 30 *N. Breedte*, en dus

voor eene plaats midden in den grooten of Atlantiſchen Oceaan gelegen, ſtelt de *Zon* op ♈ 15° *Lengte* en de *Maan* op ♌ 20° Lengte 0° 0′ *Breedte*, dan is de afſtand van *Zon* en *Maan* dus 35°; laat nu een Schip, op deze hoogte op den 5 May in Zee zeilende, den afſtand van *Zon* en *Maan* van 35° des morgens ten 9 uuren 40′ waarnemen, plaatſen wy de Globe zoo dat de Uurwyzer op 9 uuren 40′ ſtaat, dan zal, wanneer, de Globe ſtilſtaande, de *Meridiaan* door ons op *Parys* verplaatst wordt, het te *Parys* zyn 0 uuren 8′ 's middags: het verſchil van Uurtelling is derhalve 2 uuren 28′, en de plaats der waarneming derhalve 37° *Westwaards* van *Parys* gelegen; hetzelvde nu dat wy hier doen, door het verplaatſen van den *Meridiaan* der Globe, doet de waarnemer op Zee, door zyne Tafelen; in dezelven vindt hy dat het te *Parys* 0 uuren 8′ 's middags moest zyn als de afſtand van *Zon* en *Maan* 35° was.

L. PROBLEMA.

De Amplitudo der Zon of Sterren te vinden.

384. *Amplitudo* noemt men den afſtand der *Zon* of *Sterren* van 't *Oosten* of *Westen*, by derzelver Op- of Ondergang; om dus de *Amplitudo* der *Zon* te *Amſteldam*, op den 5 May, te vinden, ſtelt men de Globe voor *Amſteldam*, de *Artificieele Zon* op den 5 May, en brengt dezelve aan den *Horiſon*; dan telt men hoe veele graaden op den *Horiſon* tuſſchen het *Oostpunt* des *Horiſons* en de

de *Zon* in gelegen zyn, waarvoor men op den opgegeeven dag vindt 39°.

385. Voor de Sterren is de oplosſing van dit *Problema* hetzelvde, waarom wy het onnodig achten voor dezelve 'er een byzonder voorbeeld bytevoegen.

LI. PROBLEMA.

De Ascenſio en Descenſio obliqua, en de Differentia Ascenſionalis eener Ster te vinden.

386. *Ascenſio obliqua* noemt men den graad des *Equators*, welke op eene gegeeven plaats by den Opgang der Ster tegelyk met dezelve aan den *Horiſon* is.

Descenſio obliqua noemt men den graad des *Equators*, welke op eene gegeeven plaats by den Ondergang der Ster tegelyk met dezelve aan den Horiſon is, en *Differentia Ascenſionalis*, het getal graaden van den *Equator*, tusſchen de beide punten van de *Ascenſio* en *Descenſio obliqua* gelegen: dus vindt men voor de *Ascenſio obliqua* van de Ster *Scheat* in *Pegaſus* 304°, voor de *Descenſio obliqua* 20°, en voor de *Differentia Ascenſionalis* 76°.

LII. PROBLEMA.

Den afſtand te vinden tuſſchen twee gegeeven Plaatſen.

387. Men legt den *Verticaal* op de Globe, zoo dat de geteekende zyde deszelven de beide plaatſen ſnyde, en het begin der telling, of de 0 van den *Verticaal*, op eene van beiden te liggen kome: dan zal de graad, welke door de andere plaats op den *Verticaal* wordt aangeweezen, het getal graaden aanwyzen, welke de afſtand is der beide plaatſen; multipliceert men dit getal graaden door 15, dan verkrygt men dien afſtand in *Duitſche Mylen* — en door 25 multipliceerende, gemeene *Franſche Mylen* of *Lieues*; in den grond is de oplosſing van dit *Problema* reeds vervat in onze gemaakte aanmerking, § 365, dat de afſtand van eene zekere Ster van ons *Zenith* gelyk is aan den afſtand der plaats zelve, in wier *Zenith* de gezegde Ster ſtaat; de waarheid van dit gezegde zal uit het volgende zeer klaar blyken; indien wy, volgens het XXX *Problema* handelende, een der Sterretjes op de *Aſcenſio recta* van 31° en *Noorder-Declinatie* van $41\frac{1}{2}°$, zynde de *Aſcenſio recta* en *Declinatie* van γ van *Andromeda*, welke, volgends § 355, de *Correſpondent* van *Conſtantinopolen* is, ſtellen, en de Globe draaijen tot dat, de *Artificieele Zon* op den 14 Nov. geplaatst zynde, γ van *Andromeda* in 't *Zenith* van *Conſtantinopolen* ſtaat, dan zien wy dat dit op dien dag gebeurt als het te *Am-*

ſtel-

Beldam 9 uuren 's avonds is; maar nu den *Verticaal* in 't *Zenith* vast ſchroevende, en den afſtand van die Ster van 't *Zenith* meetende, vinden wy dezelve te zyn 10 graaden, even dezelvden welken *Conſtantinopolen* van *Amſteldam* heeft, want daar ons het *Zenith* des *Horiſons Amſteldam* aanwyst, en *γ* van *Andromeda Conſtantinopolen*, moet noodwendig de boog des Hemels tuſſchen 't *Zenith* van *Amſteldam* en *γ* van *Andromeda* gelyk zyn aan den afſtand van *Amſteldam* en *Conſtantinopolen* zelven, en wy beſluiten dus dat *Conſtantinopolen* 150 *Duitſche Mylen*, of 250 *Lieues* van *Amſteldam* afgelegen is.

388. Met dit al moet men zich niet voorſtellen, dat men even op dezelvde wyze ook den afſtand van twee plaatſen, op dezelvde *Paralel* van *Breedte*, op die *Paralel* zou kunnen meeten: men zou zich hierin bedriegen, wyl de *Paralellen*, kleine cirkels zynde, haare middenlyn kleiner wordt, naarmate zy meer tot de Pool naderen, en dus ook derzelver graaden niet even veel *Mylen* bevatten; wil men dus zich van dezelven bedienen, dan dient men hierop te rekenen, doch moet dan ook alle Sterrekundige overeenkomst met deze meeting vaarwel zeggen, wyl men in de Sterrekunde niet dan van de groote Cirkels der Spheer tot het doen der berekeningen gebruik maakt, § 13.

Zie hier een Tafeltje van de hoegrootheid der graaden van *Lengte*, op elken graad van *Breedte*, de graad van den *Equator*, of van den grooten Cirkel der Spheer, berekend op 15 Duitſche Mylen.

Graaden van Breedte.	Mylen en Tiende deelen.	Graaden van Breedte.	Mylen en Tiende deelen.
0	15	46	10,419
1	14,998	47	10,230
2	14,990	48	10,037
3	14,979	49	9,841
4	14,963	50	9,642
5	14,944	51	9,440
6	14,918	52	9,234
7	14,888	53	9,027
8	14,853	54	8,817
9	14,815	55	8,604
10	14,771	56	8,388
11	14,724	57	8,169
12	14,672	58	7,949
13	14,615	59	7,726
14	14,554	60	7,500
15	14,488	61	7,272
16	14,418	62	7,042
17	14,344	63	6,810
18	14,265	64	6,575
19	14,182	65	6,339
20	14,095	66	6,101
21	14,003	67	5,861
22	13,907	68	5,619
23	13,807	69	5,375
24	13,703	70	5,130
25	13,605	71	4,884
26	13,482	72	4,635
27	13,365	73	4,385
28	13,244	74	4,134
29	13,119	75	3,882
30	12,990	76	3,629
31	12,857	77	3,374
32	12,721	78	3,119
33	12,580	79	2,862
34	12,430	80	2,605
35	12,287	81	2,346
36	12,135	82	2,088
37	11,980	83	1,828
38	11,820	84	1,568
39	11,657	85	1,307
40	11,491	86	1,046
41	11,321	87	0,785
42	11,147	88	0,523
43	10,970	89	0,262
44	10,790	90	0,000
45	10,607		

389. Zie hier het gebruik dezer Tafel: men begeert den afſtand te weeten tuſſchen *Falmouth* en *Frankfort*, welken beiden nagenoeg op 50° *Breedte* gelegen zyn; men zoekt het verſchil van *Lengte* dezer beide plaatſen, 't welk 13° 38′ 15″ is, § 120; nu multipliceert men dit getal met 9,642, zynde de grootheid van den graad op de *Breedte* van 50 graaden, volgens de voorgaande Tafel, en bekomt 130,167 *Duitſche Mylen* afſtand tuſſchen *Falmouth* en *Frankfort* (*).

LIII. PROBLEMA.

Den Angulus Poſitionis te vinden.

390. De *Angulus Poſitionis* noemt men den hoek welke gemaakt wordt door den *Meridiaan* van eene zekere plaats, en eenen op den *Horiſon* van diezelvde plaats *Verticaal* of *rechthoekig* ſtaande Cirkel.

391. Om dus den *Angulus Poſitionis* tuſſchen *Amſteldam* en *Conſtantinopolen* te vinden, plaatst men den *beweegbaaren Meridiaan* en *Horiſon* op *Amſteldam*, ſchroeft den *Verticaal* in 't *Zenith* vast, en brengt denzelven over *Conſtantinopolen*, wanneer het getal graaden op den *Horiſon*, tuſſchen den *Meridiaan* en *Verticaal*, de maat van den *Angulus Poſitionis* zyn zal, voor welken wy in ons geval 71° 45′ vinden zullen.

LIV. PRO-

(*) Alle de Nommers agter de (,) zyn tiendeelige breuken: 9,642 beteekent dus zoo veel, als $9\frac{642}{1000}$, en 130,167 is $130\frac{167}{1000}$ *Duitſche Mylen.*

LIV. PROBLEMA.

De Rechte, Schuine en Paralelle Spheer door middel dezer Globe te vertoonen.

392. Wy hebben, § 39, 40 en 41 verklaard, wat men door ieder derzelven te verſtaan heeft; het is hier de tyd te bewyzen, dat dit alles aldus plaats vindt; wy haalen dit hier egter niet breedvoerig weder op; men plaatſe den *Horiſon* voor de drie verſchillende Spheeren, zoo als wy in de volgende § zullen zeggen, herleeze daarby de zoo even aangehaalde § §, en worde dan door het gebruik der Globe overtuigd van de waarheid van het te vooren geſtelde.

393. Voor de *Rechte Spheer* plaatſe men den *Horiſon*, zoo dat hy de *Noordpool* raake, dan valt het *Zenith* in den *Equator*, (ten minſte zeer naby: de dikte der ſtift, die Pool verbeeld, maakt hier eenig verſchil, doch 't geen egter niet zeer aanmerkelyk is,) en men ziet alle *Hemellichten*, waar ook geplaatst, by het ronddraaijen der Globe in rechte hoeken boven den *Horiſon* klimmen.

394. Voor de *ſchuine Spheer* plaatſe men den *Horiſon* dat hy een' hoek, welke ook, met den *Equator* maake, en zie hoe in verſchillende richtingen, naar de verſchillende hoegrootheid van de helling des *Horiſons*, de *Zon* en *Sterren* boven den *Horiſon* klimmen.

395. Om de *Paralelle Spheer* aanteduiden, behoeft men zelfs niet eens den *Horiſon* te gebruiken:

ken: de *Uurcirkel* zelf kan hier ten *Horiſon* ſtrekken, en by het ronddraaijen der Globe, de § 41 gemelde eigenſchappen der *Paralelle Spheer* aanwyzen.

396. Laat ons onderſtellen dat de *beweegbaare Meridiaan* de *Horiſon* zy van een zekere plaats onder den *Equator* gelegen, dat onze *beweegbaare Horiſon* op eenen zekeren graad van Noorder of Zuider Breedte gezet zy, en dat de *Uurcirkel Horiſon* zy der beide Poolen van de Aarde, dan zullen wy tegelyk *Rechte — Schuine* en *Paralelle Spheer* zien afgebeeld.

LV. PROBLEMA.

Die twee dagen te vinden, op welken de Zon loodlynig zal zyn boven zekere Plaats, tuſſchen de Keerkringen.

397. Men brengt ten dien einde de plaats, voor welke men begeert te weeten, op welken dag de *Zon*, in den Meridiaan zynde, loodlynig boven zal ſtaan, aan de *Ecliptica*, en de Dag in den Almanak, welke met het punt waar deze plaats de *Ecliptica* ſnyd overeenkomt, zal de gezochte dag zyn; op dezelvde wyze vindt men ook den *tweeden* dag, met de plaats ook aan de tegenovergeſtelde zyde der *Ecliptica* te brengen, waar dezelve weder de *Ecliptica* zal ſnyden, en ook even zoo den tweeden dag aantoonen, op welken de *Zon* des Middags ten 12 uuren in 't *Zenith* zyn zal; deze bewerking rust daarop, dat de *Declinatie* der

der *Zon* gelyk moet zyn aan de *Breedte* der Plaats, om door derzelver *Zenith* te kunnen gaan, en dat de *Declinatie* der *Zon* werkelyk gelyk is aan de *Breedte* der Plaats, op het oogenblik dat deze plaats de *Ecliptica* ſnyd. — Men vindt op deze wyze, dat op den 6 September en op den 8 April de *Zon* door het *Zenith* gaat van *Paramaribo*, en op 11 Augustus en 30 April op den Middag recht boven *Cap-Verd* ſtaat.

398. Men kan by deze gelegenheid aantoonen, hoe geene plaatſen, dan die tuſſchen de beide *Keerkringen* gelegen zyn, de *Zon* tweemaal des Jaars op den *Middag* in haar *Zenith* hebben, en dat *onder* de *Keerkringen* gelegen plaatſen éénmaal des Jaars de *Zon* in haar *Zenith* hebben, die onder den *Keerkring van den Steenbok* den 21 December, en die onder den *Keerkring van de Kreeft* den 21 Juny.

399. Ook zal het niet ongepast zyn hier aan te merken, dat op deze beide dagen, op welken de *Zon* in het *Zenith* is, de Bewooners dezer plaatſen op dit oogenblik geen ſchaduwe geeven, 't geen hen den naam van *ſchaduwloozen* heeft doen verkrygen, § 99. — Dat de *Zon* kleinder

Bewooners zich naar het *Zuiden* richt, en zy dus den naam van *Tweezyds ſchaduwgevenden* verkregen hebben, § 99; den *Horiſon* op de *Breedte* eener tusſchen de *Keerkringen* in gelegen plaats zettende, zal men zulks zeer duidelyk kunnen aanwyzen.

400. Op dezelvde wyze zal men ook de benaming van *Rondomſchaduwgevenden* voor de Bewooners van de Poollanden, en die van *Eenzyds ſchaduwgevenden* voor de Bewooners van de gematigde Luchtſtreek, § 100, door den *Horiſon* op verſchillende *Breedten* te plaatſen, kunnen verklaaren, het gebruik der Globe, reeds door ons zoo duidelyk ontwikkeld, zal ons, zoo wy vertrouwen, genoegzaame toelichting gegeeven hebben hoe dit op de beste wyze te kunnen aanwyzen.

LVI. PROBLEMA.

Te vinden de Lengte van den kortſten en langſten Dag, op eene bepaalde Breedte.

By voorbeeld: op eene Noorder Breedte van 40 graaden, en op eene Zuider Breedte van 60 graaden.

401. Men herinnere zich hier, dat alle landen, welken *Benoorden* den *Equator* gelegen zyn, hunnen langſten Dag hebben als de *Zon* in het 1e punt van *Cancer* is, en hunnen kortſten als dezelve in 't 1e punt van *Capricornius* is, terwyl voor de

Zui-

Zuidelyke landen net het omgekeerde plaats heeft; om dus den langſten Dag te vinden op de *Noorder Breedte* van 40°, ſtelle men de *Artificieele Zon* in *Cancer*, den *Breedte Cirkel* op 0 en 6ᵗ *Lengte*, en dus net in de beide Nachteveningspunten, brengen den 40ᵉ graad van den 1ᵉ *Meridiaan* der Globe, welke gehcel in graaden verdeeld is, onder den *Breedte Cirkel*, ter linkerhand van de *Artificieele Zon*, plaatſe den *beweegbaaren Meridiaan* aan de *Artificieele Zon*, en draaije vervolgends de Globe, tot dezelvde graad van 40 graaden *Noorder Breedte* onder den *Breedte Cirkel*, ter rechterhand der *Artificieele Zon*, komt, wanneer de Uurwyzer 3 uuren na *Middernacht*, en dus 15 uuren voor de lengte van den langſten Dag, op 40 graaden *Noorder Breedte*, zal aanwyzen.

402. Om nu ook de Lengte van den *Kortſten* Dag voor den 40ᵉ graad van N. Breedte te vinden, zette men de *Artificieele Zon* in *Capricornius*, brenge den *beweegbaare Meridiaan* aan de *Artificieele Zon*, en draaije vervolgends de Globe, tot de 40ᵉ graad van Noorder Breedte weder aan den *Breedte-Cirkel* ter rechterhand der *Artificieele Zon* komt, wanneer de Uurwyzer 9 uuren 0′, voor de Lengte van den *Kortſten* Dag, op eene *Noorder Breedte* van 40° zal aanwyzen.

403. Op dezelvde wyze, doch met verwisſeling van de *Lengte der Zon*, vinden wy voor de *Lengte* van den *Langſten Dag* op de Paralel van 60° *Zuider Breedte* 18 uuren 40′, en voor den *Kortſten Dag* 5 uuren 20′.

LVII. PRO-

LVII. PROBLEMA.

Te vinden de Breedte van eene Plaats, alwaar de Langſte Dag van eene gegeeven lengte is.

By voorbeeld: van 18 uuren.

404. Wanneer de geheele Dag 18 Uuren is, dan is de lengte van den $\frac{1}{2}$ Dag, dat is van den *doorgang* der *Zon* door den *Meridiaan* tot aan derzelver *Ondergang*, 9 Uuren: men plaatſe dus den *Breedte-Cirkel* even als by het vorige *Problema*, de *Artificieele Zon* op het 1e punt van *Cancer* of *Capricornius*, (want de Lengte der dagen is gelyk op gelyke graaden van Breedte, *Benoorden* en *Bezuiden* den Equator,) brenge vervolgends den *beweegbaaren Meridiaan* aan de *Zon*, dan is het zeker dat alle plaatſen onder deze *Meridiaan* gelegen, te gelyk *Middag* hebben, ſchoon zy niet tegelyk de *Zon* zien *Op-* of *Ondergaan*; men draaije vervolgends de Globe tot de Uurwyzer 9 uuren na den Middag aanwyst, wanneer men ziet welke graad van den *Meridiaan* onder den *Breedte-Cirkel* is: het is deze graad nu welke de gezochte *Breedte* zyn zal; dusdoende vindt men voor de *Breedte* eener Plaats, welker langſte *Dag* van 18 uuren is, 57° *Noorder Breedte*, zoo men de *Artificieele Zon* in *Cancer* gezet heeft, of even zoo veele graaden *Zuider Breedte*, zoo men die in *Capricornius* gezet heeft. — Op dezelvde wyze vindt men de *Breedte* eener Plaats, wier *Kortſte* Dag van eene gegeven

ven lengte moet zyn, wanneer men maar bedagt is, om voor eene *Zuider Breedte* de *Zon* in *Cancer*, en voor eene *Noorder Breedte* in *Capricornius* te plaatſen. —— Wy moeten hierby doen opmerken, dat het tot de oplosſing van het *Vraagſtuk* niet volſtrekt noodzakelyk zy, dat men eerst den *beweegbaaren Meridiaan* aan de *Artificieele Zon* brenge; waar dezelve ook moge ſtaan, als men de Globe maar op het gegeeven Uur zette, lost men dit Vraagſtuk op dezelve wyze op; wy hebben dit maar vooronderſteld om duidelyk te zyn.

LVIII. PROBLEMA.

Die twee Dagen te vinden, op welken de Zon op een gegeeven Uur op eene zekere Plaats opgaat.

By voorbeeld: te *Parys* ten 5 uuren.

405. Plaats den *beweegbaaren Meridiaan* op *Parys*, en den *Horiſon* op de *Breedte* van *Parys*; zie welke der op de Globen getrokken *Meridiaanen* 't naast met het 5e uur voor den middag, op den *Uurcirkel* aangeteekend, overeenkomt, en breng het punt van den *Horiſon*, waar diezelvde *Meridiaan* den *Horiſon* ſnyd, aan den *Ecliptica*, en dit punt zal in den Almanak den begeerden Dag aanwyzen; zoo zal dit zelfde punt des *Horiſons* aan de tegenovergeſtelde zyde der *Ecliptica* den tweeden Dag aanwyzen, en wy vinden dus voor de beide gezochte Dagen den 25 April en den 15 Au-

Augustus; indien 'er egter geen der *Meridiaanen* het 5e uur voor den Middag net snyd, mag men den *beweegbaaren Meridiaan* zoo veel verschuiven, dat één derzelven juist op dit uur valle.

LIX. PROBLEMA.

De Ascensio recta van 't midden des Hemels voor een' zekeren Dag en Uur te vinden.

406. Door de *Ascensio recta van het midden des Hemels*, verstaat men den graad des *Equators*, die op het gegeeven Uur aan den *Meridiaan* is; men heeft dus, om denzelven te vinden, de Globe op de *Lengte* en *Breedte* der *Plaats* te stellen, de *Artificieele Zon* op den bepaalden Dag; en de Globe te draaijen dat de Uurwyzer het Uur aanwyze; wanneer de graad van den Hemel *Equator*, die op dat oogenblik den *Meridiaan* passeert, de *Ascensio recta van het midden des Hemels is*: dus vindt men voor de *Ascensio recta van het midden des Hemels*, op den 25 April, te *Parys*, ten 5 uuren 's morgens 298°.

LX. PROBLEMA.

Te vinden hoe laat het is te Parys, wanneer men op den 9 September de hoogte der Zon aldaar voormiddag heeft waargenomen te zyn 30 graaden.

407. Men plaatst den *beweegbaaren Meridiaan* en *Horison* voor *Parys*, de *Artificieele Zon* op den

9 September, ſchroeft den *Verticaal* in 't *Zenith* vast, en draait de Globe tot dat de *Artificieele Zon* 30° hoogte op den *Verticaal* aanwyst, dan zal de Uurwyzer 9 uuren 15' voor het gevraagde Uur aantoonen.

LXI. PROBLEMA.

Den Tyd te vinden, dat de Zon een zeker Azimuth moet hebben, op een' gegeeven Dag en Plaats.

By voorbeeld: Hoe laat het is te *Parys*, op den 9 September, als de *Zon* des voorden-Middags een *Azimuth* heeft van 30 graaden.

408. Men plaatst den *beweegbaaren Meridiaan* en *Horiſon* op *Amſteldam*, de *Artificieele Zon* op den 9 September, ſchroeft den *Verticaal* in 't *Zenith* vast, ſtelt denzelven aan de rechterhand des *Meridiaans* op het *Azimuth* van 30 graaden, en draait de Globe tot dat de *Artificieele Zon* den *Verticaal* ſnyd, wanneer de Uurwyzer 10 uuren 40', voor den gevraagden Tyd aanwyzen zal.

LXII. PROBLEMA.

De Declinatie der Zon gegeeven zynde te zyn 15° Noordelyk, te vinden de Lengte der Zon in de Ecliptica, en den Dag van 't Jaar.

409. Daar de *Zon* tweemaal dezelvde *Declinatie* heeft, eens *voor-* en eens *na* den 21 Juny, moet men ten minſte weeten of men in het Voor- of Najaar ſtelt te zyn; wy ſtellen, dat het gegeeven voorbeeld in 't Najaar zy, dan draaije men de Globe tot dat de 15° (benoorden den *Equator*) van den *beweegbaaren Meridiaan*, aan de zyde der daalende Teekens, in dewelken de *Zon* na den 21 Juny zich bevindt, de *Ecliptica* ſnyde, welke aldaar 4ᵗ 22° voor de *Lengte der Zon*, en den 26 Augustus voor den gezochten Dag zal aanwyzen; men kan hetzelvde ook met den *Declinatie-Cirkel* doen, zonder de Globe te draaijen.

LXIII. PROBLEMA.

Te vinden of de Planeet Venus Morgen- of Avond-Ster is.

410. De Planeet *Venus*, welke van wegens haare nabyheid by onze *Aarde* zich dikwyls onder een' zeer grooten hoek aan ons Oog vertoont, is even daarom eene der ſchoonſte en helderſte Sterren, welken wy boven onzen *Horiſon* zien ſonkeren, en heeft, omdat zy reeds vroeg na Zon-

ne Ondergang, en zelfs somtyds terwyl dezelve nog Op is, en ook kort voor Zonne Opgang van ons gezien wordt, den naam van *Morgen-* en *Avond*-Ster verkregen: dezelvde Ster dus, die wy *Avond*-Ster noemen, is het ook, welke wy *Morgen*-Ster gewoon zyn te noemen; om nu te weeten of *Venus Morgen-* of *Avond*-Ster is, behoeft men slechts te onderzoeken of de *Planeet* de *Zon* voorgaat, of volgt; gaat zy de *Zon* vooruit, dan is zy *Morgen-Ster*; volgt zy de *Zon*, dan is zy *Avond-Ster*; om zich hiervan te overtuigen zy het volgende ten voorbeelde: onderstellen wy dat de *Lengte der Zon* zy 3ᵗ 10°, en de *Lengte van Venus* 4ᵗ 29°; zet op beiden deze gegeeven Lengten de *Artificieele Zon*, en een zeker Teeken voor de *Planeet Venus*; plaats den *Horison* op eenige breedte, welke ook; breng de *Zon* aan den *Wester Horison*; doe dezelve *Ondergaan*, en gy zult zien dat *Venus* nog boven den *Wester Horison* zal zigtbaar zyn, en als *Avond-Ster* schitteren. — Dan wanneer nu *Venus* eene teruggaande beweging heeft, de *Zon* nadert, zich in derzelver straalen verliest, en eindelyk aan de andere zyde van de *Zon* zigtbaar wordt, gaat zy de *Zon vooruit*, en wordt alsdan *Morgen-Ster*; stellen wy, dat de *Zon* nu 4ᵗ 10° *Lengte* heeft, en *Venus* 2ᵗ 25° *Lengte*, stellen wy op deze beide graaden weder het Teeken voor *Venus* en voor de *Zon*, brengen wy *Venus* aan den *Ooster Horison*, dan zien wy haar vóór de *Zon* opgaan, en des Morgens als *Morgen-Ster* flonkeren.

411. Wy behoeven dus slechts, om te weeten

of

of *Venus Morgen-* of *Avond-*Ster zy, haare Lengte te kennen, op deze gevonden Lengte een zeker Teeken op de *Ecliptica* te ſtellen, en een ander op de Lengte der *Zon*, en te onderzoeken of zy vóór de *Zon Op-* of na dezelve *Ondergaat*, wanneer wy tevens zien, hoe lang wy haar *voor-* of *na* de *Zon* als *Morgen-* of *Avond-Ster* zullen kunnen zien.

LXIV. PROBLEMA.

De Tegenvoeters van eene zekere Plaats te vinden.

By voorbeeld: van *Amſteldam.*

412. Men plaatſe ten dien einde den *beweegbaaren Meridiaan* op *Amſteldam*, zoeke de *Breedte* van *Amſteldam*, welke men bevindt te zyn 52° 30' *Noorder Breedte*; nu telle men aan de tegenovergeſtelde zyde van den *beweegbaaren Meridiaan* 52° 30' *Zuider Breedte*, welken ons voor de Tegenvoeters van *Amſteldam* aanwyzen een zeker punt in den *Stillen Oceaan*, ten *Oosten* N. *Zeeland*, op eene *Lengte* van 202° 31' en 52° 21' *Zuider Breedte*; wanneer men nu den *Horiſon* op *Amſteldam* ſtelt, zal men zien, dat deze ook tegelyk *Horiſon* van de *Tegenvoeters van Amſteldam* is, waaruit dus volgt, dat de *Zon* voor de *Tegenvoeters van Amſteldam* Opgaat, als zy voor *Amſteldam* Ondergaat, en voor de *Tegenvoeters van Amſteldam* Ondergaat, als zy voor *Amſteldam* Opgaat; dus het aldaar *Middernacht* is, als het

by ons *Middag* is, en omgekeerd; waaruit al verder volgt dat het *Oost-* en *West*-punt des Hemels ſlechts betrekkelyke punten zyn, en dat dus twee Reizigers, vlak *Oost-* en *Westwaart* voordreizenden, eenen Dag verſchil in telling zouden hebben, wanneer zy elkander aan de tegenovergeſtelde zyde der Aarde, op 180° afſtands in Lengte van de plaats, van welke zy beiden vertrokken waren, weder ontmoetede. Laat ons veronderſtellen dat twee Reizigers tegelyk op den 1 September des middags ten 12 uuren *Amſteldam* verlaaten, dat de een', welken wy A zullen noemen, *Oostwaart* opreize, en 15° in 24 uuren afleggen, en de ander, B, vlak *Westwaart* opreizende, ook in 24 uuren 15 graaden aflegge, dan zal

A, 15 gr. afgelegd hebbende,	ſchryven	2 Sept. 1 uur (namiddag.
30 . . .		3 Sept. 2 uur namiddag.
60 . . .		5 dito 4 uur namiddag.
90 . . .		7 dito 6 uur namiddag.
150 . . .		11 dito 10 uur namiddag.
165 . . .		12 dito 11 uur namiddag.
180 . . .		14 dito 0 uur middern. (*)

doch

(*) Wy verkiezen hier de uitdrukking den 14 September 0 uur Middernacht, voor den 14 September 12 uur Middernacht, omdat dezelve minder twyffelachtig is; het moest één' dag en één uur later zyn dan 12 September ten 11 uur namiddag, en dus den 13 September ten 12 Middernacht; doch den 13e. ten 12 uur middernacht, is het niet meer den 13e maar den 14e ten 0 uur, omdat wy den Dag met Middernacht gewoon zyn te beginnen.

doch
B, 15 gr. afgereisd hebbende, ſchryft 2 Sept. 11 uur voormiddag.

90	. . .	3 Sept.	10 uur voormiddag.
60	. . .	5 dito	8 uur voormiddag.
90	. . .	7 dito	6 uur voormiddag.
150	. . .	11 dito	2 uur voormiddag.
165	. . .	12 dito	1 uur voormiddag.
180	. . .	13 dito	0 uur middernacht.

en aldus zal A den 14 September ſchryven, wanneer B ſlechts den 13 telt: een voorbeeld 't welk de waarheid van dit gezegde bevestigd, vindt men in de Reis van den *Franſchen Zee-Kapitein* MARCHAND, welke den 14 December, 1790, uit de Haven van *Marſeille* naar de *Noordwestkust* van *Noord-America*, bezuiden *Kaap Horn* om, was afgezeild, om aldaar Pelteryen te koopen, en met dezelven in *China* handel te dryven: deze, van de *Noordwestkust* van *Noord-America* vertrokken zynde, kwam op den 25 November, 1791, te *Macao* in *China* aan, wanneer men aldaar reeds den 26 telde, en was dus verpligt eenen Dag in zyne telling over te ſlaan, en den volgenden niet *Saturdag 26 November*; maar *Zondag 27 November* te ſchryven.

LXV. PROBLEMA.

Den ſtand der Ecliptica boven den Horiſon te leeren kennen.

413. Het kan van zeer veel nut zyn, dat men den ſtand der *Ecliptica* boven onzen *Horiſon* weet

te onderſcheiden, omdat het in en naarby denzelven is, dat men de *Planeeten* zoeken moet, omdat men daardoor ook beter de Sterrebeelden van den *Dierenriem* leert onderkennen, en omdat de ſtand der *Ecliptica* boven onzen *Horiſon* zoo zeer verſchillende is; men plaatſe den *Horiſon* eens op de *Breedte* van *Amſteldam*, en laate de Globe één omwenteling om haaren As volbrengen, dan zal men zien op hoe verſchillende plaatſen de *Ecliptica* den *Horiſon* en *Meridiaan* ſnyde.

414. Om dus ten allen tyde den ſtand der *Ecliptica* boven onzen *Horiſon* te kenne, plaatſe men den *beweegbaaren Meridiaan* en *Horiſon* op de *Lengte* en *Breedte* der plaats, de *Artificieele Zon* op den gegeeven Dag, en draaije de Globe dat de Uurwyzer het Uur aanwyze; dan zal men b. v. voor *Amſteldam* zien, dat de *Ecliptica* den 1 Augustus, 's morgens ten 2 uur, in het Noord-Oosten boven onzen *Horiſon* komt, den *Meridiaan* op $27\frac{1}{2}^{o}$ hoogte ſnyd, en in het Zuid-Westen weder aan den *Horiſon* komt; daar integendeel op 21 December, ten 8 uur 12' 's Avonds, de *Ecliptica* den *Horiſon* in het O. N. O. ſnydende, $50\frac{1}{2}^{o}$ hoog in den *Meridiaan* is, en in het W. Z. W. onder onzen *Horiſon* daalt, daar wy integendeel ten allen tyde den *Equator* denzelvden ſtand boven onzen *Horiſon* zien behouden, gelyk dit niet moeijelyk valt op de Globe te doen opmerken.

LXVI. PROBLEMA.

Wanneer men 's avonds eene of andere heldere Ster aan den Sterrenhemel ziet ſchitteren, door middel der Globe te vinden, tot welk geſternte zy behoort.

415. Men neeme door middel van het *Quadrant*, § 212 beſchreven, de *hoogte* dezer Ster en derzelver *Azimuth* waar, plaatſe den *beweegbaaren Meridiaan* en *Horiſon* der Globe op de *Lengte* en *Breedte* der Plaats, waar de waarneeming geſchied is, ſchroeve den *Verticaal* in 't *Zenith* vast, ſtelle denzelven op 't gevonden *Azimuth* der Ster; nu brenge men den *beweegbaaren Declinatie-Cirkel* over den *Verticaal*, dat hy den gevonden graad van hoogte op den *Verticaal* ſnyde, dan zal de graad, welken de *Declinatie-Cirkel* op den *Equator des Hemels* ſnyd de *Aſcenſio recta* der gezochte Ster zyn, en de graad des *Declinatie-Cirkels*, welke den graad van hoogte op den *Verticaal* ſnyd, zal de *Declinatie* der Ster zyn.

416. By voorbeeld: Op den 29 November neemt men te *Amſteldam*, 's avonds ten 10 uuren, in het N. O. ten Z. op de *hoogte* van 21° en 36° *Azimuth* eene Ster waar, welke men begeert te kennen; men plaatſe dus op de *Lengte* en *Breedte* van *Amſteldam* den *beweegbaaren Meridiaan* en *Horiſon*, de *Artificieele Zon* op den 29 November de Globe op 10 uuren 's avonds, den *Verticaal* op 36° *Azimuth* ten Oosten den Meridiaan, en den

Declinatie-Cirkel over den *Verticaal*, dat hy de 21° van *hoogte* ſnyd, dan zal deze de 198° van *Aſcenſio recta* op den *Equator* ſnyden, terwyl de 10° *Zuider-Declinatie*, door den 21e graad van *hoogte* wordt aangewezen; dus heeft de gezochte Ster eene *Zuider-Declinatie* (want zy ſtaat onder den *Equator*) van 10°, en eene *Aſcenſio recta* van 198°, waarmede wy in de *Catalogus van Sterren* vinden, dat de gezochte Ster *de Koorn Aair* van de Maagd is.

LXVII. PROBLEMA.

Den Tyd van het Hoogſte Water voor eene zekere Plaats op een' gegeeven Dag te vinden.

By voorbeeld: te *Amſteldam* den 31 Auguſtus, 1801.

417. Men zoeke 1° volgens, § 337, den tyd van de middelbaare Conjunctie der Maan in de Maand Auguſtus, 1801, en leide daaruit af de Lengte der Maan op dien Dag, en uit deze gevonden Lengte de Lengte voor den 31 Auguſtus; wy hebben in gemelde § voor de *Lengte der Maan* den 31 Auguſtus gevonden 3t 8° 25'. — 2° Plaatſe men op deze gevonden Lengte de *Artificieele Maan*, en zoeke den Tyd van den *doorgang* van de Maan *door den Meridiaan*, waarvoor men vindt 8 uuren 5' 's morgens; nu zoeke men de Lengte der Maan voor 8 uuren 5' om het juiſte Uur van den doorgang van dezelve door den Meridiaan

diaan te vinden, volgens § 338; men vindt dus doende 3t 5° 40' *Lengte der Maan* op den 31 Augustus 1801, ten 8 uuren 5' 's morgens, en door deze gevonden Lengte nu 7 uuren 50' voor den *tyd* van den *doorgang van de Maan door den Meridiaan*; wy kunnen de *Breedte* der Maan hier verwaarloozen, omdat dezelve dicht by de *Zonnestanden* ſtaat. — 3°. Het Uur van den doorgang der *Maan* door den *Meridiaan* gevonden hebbende, telle men by hetzelve het Uur der plaats, bl. 140, en bekomt voor het middelbaare Uur van het hoogſte water te *Amſteldam*, den 31 Augustus, 1801, 10 uuren 50' 's morgens. 4° Zoeke men of de Maan in haar *Apogeum*, *Perigeum* of *Middelbaare afſtanden* is; men telt namelyk by 1t 15° 28' 7" Lengte van het Apog. 1800.
1 10 39 50 voor deszelfs bew. in 1 Jaar

---

en bekomt 2t 26° 7' 57" voor de Lengte van het *Apogeum* der Maan voor 1801, daar nu de *Maan* ruim 3 Teekens Lengte heeft, moet zy gerekend worden in haar *Apogeum* te zyn; — Men trekke nu van de Lengte der Zon . . 5t 8°
af de Lengte der Maan . . . 3 5

---

en bekomt voor den Afſtand van ☉ en ☾ 2t 3° met dezen Afſtand nu van Zon en Maan zoekt men in de *Tafel van het verſchil van Tyd*, bl. 139, in de Colom van het *Apogeum*, de Vereffening van Tyd voor het hoogſte water, waarvoor men vindt 50' *voor*, welke afgetrokken van den gevonden middelbaaren tyd van 10 uuren 50', bekomt men voor den waaren Tyd van het hoogſte water

te

te *Amſteldam*, den 31 Augustus 10 uuren o' 's morgens.

418. II Voorbeeld: *Hoe laat zal het Hoogſte water te Archangel op den* 31 *Augustus*, 1801, *plaats hebben?*

Men plaatst nu den *beweegbaaren Meridiaan* op *Archangel*, en vindt voor den Tyd van den *middelbaaren* doorgang der *Maan* door den *Meridiaan* van *Archangel* 7 uuren 50'; de Lengte der *Maan* geſteld zynde 3t 5° 40' zoo als zy was te *Amſteldam* ten 8 uuren 5'; doch hoe laat is het te *Archangel*, als het 8 uuren 5' te *Amſteldam* is? dit zoeke men volgens het III *Problema*, wanneer wy vinden dat het te *Archangel* 10 uuren 20' is, dus is de Lengte der Maan ten 10 uuren 20' te *Archangel* 3t 5° 40'; hoe groot zal dan de Lengte der Maan zyn ten 7 uuren 50', en dus 2 uuren 30' vroeger? wy vinden voor de vordering der *Maan* in *Lengte*, op de *Ecliptica* der Globe, voor 2½ uur 1° 30', en dus de *Lengte der Maan* voor den gevonden tyd 3t 4° 10', en door middel van deze *Lengte* voor den *waaren doorgang der Maan* door den *Meridiaan* van *Archangel* . . . . . 7 uuren 46'

by 't Uur van *Archangel* bl. 140 6 0

13 46'

komt voor den middelbaaren tyd van 't *hoogſte water* te *Archangel* 13 uuren 48', met den *Affland der Zon en Maan*, vindt men nu weder in de Tafel bl. 139 in de Colom van het Apogeum 50' voor, voor de *Vereffening*, en aldus 12 uuren 56'

Mid-

Middag voor den tyd van hoogſte water op den 31 Augustus te *Archangel*.

419. Deze beide voorbeelden met elkander vergeleken, doen ons duidelyk het nut van eenen *beweegbaaren Meridiaan* zien, die gelegenheid geeft zowel van 't verſchil van *Lengte* als *Breedte* in 't gebruik der Globe zich te kunnen bedienen; in dit geval komt het verſchil van *Breedte* in 't geheel niet in aanmerking, maar wel het verſchil van *Lengte*.

LXVIII. PROBLEMA.

Te toonen het groote nut, dat de Bewooners der Noorder Poollanden van de Maan trekken kunnen.

420. Men plaatst den *Horiſon* op eene Breedte van 70 a 75 graaden, en de *Artificieele Zon* in *Capricornius*, wanneer de *Zon* voor deze landen het laagst onder den *Horiſon* gedaald is; laat ons nu onderſtellen, dat de beweging der *Maan* in de *Ecliptica* geſchied, dan vinden wy door middel van haare beweging in *Lengte*, die op de *Ecliptica* der Globe uitgedrukt ſtaat, haare *Lengte* voor elken dag haares Ouderdoms, en deze geteld by 9 Teekens, de veronderſtelde *Lengte* der *Zon*, vindt men gemakkelyk de middelbaare plaats der *Maan* voor elken Dag, 't geen in dit geval genoeg voldoet; plaatſende nu de Maan op 39½ afſtand van de *Zon*, wanneer zy dus dus 3 dagen Oud is, zien wy haar reeds in 't Z. W. ten Z.

op-

opgaan; verder voortgaande, komt zy al hooger en hooger boven den *Horiſon*, en in haar 1e quartier zynde, gaat zy reeds ten 6 uuren 's morgens *Op-* en 's avonds ten 6 uuren *Onder*, en blyft dus 12 uuren boven den *Meridiaan*, terwyl wy zien, dat de *Maan* een' dag of vier verder dan het 1e quartier gevorderd zynde, en dus $11\frac{1}{2}$ dag oud zynde, in 't geheel niet *ondergaat*, en derhalve geduurende eene groote acht dagen, juist den tyd van haar grootſte licht, beſtendig *boven* den *Horiſon* blyvt; deze Aardbewooners trekken dus een zeer groot nut van de *Maan*: zy zien dezelve geduurig by afwisſeling en beſtendig dan, wanneer zy haar meeste licht geeft.

LXIX. PROBLEMA.

Uuren en Minuten tyds te brengen tot Graaden en Minuten van den Equator; of Graaden en Minuten van den Equator te brengen tot Uuren en Minuten tyds.

421. Men plaatst ten dien einde de Globe zoo, dat de XII Uuren net op den 360e graad des *Hemel Equators*, en dus op het begin der telling te ſtaan kome; dan komt elk Uur, elke Minuut Tyds overeen met elken daarmede overeenſtemmende Graad en Minuut van den *Equator*, en het is door deze overeenſtemming dat men vindt, by voorbeeld, dat: 5 uuren 45′ tyds *na den Middag* (want het is met de *Middag* dat de Sterrekundigen hunnen Dag beginnen, § 164;) 86° 15′ ma-

maken — dat 5 uuren 45′ 's *Morgens* 266° 15′ van den *Equator* uitmaken — dat 28° van den Equater 1 uur 52′ uitmaaken en 158°, 10 uuren 32′, enz.

II. HOOFDSTUK.

GEBRUIK DER HEMEL- EN AARD-GLOBEN NAAR DE CONSTRUCTIE VAN ADAMS.

§. 422. Wy hebben, in het III HOOFDSTUK des II Boeks, eene vergelykende beſchouwing gegeeven van onze nieuwe Conſtructie der *Aard Globe* met de oude Conſtructie, daarmede voornamelyk bedoelende, de Conſtructie der *Aard-Globe* volgens den Hr. ADAMS, terwyl wy, in het IV HOOFDSTUK, van dat zelfde Boek, eene Beſchryving der *Hemel-Globe* gegeeven hebben, insgelyks ingericht naar de Conſtructie van den Hr. ADAMS: niets is dus gepaster dan dat wy, in dit BOEK, over het Gebruik der Globen handelende, en in het vorige HOOFDSTUK over het gebruik der *Aard-Globe*, naar onze *nieuwe* Conſtructie gehandeld hebbende, nu overgaan om in dit Hoofdſtuk over het gebruik der *Hemel-* en *Aard-Globe*, volgens de Conſtructie van den Hr. ADAMS te ſpreken; daardoor toch zal onze Leezer nog beter in ſtaat geſteld worden, het voor en nadeel der beide Conſtructiën te leeren kennen, Globen

naar

naar het ſamenſtel van den Hr. ADAMS bezittende, daar ook deze Handleiding toe te kunnen bezigen, en wy gelegendheid hebben, het gebruik der *Hemel-Globe*, voor welke wy nog altoos de Conſtructie van dien Heer als de beste houden, aantetoonen. — Wy zullen egter deze Verhandeling over het gebruik der *Globen* van ADAMS zeer kort kunnen zamenvatten, omdat wy alle de ophelderingen, welken wy in het vorige Hoofdſtuk gegeeven hebben, hier kunnen achterweeglaaten, en men de aldaar gegeeven Voorbeelden gebruikende de *reſultaaten* derzelven ook aldaar vindt; dus wy ons mede kortheidshalve van het geeven van voorbeelden, als het niets aan de duidelykheid ontneemt, zullen onthouden; wy volgen dan alhier de in het vorige Hoofdſtuk opgegeeven Voorſtellen, en zullen aantoonen hoe dezelven op de Hemel- of Aard-Globe kunnen opgelost worden.

423. Het I PROBLEMA vervalt hier, omdat wy geen *beweegbaaren Meridiaan* en *Uurcirkel* aantreffen; 't is waar, wy treffen op de *Aard-Globe* van ADAMS ook een' *beweegbaaren Meridiaan*, en op de *Hemel-Globe* een' beweegbaaren *Declinatie-Cirkel* aan, doch deze van een ander gebruik zynde, zal hetzelve waar het te pas komt door ons nader worden aangewezen.

424. II PROBLEMA: *Te vinden hoe laat het op eene gegeeven plaats zy, als het op eene andere plaats Middag is:* Tot het oplosſen van dit en eenige volgende *Problema's* moeten wy aanmerken, dat de *Aard-Globe* van ADAMS omringd

is

is van eenen grooten *koperen Cirkel*, welken men als eenen *algemeenen Meridiaan* moet aanzien; dat men de *Zon*, als beſtendig in denzelven ſtaande, zich moet voorſtellen; en dat dus elke plaats, die aan de geteekende zyde van dezen Cirkel tusſchen de *Noord Pool* en het *Zuidpunt* des *Horiſons*, zoo de plaats *Noorder Breedte* heeft, of tusſchen het *Zuidpunt* des *Horiſons* en de *Zuidpool*, zoo de plaats *Zuider Breedte* heeft, gebragt wordt, *Middag* heeft. — 2°. Dat men, de Uurtelling voor eene zekere plaats willende regelen, verpligt is, deze plaats eerst aan dezen *algemeenen Meridiaan* te brengen, en dan den *Uurwyzer* te verſchuiven en te ſtellen op die XII, die het hoogst boven den Horiſon ABC, Fig. 40., verheven is. — 3°. Dat de Uuren op onze *nieuw gegraveerde Aard-Globen* zoodanig ingericht zyn, dat het XII^e *Uur* op den *Meridiaan* (hier in een' Aardryksku...digen zin genomen,) van *Amſteldam* ſtaat, dus de *algemeene Meridiaan* zelf Uurwyzer is, als men de Uurtelling van *Amſteldam* gebruikt. — 3°. Dat, daar de Uurtelling op de Globe van de regterhand naar de linkerhand gaat, omdat de Globe (gelyk de Aarde werkelyk ook doet,) van het *Weſten* naar het *Oosten* veronderſteld wordt om haar As te draaijen, men I Uur op 15° aan de linkerhand van *Amſteldam*, en XI Uuren op 15° ten *Oosten* van *Amſteldam* geplaatst ziet, verpligt is, in het onderzoek van het verſchil der Uurtelling, gelyk in dit *Problema*, altoos het getal der Uuren omtekeeren, dat is voor XI Uuren, I Uur, voor X Uuren, II Uuren, enz. te tellen, wanneer men

van eenige plaats ſpreekt ten *Oosten* van *Amſteldam* gelegen, en ſprekende van eenige plaats ten *Westen* van *Amſteldam* XI Uuren voor I Uur, X voor II Uuren, enz. te tellen, omdat het werkelyk I Uuren is op alle plaatſen, die onder den *Meridiaan*, waar het XI Uur op de Globe ſtaat, gelegen zyn, en XI Uuren is op alle plaatſen, die onder den *Meridiaan* I Uur bewesten *Amſteldam* gelegen zyn, als het te *Amſteldam* Middag is; dus, om dit *Problema* optelosſen, herinnere men zich, dat, de *Uurtelling der Globe* voor *Amſteldam* ingericht zynde, men *Amſteldam* aan den *Meridiaan* brengende, XII Uuren telt; en na de Globe terug, dat is naar de linkerhand bewegende, *Petersburg* aan den *Meridiaan* moet brengen, niet direct het Uur vindt, dat men te *Petersburg* telt, als het te *Amſteldam* Middag is, maar juist omgekeerd het Uur, dat men te *Amſteldam* telt als het te *Petersburg* Middag is; de Uurwyzer (hier de Meridiaan zelf,) wyst dus op dit oogenblik 10 uuren 10', 't welk volgens onze bovengemelde aanmerking omkeerende, dat is voor XI, 1 Uur tellende, heeft men 1 uur 50' voor den tyd te *Petersburg*, als het te *Amſteldam* *Middag* is: immers, wanneer het 10 uuren 10' te *Amſteldam* is, als het te *Petersburg* Middag is, moeten 'er nog 1 uur 50' verlopen eer het te *Amſteldam* Middag is, en dus aldaar Middag zynde, is het 1 uur 50' geleden dat het te *Petersburg* Middag was.

425. Wil men egter dit *Problema* direct oplosſen, dan keere men hetzelve om, brenge *Peters-*

burg,

burg aan den *Meridiaan*, ſtelle den Uurwyzer op XII Uuren, en brenge vervolgends *Amſteldam* aan den *Meridiaan*, dan zal de Uurwyzer (nu voor *Petersburg* geſteld,) 1 uur 50′ aanwyzen. — Zoo ook, voor het 2e voorbeeld, § 276, brenge men *N. York* aan den *Meridiaan*, ſtelle den Uurwyzer op XII Uuren, en draaije de Globe tot *Petersburg* aan den *Meridiaan* komt: dan zal de Uurwyzer 5 uuren 10′ voor het gezochte Uur aanwyzen.

426. III. PROBLEMA: *Hoe laat is het te Peking, als het te Weenen 7 uur 30′ voormiddag is?* Men brenge *Weenen* aan den *Meridiaan*, zette den Uurwyzer op XII Uuren, en draaije de Globe dat de Uurwyzer 7 uuren 30′ voormiddag aanwyze; dan teekene men aan, welke graad van *Lengte* er aan den *Meridiaan* zy, (zynde in dit geval $100\frac{1}{2}^{o}$,) brenge nu *Peking* aan den *Meridiaan*, verzette den Uurwyzer weder op XII Uuren, en brenge den $100\frac{1}{2}$ graad weder aan den *Meridiaan*: dan zal de Uurwyzer 8 uur, 10′ namiddag voor het gezochte Uur aanwyzen.

427. IV. PROBLEMA. *Waar is het Middernacht, als het te Peking Middag is?* Men brengt *Peking* aan den *Meridiaan*, en vindt dezelvde oplosſing als wy, § 278, hebben opgeteeven.

428. V. PROBLEMA: *Te vinden hoe laat het op eene zekere plaats is, als het Middernacht op eene andere is.* By voorbeeld: als het te *Aſtracan* Middernacht is, hoe laat is het dan te *Amſteldam*? Wy zagen, § 424, dat de Uurtelling van *Amſteldam* gebruikt wordende, de *Meridiaan* zelf

Uurwyzer is: men brenge dus voor dit *Problema Aſtracan* aan de tegenovergeſtelde zyde des *algemeenen Meridiaans*, dat is aan dat gedeelte, dat tuſſchen de *N. Pool* en het *Noordpunt* des Horiſons gelegen is, (de Noot, bl. 212 geplaatst, ook hier op toepaſſende,) dan wyst ons de *Meridiaan* zelf 8 uuren, 50′ voor het gezochte Uur aan.

429. VI. PROBLEMA. *Te vinden waar het Middernacht is, als het 5 uuren, 30′ nadenmiddag te Weenen is.* Men brengt *Weenen* aan den *Meridiaan*, plaatst den Uurwyzer op XII Uuren, en draait de Globe, dat de Uurwyzer 5 uuren, 30′ nadenmiddag aanwyst, en ziet onder de tegenovergeſtelde zyde des *Meridiaans* alle die plaatſen, § 280 opgenoemd, welken op dit tydſtip *Middernacht* hebben.

430. VII. PROBLEMA. Dit Problema kan niet wel op deze Globe worden opgelost, omdat men den *Hemel-Equator* hier mist; doch wy zullen in de plaats van hetzelve het volgende plaatſen. *De Uurwyzer te ſtellen voor een gegeeven' Dag.* Men zoeke in den Almanak den graad der *Ecliptica*, in welken de *Zon* dien Dag is, brengen dezen graad van de *Ecliptica*, welke op de Globe zelve getekend is, aan den *Meridiaan*, en ſtelle den Uurwyzer op XII Uuren; dit *Problema* behoort eigenlyk toegepast te worden op de *Hemel-Globe*; op de *Aard-Globe* komt het zoo zeer niet te pas, want dit doende zou *Amſteldam*, of eene andere plaats, welker Uurtelling men bezigde, juist niet aan den *Meridiaan* zyn tegelyk met den graad der *Ecliptica*, in welken de *Zon* dien dag ſtaat, en men zou dus

hier

hier eenigszins zich kunnen verwarren; om deze reden komt ook de *Ecliptica* op de Aard-Globe niet te pas, want dan zou de graad derzelve, in welken de *Zon* ſtaat, altoos met den *Meridiaan* der plaats moeten overeenkomen, omdat men zich altoos moet verbeelden dat de *Zon* in den *Meridiaan* der Aard-Globe geplaatst zy; voor onze nieuwe Conſtructie vervalt dit *Problema*, omdat zich de Uurtelling aldaar van zelve voor den Dag, van welken men ſpreekt, regelt; voor de *Hemel-Globe* daarentegen geeft dit *Problema* altoos gelegenheid, om de Globe te ſtellen overeenkomſtig den ſtand der Sterren op een zeker Uur; want heeft men den Uurwyzer voor den gegeeven dag geregeld, dan heeft men de Globe maar te draaijen, tot de wyzer het voorgeſtelde Uur aanwyst; en heeft men de Globe geſteld voor de Poolshoogte der plaats, § 433, dan ziet men alle de Sterren boven den *Horiſon* verheven, welken, op dien Dag en Uur, op de gegeeven plaats zigtbaar zyn.

431. Het VIII PROBLEMA vervalt ook, omdat wy hier geen *beweegbaaren Horiſon* aantreffen.

432. IX PROBLEMA: *De Geographiſche Lengte en Breedte eener Plaats op de Globe te vinden*: dit *Problema* wordt op dezelvde wyst opgelost; hier is geen verſchil dan dat onze *Meridiaan* vast ſtaat, en dus de Plaats onder denzelven moet gebragt worden, om te zien welke graad van den *Equator* tegelyk met denzelven aan den *Meridiaan* is.

433. Het X PROBLEMA wordt hier, gelyk wy reeds, § 294, zeiden, vervangen door het volgende. *De Globe te ſtellen op de Poolshoogte van eene zekere Plaats*; hetzelve is betrekkelyk zowel tot de *Hemel-* als tot de *Aard-Globe*; men verheft, om aan het Voorſtel te voldoen, de *Noordpool* der Globe, zoo de plaats *N. Breedte* heeft, of de *Zuidpool*, zoo de plaats op een *Z. Breedte* gelegen is, zoo veele graaden boven den *Horiſon* als de *Breedte* der Plaats is, dus op 52° 21' voor *Amſteldam*, op 48° 50' voor *Parys*, enz.; en brengt men, op de *Aard-Globe*, de Plaats, op wier Poolshoogte men de Globe geſteld heeft, tevens aan den *Meridiaan*, dan ſtaat de Globe zowel op de *Lengte* als op de *Breedte* van die plaats, en de *Horiſon* deelt dan de Globe op dezelvde wyze in twee deelen, als onze beweegbaare *Horiſon* de Globe naar onze nieuwe Conſtructie doet, § 356

434. XI PROBLEMA: *Den tyd van den Op- en Ondergang der Zon voor eene gegeeven plaats, op een' zekeren Dag des Jaars, te vinden.* Dit voorſtel behoort eigenlyk tot de *Hemel-Globe*; men ſtelt de Globe ten dien einde op de Poolshoogte der Plaats, zoekt de *Lengte der Zon* voor dien Dag, brengt den gevonden graad van *Lengte* aan den *Meridiaan*, plaatst den Uurwyzer op XII Uuren, en brengt dezen zelvden graad aan den *Ooster* Horiſon, om den *Opgang* der *Zon*, en aan den *Weſter* Horiſon, om het Uur haarer *Ondergang* te vinden.

435. De

435. De oplosſing van het XII PROBLEMA is, het gezegde in de voorgaande § in 't oog houdende, hetzelvde als § 297.

436. XIII PROBLEMA: *Door middel van den Breedte-Cirkel den Tyd van den Op- en Ondergang der Zon, voor een' zekeren Dag en Plaats, te vinden.* — Dit voorſtel behoort alleen tot de *Aard-Globe*. — Wy hebben hier geen *beweegbaaren Breedte-Cirkel*, doch gebruiken in deszelvs plaats den *Horiſon* der Globe, dien wy, om reden dat hy tot verſchillende einden kan gebruikt worden, met den Hr. ADAMS ook liever den *Breeden papieren rand* willen noemen: deze *Breede papiere rand* kan, wanneer men de Globe op de natemelden wyze ſtelt, ook den Cirkel verbeelden, welke het *verlichte* gedeelte der Aarde van het *duiſtere* affcheid; te weeten: men vindt op de achter kant van den *Meridiaan* der *Aard-Globe*, wanneer zy naar de Conſtructie van den Hr. ADAMS ingericht is, aan de *Noordpool* eene verdeeling van de Maanden des Jaars, ingericht naar de *Declinatie der Zon*, voor elken Dag; ſtelt men nu de Globe zoodanig dat de gegeeven Dag net den *Breeden papieren rand* ſnyde, dan zal deze den ſtand des *Breedte-Cirkels* van onze op de nieuwe wyze gemonteerde *Aard-Globe* verbeelden; en verbeeld men zich de *Zon* in den *algemeenen Meridiaan* op den graad van *Declinatie*, welken de *Zon* op dien Dag heeft, te ſtaan, dan zal het gedeelte der Aarde, 't welk boven den *Breeden papieren rand* verheven is, het gedeelte der Aarde vertoonen, dat op een zeker tydſtip van dien Dag door de *Zon* verlicht wordt; alle plaatſen, welken door den

Breeden rand aan de linkerzyde der *Zon*, wanneer de N. Pool der Globe namelyk van ons afgekeerd ſtaat, geſneden worden, zien de *Zon* Opgaan, en allen die aan de rechterhand der *Zon* door dien zelvden rand geſneden worden, zien de *Zon Ondergaan.*

437. XIV PROBLEMA. *Te vinden welke plaatſen de Zon tegelyk met Amſteldam zien Opgaan op den 5 May.* — Men plaatſe de Globe dat de 5 May den *Breeden rand* ſnyde, draaije de Globe tot *Amſteldam* door *dien rand* aan de linkerhand der *Zon* geſneden wordt; dan vindt men, even als in § 301, alle plaatſen door den *Breeden rand* geſneden, welken de *Zon* tegelyk met *Amſteldam* zien *Opgaan.*

438. XV PROBLEMA. *Te vinden voor welke plaatſen de Zon Ondergaat, als op den 5 May te Amſteldam de Zon Opgaat.* — De oplosſing van dit *Problema* dezelvde zynde als § 302, herleeze men hier ſlechts dezelve met toepasſing op de Globe van ADAMS.

439. XVI PROBLEMA: *Te vinden voor welke plaatſen de Zon Op- en Ondergaat, als het Middag is te Amſteldam op den 5 May.* — De oplosſing is weder dezelvde als § 303, alleenlyk herinnere men zich dat men *Amſteldam* aan den *Meridiaan* moet brengen, omdat, deze nu altoos den *Declinatie-Cirkel* der *Zon* verbeeldende, alle plaatſen aan denzelven moeten gebragt worden, als men de Globe zoo wil ſtellen, dat het voor dezelve *Middag* zy.

440. XVII PROBLEMA: *Te vinden voor welke plaat-*

plaatſen de Zon Op- en Ondergaat, op een' gegeeven Dag en Tyd, buiten den Middag: men plaatst de Globe zoo, dat de gegeeven Dag den *Breeden papieren rand* ſnyde, en brenge het gegeeven Uur aan den *Meridiaan* zoo het voor *Amſteldam* is, gelyk in 't voorb. § 304; anders moet men eerst de plaats aan den *Meridiaan* brengen, en den Uurwyzer op XII Uuren ſtellen, om dezelvde uitkomst te verkrygen als, § 304, is opgegeeven.

441. XVIII PROBLEMA. *Te vinden hoe laat het is te Amſteldam, als den 24 Aug. te Mexico de Zon opgaat.* — Men ſtelt de Globe, dat de 24 Aug. den *Breeden rand* ſnyde, en brengt *Mexico* aan den *Breeden rand* ter linkerhand der *Zon*: dan zal in dit geval de *Meridiaan* als Uurwyzer 12 uuren 50′ voor het gevraagde Uur aanwyzen; wierd 'er egter gevraagd hoe laat het by voorbeeld op 't zelfde oogenblik te *Weenen* ware, dan zou men eerst *Weenen* aan den *Meridiaan* moeten brengen, den Uurwyzer op XII Uuren moeten ſtellen, en dan *Mexico* aan den *Breeden rand* brengen, om te vinden het Uur, dat men te *Weenen* telt, als de *Zon* te *Mexico* opgaat.

442. XIX PROBLEMA. *De Lengte van den Dag en Nacht te vinden op eene zekere datum, voor eene gegeeven Plaats.* — Men plaats de Globe, gelyk meermaalen gezegd is, voor den gegeeven Dag, brengt de Plaats aan den *Breedden rand* ter linkerhand der *Zon*, ſtelt den Uurwyzer op XII Uuren, en draait de Globe, tot die Plaats weder aan den *Breeden rand* ter rechterhand der *Zon* komt, wanneer de Uurwyzer het gezochte Uur

zal aanwyzen; men paſſe verder de gemaakte aanmerkingen, § 307, op deze § toe.

443. XX PROBLEMA. *De Aard-Globe als een Tellurium te gebruiken, om de verwiſſeling der Saiſoenen en het verlengen en korten der Dagen aan te wyzen.* — Men trekke met kryt een' Cirkel op den vloer der kamer, verdeele denzelven in twaalf deelen, welken de 12 Teekens der *Ecliptica* verbeelden zullen, en ſchryve by ieder derzelven het karakter, 't welk men aan ieder dezer Teekens gewoon is te geeven, hierby in 't oog houdende, dat men het Teeken ♋ tegen 't Noorder, en ♑ tegen 't Zuider gedeelte der kamer plaatſe. — Vervolgends plaatst men de Globe op de Pools-hoogte van 66½ graaden, dan verbeeld de breede papiere rand de *Ecliptica* of *Zonsweg*; nu plaatst men de Globe op den op den grond getrokken Cirkel in ♑ zoo, dat de naald van het Compas, 't geen onder de Globe geplaatst is, net het Noordpunt van 't Compas wyze; voorts plaatst men in het middenpunt van den op den grond getrokken Cirkel een Tafeltje met eene kaars, welker vlam ten naaste by even hoog als het centrum der Globe zyn moet: dan zullen wy in dezen ſtand ons den *Zomerzonneſtand* zien voorgeſteld; het verlichte gedeelte der Aarde zal ons nu door het gedeelte der Globe, dat naar de kaars is toegekeerd, en door dezelve verlicht wordt, worden aangewezen. Op dezelvde wyze zal men ook den *Winterzonneſtand*, en de ſtand, der Aarde op de dagen der *Nachteveningen* kunnen verbeelden, door de Globe in de Teekens van ♋, ♈ of ♎ te plaatſen,

ſen, altoos in 't oog houdende by de beweging der Globe te zorgen, dat de Naald beſtendig op de Lely van 't Compas blyve, om daardoor aan te toonen hoe de As der Aarde beſtendig naar hetzelvde punt des Hemels gericht blyft; door deze bewerking zal men de gevolgen, welken wy § 314, uit het in de vorige §§ verhandelden, hebben afgeleid, ook hier bevestigd zien, en aldus een *algemeen* denkbeeld kunnen verkrygen van de verwisſeling der Saiſoenen; daar de Cirkel, die het door de kaars verlichte gedeelte der Globe van het onverlichte gedeelte affcheid, te onbepaald is, om de juiste lengte der dagen op deze wyze te bepaalen, en men hier den *Breedte-Cirkel* mist, die ons dit *naauwkeurig* zou kunnen leeren.

444. De oplosſing van dit Problema, zoo als wy dezelve zoo even gegeeven hebben, is dezelvde die de Heer ADAMS geeft; zy is egter eenigzins omſlagtig, en niet altoos practicabel, hoewel ze dan wanneer ze uitvoerbaar is, gantsch niet ongeſchikt is; men kan egter den op den grond getrokken Cirkel misſen, als men maar, in het plaatſen der Globe, ten opzichte der kaars het volgende in acht neemt: 1°. Om den ſtand der Aarde geduurende den *Zomerzonneſtand* te verbeelden, plaatst men de Globe zoo, dat eene lyn, uit het middenpunt der Globe tot de vlam der kaars getrokken, het Teeken ♋ op den *Breeden rand* (nu de *Ecliptica*) der Globe ſnyde. — 2° Om den ſtand der Aarde geduurende den *Winterzonneſtand* te verbeelden, plaatst men de Globe zoo, dat diezelvde lyn door het Teeken ♑ gaat. —

3°. Om

3°. Om den ſtand der Aarde geduurende de *Nachtevening van de Lente* te vertoonen, plaatst men de Globe zoo, dat de lyn, uit het centrum der Globe tot de kaars getrokken, door het Teeken van ♈ gaat, — 4°. Om den ſtand der Aarde geduurende de *Nachtevening van den Herfſt* aan te wyzen, moet de Globe zoo geplaatst worden, dat de meergenoemde lyn door het Teeken ♎ gaat, omdat in deze verſchillende ſtanden der Aarde de *Zon* altoos van ons in de daarby opgegeeven Teekens gezien wordt; tevens moet men altoos zorgen dat de *Noordpool* der *Globe* altoos naar hetzelvde punt der kamer gericht, en de Globe op $66\frac{1}{2}$° Poolshoogte geplaatst blyft; de lyn, welke men zich van het centrum der Globe tot de vlam der kaars getrokken verbeelden moet, is de centraale Zonneſtraal, die ons by het rondraaijen der Globe op dezelve de plaatſen aanwyst, in welker *Zenith* de *Zon* dien dag is, en welken men zich gemakkelyk kan voorſtellen, door op den *Breeden rand* der Globe, op den graad der *Ecliptica*, in welken de *Zon* dien dag is, een zeker puntig Teeken te plaatſen; dan wellicht gevoelt men, dat het dezelvde uitwerking zal hebben of men, om de Globe in de opgenoemde ſtanden met betrekking tot de kaars te plaatſen, dezelve óm de kaars heenen draait, dan wel of men de kaars van plaats doet veranderen; en hieruit leiden wy de navolgende eenvouwiger oplosſing van dit Problema af.

445. Men plaatſe de Globe, altoos vooraf op de

de Poolshoogte (*) van 66½ graad geplaatst zynde, in het midden op eene groote Tafel, en doet eene kaars, welke de *Zon* verbeelden moet, rondom dezelve bewegen, welke ons aldus door haare verſchillende verlichting der Globe, in de verſchillende Teekens der *Ecliptica* geplaatst zynde, de verwisſeling der Saiſoenen, gelyk boven gezegd is, zal aanwyzen, terwyl de beweging der kaars om de Globe ons den ſchynbaaren *Jaarlykſche* loop der *Zon* zal voorſtellen. — Eindelyk willen wy hier nog by opgemerkt hebben, dat het gebruik van eene kaars ook by onze nieuwe Aard-Globe met veel nut zal kunnen gebruikt worden, daar men alsdan, door middel des *Breedte Cirkels*, de hoogte der kaars zoodanig kan ſchikken, dat de affcheiding van licht en duisternis net onder denzelven kome, en aldus meer naauwkeurig ons het gevraagde doe kenne.

446. XXI PROBLEMA. *Te vinden den dag, op welken de Zon voor het eerst Op- en voor het laatst Ondergaat voor elke plaats, welker Noorder Breedte grooter is dan 66½ graad.* — Men brengt de *plaats*, voor welke men den Dag weeten wil dat de *Zon* aldaar het *eerst Opgaat* of voor het *laatst* Or-

(*) Wy bezigden hier beſtendig de uitdrukking *Poolshoogte*; om des te verſtaanbaarer te zyn; het is waar, het is in dit geval eigenlyk geen *Poolshoogte*, welke men aan de Globe geeft, omdat de *Breede rand* niet den *Horiſon*, maar de *Ecliptica* verbeeld, en de verheffing van de *N. Pool* boven den *Breeden rand* verbeeld dus eigenlyk de hoegrootheid van den hoek, welken de *As der Aarde* met de *Ecliptica* maakt.

Ondergaat, aan den *Meridiaan*, te weeten: aan die zyde van denzelven, waar de graaden van den *Equator* af beginnen te tellen, en dus, wanneer de gegeeven plaats op 80° *Noorder-Breedte* ligt, onder den 80e graad; vervolgends beweegt men de Globe alzoo in derzelver ſtoel, dat die plaats net den *Breeden rand* ſnyde; dan zie men achter op den *Meridiaan* welke Dagen van de aldaar geſneden verdeeling der 12 Maanden nu mede door den *Breeden rand* geſneden worden: de eene van dezelven zal de Dag zyn dat de *Zon* op de gegeeven plaats voor het *eerst Opgaat*, en de andere de Dag dat de *Zon* voor het *laatſte Ondergaat*; dus ziet men, de gegeeven plaats op 80° *Noorder Breedte* geſteld zynde, dat tegelyk met de plaats aan den *Breeden rand* zyn de 23 February en 19 October; wanneer men nu hier by opmerkt, dat om den 25 February aan den *Breeden rand* te brengen, de Noordpool meer moet verheven worden, en dus ook de gegeeven plaats meer boven den *Breeden rand* ryst, en derhalve verder in 't verlichte gedeelte der Aarde komt, § 422, dan blykt hieruit dat het op den 23 February is, dat de *Zon* op een Noorder Breedte van 80° voor het *eerst Opgaat*, en dus den 19 October voor het *laatst Ondergaat*; en, inderdaad, wanneer wy in plaats van den 19e den 29 October aan den *Breeden rand* brengen, dan zien wy de gegeeven plaats, of wilt gy de *Paralel* van 80° N. Breedte, niet meer in 't verlichte gedeelte der Aarde komen.

447.

447. XXII PROBLEMA. *Den dag te vinden, op welken de Zon voor het eerst niet Ondergaat, benevens den tyd dat dezelve beſtendig boven den Horiſon blyft, voor elke plaats, wier N. Breedte grooter is dan 66½ graad.* — De oplosſing van dit Problema komt zeer na overeen met het vorige; men brengt egter nu de gegeeven plaats aan de andere zyde des *Meridiaans*, te weeten: aan die, op welke de Noo. van de Pool af beginnen te tellen; brengt vervolgends de plaats aan den *Breeden rand*, en ziet welke dagen van de verdeeling op den achter kant des *Meridiaans* tegelyk met dezelve aan den *Breeden rand* zyn, en dezen zullen de dagen zyn, op welke de *Zon* voor het eerst en laatst *niet Ondergaat*, waaruit men verder, volgens § 322, den tyd kan berekenen, dat zy beſtendig boven den *Horiſon* blyft.

448. XXIII PROBLEMA. *De Hoogte der Zon boven den Horiſon op en buiten den Middag te vinden.* — Dit Problema moet men eigenlyk op de Hemel-Globe oplosſen. — Men ſtelt de Globe op de Poolshoogte der plaats, zoekt de *Zons* plaats in de *Ecliptica*, ſtelt op denzelvden graad der *Ecliptica*, die op de Globe geteekend is, het *beweegbaare Zonnetje*, brengt hetzelve aan den *Meridiaan*, ſtelt den Uurwyzer op 12 uuren, draait de Globe tot dezelve 9 uuren voormiddag aanwyst, zo dit het gegeeven uur is, ſchroeft den *Verticaal* in 't *Zenith* vast, brengt denzelven over het *centrum* van het *beweegbaare Zonnetje*, en ziet welke graad hetzelve op den *Verticaal* aanwyst,

wyst, welke de Hoogte der Zon zyn zal 's morgens ten 9 uuren; voor *de Middaghoogte* der *Zon*, brengt men de *Zon* aan den *Meridiaan*, en onderzoekt even zoo, door middel van den *Verticaal*, hoe veele graaden dezelve boven den Horiſon verheven is.

449. XXIV PROBLEMA. *Het begin en einde der Morgen- en Avondſchemering te vinden.* — Wy zagen, § 325, dat de Morgenſchemering begint, als de *Zon* nog 18° onder den *Horiſon* ſtaat, en eindigt, als de *Zon* even zoo veele graaden onder denzelven gedaald is; ten einde nu dezen afſtand van 18° onder den *Horiſon* gemakkelyk te kunnen vinden, heeft men op de Globen, naar de conſtructie van den Hr. ADAMS, op 18 graaden afſtands van den *Breeden rand*, die voor dit *Problema* weder den *Horiſon* verbeeld, een' Cirkel van koperdraad geplaatst: derhalve het beweegbaare Zonnetje op de *Zons* plaats, en den Uurwyzer op 12 uuren gezet hebbende, wanneer de *Zon* in den *Meridiaan* is, brengt men de *Zon* aan dezen Cirkel van koperdraad onder den *Ooster Horiſon*, om het begin der Morgenſchemering, en aan denzelvden Cirkel onder den *Wester Horiſon*, om het einde der Avondſchemering door den Uurwyzer te zien aanwyzen.

450. XXV PROBLEMA. *Het Azimuth der Zon voor een' gegeeven Dag, Uur en Plaats te vinden.* — De Globe op de Poolshoogte der Plaats, den Uurwyzer voor den gegeeven Dag geſteld hebbende, en de Globe gedraaid hebbende, tot de Uurwy-

zer

zer het gegeeven Uur aanwyst, vindt men, door middel des *Verticaals*, even als, § 327, gezegd is, het *Azimuth* der *Zon*.

451. XXVI PROBLEMA. *De Maans plaats, gelyk ook die der overige Planeeten, ten allen tyde op de Globe aantewyzen.* —— Dit *Problema*, dat ook almede tot de *Hemel-Globe* behoort, laat zich op deze Globe niet zoo gemakkelyk oplosſen; enkel voor de *Maan* of voor éene *Planeet* kan men het *beweegbaare Zonnetje* gebruiken, wanneer men hetzelve op de *Lengte* der *Maan* of *Planeet* ſtelt, doch men kan niet wel de plaatſen van alle de Planeeten te gelyk op de Globe aanwyzen, omdat de Globe rond zynde, men die dan allen zou moeten vastmaken, 't geen welligt verwarring geeven zou.

452. Uit de zo even gemaakte aanmerking volgt van zelve, dat het XXVII PROBLEMA ook niet voor deze Globen geſchikt is.

453. XXVIII PROBLEMA. *Ten allen tyde van den Dag te vinden de plaats, in welker Zenith de Zon ſtaat.* — Om hierin te ſlaagen verheffe men de *Noordpool* der Globe $66\frac{1}{2}°$ boven den *Breeden rand*, wanneer dezelve weder, gelyk in § 429, de *Ecliptica* verbeelden zal; nu brenge men de plaats, welker Uurtelling men volgen wil, aan den *Meridiaan*, plaatſe een zeker teeken op den gegeeven Dag in den Almanak, dan zal, de Globe rondraaijende, dit Teeken op de Globe alle de plaatſen aanwyzen, boven welken de *Zon*, op de verſchillende Uuren, die de Uurwyzer wyst, ſtaat.

454. Over het XXIX PROBLEMA hebben wy

niets naders te zeggen; alles berust daar op de berekening van de juiste plaats der *Maan*: kent men die, dan is de oplosſing op beide de Globen overeenkomſtig den aart van haar ſamenſtel dezelvde.

455. Over het XXX PROBLEMA hier te willen ſpreken zou niet te pas komen: de *Aard-Globe* is alleen *Aard-Globe*, en ſtand van Sterren kan men hier niet aanwyzen, en op de *Hemel-Globe* zyn de vaste Sterren allen geteekend; dan laat ons hier onderzoeken *hoe men de Ascenſio recta en Declinatie der Sterren, door middel der Hemel-Globe, kan vinden?* — Ten dien einde brengt men de begeerde Ster, by voorbeeld, *Arcturus*, aan den *Meridiaan*, en ziet welke graad des *Equators* te gelyk met denzelven den *Meridiaan* ſnydt: deze zal de *Aſcenſio recta* der Ster zyn; voorts merke men op welke graad des *Meridiaans* door de Ster zelve wordt aangewezen, en deze zal de *Declinatie* der Ster zyn; dus vinden wy de *Aſcenſio recta* van *Arcturus* te zyn 211° 38', en zyne *Declinatie* 20° 13' Noorden.

456. XXXI PROBLEMA. *Den Op- en Ondergang eener vaste Ster op de Globe te vinden.* — Men plaatst de *Hemel-Globe* op de Poolshoogte der

[redacted]

ng der Ster zal aanwyzen, en den tyd van der-elver *Ondergang* willende kennen, brengt men diezelvde Ster aan den *Wester Horiſon*, wanneer de Uurwyzer den tyd van den *Ondergang* der Ster zal aanwyzen.

457. XXXII en XXXIII PROBLEMA. *Te vinden alle Sterren, die op eene gegeeven Plaats niet Ondergaan; of allen die, welken op dezelvde Plaats nooit Opgaan, of altoos onzigtbaar zyn.* Beide deze *Problema's* worden door de *Hemel-Globe* zeer gemakkelyk opgelost: wanneer men de Globe op de Poolshoogte der Plaats ſtelt, en dus de *Breede rand* den *Horiſon* der Plaats verbeeld, en men de Globe om haar' As beweegt, dan zullen alle die Sterren, welken *nooit ondergaan*, ook niet onder den *Horiſon* daalen, en die, welken nooit *Opgaan*, ook niet boven denzelven komen; voorts worden de gevolgen, welken wy, § 344 en 346, uit deze *Problema's* hebben afgeleid, ook hier kenbaar; want daar de afſtand van de N. Pool tot den *Horiſon* (in onze Noordelyke gewesten) gelyk is aan de Breedte der Plaats, zo raakt eene Ster, welker afſtand van de N. Pool gelyk is aan de *Breedte* der Plaats in het *Noorden*, ſlechts den *Horiſon* zonder onder denzelven te daalen, en gaat dus niet *onder*; is nu de afſtand van zodanig eene Ster van de Pool gelyk aan de *Breedte*, dan moet haare *Declinatie* gelyk aan het *Compliment van Breedte* zyn, § 17 en 18; om diezelfde reden ſnyd ook eene Ster, welker *Zuidelyke Declinatie* (voor alle plaatſen wier *Breedte*, *Noordelyk* is) gelyk is aan den afſtand des *Equators* van den *Horiſon*,

Almanak zoeken moet; en het is om deze gelykvormigheid in de oplosſing, dat wy niet nodig oordeelen het gezegde omtrent den *Acroniſchen Op-* en *Ondergang*, in § 348, alhier te herhaalen.

459. XXXV PROBLEMA. *Den Tyd van den Heliaſchen Op- en Ondergang eener Ster te vinden.* — De oplosſing van dit Problema op de *Hemel-Globe* is dezelvde als wy die, § 351 en 312, gegeeven hebben.

460. XXXVI PROBLEMA. *De Plaats te vinden, welke eene Ster in 't Zenith heeft, op een' gegeeven Dag en Uur.* — De oplosſing van dit Problema is op de gewoone Globen eene der moejelykſten, wyl zy de veréeniging der beide Globen vereischt; om derhalve met te meer duidelykheid de oplosſing van hetzelve hier te geeven, zullen wy ons van hetzelvde voorbeeld, 't geen wy § 353 gegeeven hebben, bedienen; wy vroegen daar: *Boven welke plaats ſtaat Arcturus, als het op den* 31 *Augustus te Amſteldam* 8 *uuren* 31′ *'s avonds is?* — Men neeme dus beide de Globen, ſtelle denzelven beide op de Poolshoogte van *Amſteldam*, brenge op de *Aard-Globe Amſteldam* aan den *Meridiaan*, en op de *Hemel-Globe* den graad der *Ecliptica*, in welken de *Zon* op dien dag ſtaat, zette den Uurwyzer op 12 uuren, en draaije de *Hemel-Globe* tot dat de Wyzer 8 uuren 31′ namiddag aanwyst; nu zoeke men op de *Hemel-Globe Arcturus*, ſchuive den *beweegbaaren Declinatie-Cirkel*, welke op de *Hemel-Globe* gevonden wordt op *Arcturus*, zie welke graad des *Equators* 'er op de *Hemel-Globe* ten 8 uuren 31′ aan den *Meridiaan* is, en trekke denzelven van de

Ascenſio recta van *Arcturus*, welke door den *Declinatie-Cirkel* wordt aangewezen, af, zo *Arcturus* ten *Oosten* van den *Meridiaan* ſtaat, of trekke de *Ascenſio recta* van *Arcturus* af van den graad des *Equators*, die aan den *Meridiaan* ſtaat, zo *Arcturus* ten *Westen* des *Meridiaans* ſtaat: hierdoor bekomt men den hoek, welken de *Declinatie-Cirkel* van *Arcturus* op dit oogenblik met den *Meridiaan* maakt; de graad des *Equators*, welke aan den *Meridiaan* is, is in ons geval de 287e graad, en *Arcturus* ſtaat ten *Westen* van den *Meridiaan*, derhalve van . . 287°
afgetrokken voor de *Ascenſio recta* van
Arcturus. . . . 211 38

rest 75° 22'

voor den hoek, welken de *Declinatie-Cirkel* van *Arcturus* op dit oogenblik met den *Meridiaan* maakt; terwyl wy tevens moeten opmerken, dat de *Declinatie-Cirkel* ten *Westen* van den *Meridiaan* ſtaat, omdat, gelyk wy boven zagen, *Arcturus* reeds door den *Meridiaan* gegaan is. — Nu moeten wy ook den *beweegbaaren Meridiaan* op de *Aard-Globe* in dezelvde *poſitie* brengen, dat is, wy moeten denzelve mede 75° 22' ten *Westen* van den *algemeenen Meridiaan* ſtellen; wy obſerveeren derhalve welke graad des *Equators* 'er op de *Aard-Globe* aan den *Meridiaan* ſtaat, of, dat hetzelvde is, welke de *Lengte van Amſteldam* zy, waarvoor wy vinden 22° 31': van dezen gevonden graad nu trekken wy af 75° 22', de grootte van den boven gevonden hoek, omdat de *Declinatie-Cirkel* ten *Westen* van den *Meridiaan* moet ſtaan; want ſtond

de

de *Declinatie-Cirkel* ten *Oosten*, dan moest hy bygeteld worden, en wy bekomen dus 307° 9' voor den graad, op welken wy den *beweeghaaren Meridiaan* onzer *Aard-Globe* moeten ſtellen; dit gedaan zynde, zoeken wy de *Declinatie* van *Arcturus*, welke nu op de *Hemel-Globe* de graad is, die door *Arcturus* zelven op den *Declinatie-Cirkel* wordt aangewezen, en deze gevonden hebbende, zoeken wy denzelvden graad op den *beweeghaaren Meridiaan* der *Aard-Globe*, wanneer de plaats der Aarde, die met dezen graad overeenkomt, de gezochte plaats zyn zal, boven welke *Arcturus* op den 31 Augustus 's avonds ten 8 uuren 31' ſtaat, 't geen dus het Noordelykſte punt van 't Eiland *St. Domingo* is, en niet, gelyk § 353, door eene druikfell, ſtaat, het *Zuidelykſte*. — Uit het boven gezegde leiden wy af: 1°. Dat wanneer eene Ster in den *Meridiaan* is van een zekere plaats, de *Declinatie-Cirkel* van die Ster *coincideert* met den *Meridiaan* der plaats. — 2°. Dat wanneer eene Ster niet in den *Meridiaan* van die plaats is, de *Declinatie-Cirkel* met den *Meridiaan* een' zekeren hoek maakt, welke altoos gelyk is met den hoek, welken twee verſchillende *Meridiaanen* der *Aard-Globe* met elkanderen maken, dat is, aan het verſchil van *Lengte* der plaats, in wier *Meridiaan* de Ster is, met de plaats, voor welke men de obſervatie doet, welk verſchil van Lengte *Oostwaart* is, wanneer de Ster nog niet door den *Meridiaan* gegaan is, en *Westwaart* zo die Ster reeds door den *Meridiaan* is gegaan; zoo ſtaat dan *Arcturus* op den 31 Aug. wanneer het te *Amſteldam* 8 uuren 31'

's avonds is, in den *Meridiaan* van eene plaats welke 75° 22' *Westwaart* van *Amſteldam* gelegen is. 3°. Dat de hoek, welken de *Declinatie-Cirkel* met de *Meridiaan* der plaats, voor welke men obſerveert, maakt, (niet in den *Meridiaan* zynde,) gelyk is aan den tyd, welke 'er nog verlopen moet, of reeds verlopen is, zedert die Ster in den *Meridiaan* geweest is; en derhalve ſtaat *Arcturus* ten 8 uuren 31' in den *Meridiaan* van eene plaats, welke 5 uuren 5' in tyd *Westwaart* van *Amſteldam* gelegen is, omdat het ten 8 uuren 31' 's avonds 5 uuren 5' geleden was, dat die Ster te *Amſteldam* in den *Meridiaan* was geweest; en hieruit leiden wy de volgende eenvouwiger oplosſing van dit *Problema* af.

461. Men zoeke 1e op de *Hemel-Globe* den tyd van den doorgang van *Arcturus* door den *Meridiaan*, op den 31ſt Augustus, waarvoor wy vinden 3 uuren 26'; deze trekken wy af van 8 uuren 31' den opgegeeven tyd, wanneer wy bekomen 5 uuren 5' voor den tyd, welke 'er verſtreken is zedert den doorgang van *Arcturus* door den *Meridiaan*; nu brenge men op de *Aard-Globe Amſteldam* aan den *Meridiaan*, zette den Uurwyzer op 12 uuren, en draaije de Globe tot dat de Uurwyzer 5 uuren 5' aanwyst: dan zullen alle plaatſen, welken op dit oogenblik onder den algemeenen *Meridiaan*, (welken wy nu als *Declinatie-Cirkel* van *Arcturus* moeten beſchouwen,) gelegen zyn, *Arcturus* in haaren *Meridiaan* hebben, en eene plaats, wier *Breedte* gelyk is aan de Declinatie van *Arcturus*, zal deze Ster in haar *Zenith* hebben.

462. Uit

t geſtelde in de vorige § kunnen
zeer gemakkelyke oplosſing van het
oblema afleiden. *Waar is het* 3 *uuren*
8 *uuren* 31′ *'s avonds te Amſteldam is?*
ie tyd op de gezochte plaats vroeger
n dan op de gegeeven plaats, ſpreekt het
ve, dat de gezochte plaats ten *Westen* van
ldam gelegen is; men trekke derhalve van
en 31′ af 3 uuren 26′, wanneer men 5 uuren 5′
rhoud, welke 5 uuren 5′ de gezochte plaats
estelyk van *Amſteldam* moet gelegen zyn: dus
rengt men op de Aard-Globe *Amſteldam* aan den
Meridiaan, ſtelt den Uurwyzer op 12 uuren, § 424,
en draait de Globe tot dat de Wyzer 5 uuren 5′
wyst, wanneer alle die plaatſen onder den *Meridiaan* zullen zyn, welken 3 uuren 26′ zullen tellen als het te *Amſteldam* 8 uuren 31′ is; had het omgekeerde plaats, werdt 'er gevraagd, *waar het* 8 *uuren* 31′ *is, als het te Amſteldam* 3 *uuren* 26′ *is?* dan zou de plaats 5 uuren 5′ *Oostwaart* van *Amſteldam* moeten gelegen zyn, men zou dan, *Amſteldam* aan den *Meridiaan* gebragt hebbende, de Globe naar de linkerhand moeten draaijen, tot 'er 5 uuren 5′ onder den Uurwyzer gepasſeerd waren, en deze dus 6 uuren 55′ aanwees, wanneer wederom alle die plaatſen onder den *Meridiaan* zouden zyn, welke 8 uuren 31′ tellen als het 3 uuren 26′ te *Amſteldam* is.

463. Over het XXXVII PROBLEMA hebben wy hier niets bytevoegen: het gezegde, § 354 en volgende, geeft daaromtrent alle nodige opheldering.

's avonds is, in den *Meridiaan* van eene plaats welke 75° 22' *Westwaart* van *Amſteldam* gelegen is. 3°. Dat de hoek, welken de *Declinatie-Cirkel* met de *Meridiaan* der plaats, voor welke men obſerveert, maakt, (niet in den *Meridiaan* zynde,) gelyk is aan den tyd, welke 'er nog verlopen moet, of reeds verlopen is, zedert die Ster in den *Meridiaan* geweest is; en derhalve ſtaat *Arcturus* ten 8 uuren 31' in den *Meridiaan* van eene plaats, welke 5 uuren 5' in tyd *Westwaart* van *Amſteldam* gelegen is, omdat het ten 8 uuren 31' 's avonds 5 uuren 5' geleden was, dat die Ster te *Amſteldam* in den *Meridiaan* was geweest; en hieruit leiden wy de volgende eenvouwiger oplosſing van dit *Problema* af.

461. Men zoeke 1e op de *Hemel-Globe* den tyd van den doorgang van *Arcturus* door den *Meridiaan*, op den 31 Augustus, waarvoor wy vinden 3 uuren 26'; deze trekken wy af van 8 uuren 31' den opgegeeven tyd, wanneer wy bekomen 5 uuren 5' voor den tyd, welke 'er verſtreken is zedert den doorgang van *Arcturus* door den *Meridiaan*; nu brenge men op de *Aard-Globe Amſteldam* aan den *Meridiaan*, zette den Uurwyzer op 12 uuren, en draaije de Globe tot dat de Uurwy-



462. Uit het geſtelde in de vorige § kunnen wy ook eene zeer gemakkelyke oplosſing van het volgende *Problema* afleiden. *Waar is het* 3 *uuren* 26′ *als het* 8 *uuren* 31′ *'s avonds te Amſteldam is?* Zodra die tyd op de gezochte plaats vroeger moet zyn dan op de gegeeven plaats, ſpreekt het van zelve, dat de gezochte plaats ten *Westen* van *Amſteldam* gelegen is; men trekke derhalve van 8 uuren 31′ af 3 uuren 26′, wanneer men 5 uuren 5′ overhoud, welke 5 uuren 5′ de gezochte plaats *Westelyk* van *Amſteldam* moet gelegen zyn: dus brengt men op de Aard-Globe *Amſteldam* aan den *Meridiaan*, ſtelt den Uurwyzer op 12 uuren, § 424, en draait de Globe tot dat de Wyzer 5 uuren 5′ wyst, wanneer alle die plaatſen onder den *Meridiaan* zullen zyn, welken 3 uuren 26′ zullen tellen als het te *Amſteldam* 8 uuren 31′ is; had het omgekeerde plaats, werdt 'er gevraagd, *waar het* 8 *uuren* 31′ *is, als het te Amſteldam* 3 *uuren* 26′ *is?* dan zou de plaats 5 uuren 5′ *Oostwaart* van *Amſteldam* moeten gelegen zyn, men zou dan, *Amſteldam* aan den *Meridiaan* gebragt hebbende, de Globe naar de linkerhand moeten draaijen, tot 'er 5 uuren 5′ onder den Uurwyzer gepasſeerd waren, en deze dus 6 uuren 55′ aanwees, wanneer wederom alle die plaatſen onder den *Meridiaan* zouden zyn, welke 8 uuren 31′ tellen als het 3 uuren 26′ te *Amſteldam* is.

463. Over het XXXVII PROBLEMA hebben wy hier niets bytevoegen: het gezegde, § 354 en volgende, geeft daaromtrent alle nodige opheldering.

464. XXXVIII PROBLEMA. *Te vinden hoe laat het is te Amſteldam, als eene der in § 355 opgegeeven Sterren in het Gezicht is der Plaats, van welke zy Correſpondent is.* — Dit *Problema* moet op eene diergelyke wyze als het XXXVI opgelost worden; men zoekt het verſchil van *Lengte* in tyd tuſſchen de plaats, welker Uurtelling men volgt, en de plaats, boven welke de Ster moet ſtaan, op de volgende wyze; men brengt *Moscow*, de plaats boven welke de Ster, volgens § 358, ſtaan moet, aan den *Meridiaan*, zet den Uurwyzer op 12 uuren, brengt *Amſteldam* aan den *Meridiaan*, en ziet welk Uur de Wyzer aanwyst (*): deze tyd (in ons geval 2 uuren 10',) zal het verſchil van *Lengte* der beide plaatſen in tyd zyn; even zoo veel nu moet de Ster van haaren doorgang door den *Meridiaan* verwyderd zyn, en daar *Moscow* Oostwaart van *Amſteldam* gelegen is, moet ook de Ster ten *Oosten* van den *Meridiaan* ſtaan; men zoeke dan nu het Uur van den doorgang van α van *Caſſiopea* door den *Meridiaan* op den 10 September, waarvoor men vindt 1 uur 16'; van dezen gevonden tyd trekt men af 2 uuren 10', zynde de tyd, welke 'er nog verlopen moest eer α van *Caſſiopea* in den *Meridiaan* van *Amſteldam* was, op het oogenblik dat zy in den *Meridiaan* van *Moscow* ſtaat, en vindt 11 uuren 5' voor den gezochten tyd.

465. XXXIX PROBLEMA. *Welke Ster ſtaat 'er bo-*

(*) Men moet wel bedacht zyn, altoos de plaats, die het meest *Oostwaart* gelegen is, het eerst aan den *Meridiaan* te brengen.

boven de Straat van Gibraltar, als het 5 uuren 35' 's avonds, op den 15 November, te Amſteldam is? — Men brengt *Amſteldam* aan den *Meridiaan*, zet de Uurwyzer op 12 uuren, brengt *Gibraltar* aan den *Meridiaan*, en ziet welk uur de Uurwyzer aanwyst, welke ons 0 uuren 41' voor het verſchil van *Lengte* der beide plaatſen aanwyst; nu brenge men op de Hemel-Globe den graad der *Ecliptica* aan den *Meridiaan*, in welken de *Zon* op den 15 November ſtaat, ſtelt den Uurwyzer op 12 uuren, en draait de Globe tot de Wyzer 5 uuren 35' namiddag aanwyst, dan zal deze ons den ſtand der Sterrebeelden, mids wy hem vooraf op de Poolshoogte van *Amſteldam* geſteld hebben, ('t geen wy altoos in deze *Problema's* onderſtellen,) aanwyzen; en nu volgt dan ook uit het te voren beredeneerde, § 460, dat eene dier Sterren op dit oogenblik in den *Meridiaan* van *Gibraltar* zyn zal, welke voor 0 uuren 41 minuten door den *Meridiaan* van *Amſteldam* gingen; derhalve van 5 uuren 35' afgetrokken zynde 0 uuren 41' bekomt men 4 uuren 54', welke 4 uuren 54', men aan den Uurwyzer brengen moet, wanneer men onder den *algemeenen Meridiaan* der Hemel-Globe alle die Sterren ziet ſtaan, welken als het te *Amſteldam* 5 uuren 35' is in den *Meridiaan* van *Gibraltar* zyn zullen, terwyl de *Breedte* van *Gibraltar*, 36° 6', ons de *Declinatie*, welke eene Ster moet hebben, die tegelyk in 't *Zenith* van *Gibraltar* moet ſtaan, geeft, waardoor wy dus vinden, even als § 359, dat de naast bykomende Ster is γ van de *Zwaan*.

466.

466. XL, XLI en XLII PROBLEMA. *Het punt des Hemels te vinden, onder hetwelk eene zekere plaats op een' gegeeven Dag en Tyd gelegen zy. — Eene Ster te vinden, welke op een' gegeeven tyd in denzelvden Verticaalen Boog met eene zekere Plaats van ons gelegen is.* — En *De Hoogte te vinden boven den Horiſon van een zeker punt des Hemels, dat met eene zekere plaats overeénkomt.* — Wy vereenigen met opzet deze drie *Problema's*, omdat wat tot verklaring derzelve te zeggen was door ons § 360 tot 365 gezegd is, en wy nu maar moeten aantoonen hoe dezelven op de Globe van ADAMS opgelost moeten worden. — Zodra wy γ van den *Zwaan*, op de by het vorige *Problema* verklaarde wyze als in den *Meridiaan* van *Gibraltar*, en naby derzelver *Zenith* ſtaande op den gegeeven tyd hebben leeren kennen, zyn wy inſtaat, daar 'er juist op deze plaats geen Ster gevonden wordt, met een potlood eene ſtip op de Globe te geeven, welke ons het juiste punt des Hemels zal aanwyzen, onder het welke op den gegeeven tyd *Gibraltar* zal gelegen zyn; zetten wy nu de *Hemel-Globe* weder op 5 uuren 35', en brengen wy den *Verticaal*, in 't *Zenith* vastge-

[redacted]

467. XLIII PROBLEMA. *Alle de plaatſen te vinden, welken op verſchillende tyden dezelvde Ster in haar Zenith hebben.* — Men zoekt de *Declinatie* der gegeeven Ster, houd een pennetje aan den *Meridiaan* der *Aard-Globe* op de gegeeven *Declinatie*, en draait de Globe rond, dan zullen alle die plaatſen onder de punt van het pennetje doorgaan, welken op verſchillende tyden deze Ster in haar *Zenith* hebben.

468. XLIV PROBLEMA. *De Aſcenſio recta en Declinatie der Zon op een' gegeeven Dag te vinden.* — Men zoekt in den Almanak den graad der *Ecliptica*, in welken de *Zon* op dien dag ſtaat, en brengt denzelven graad aan den *Meridiaan* der *Hemel-Globe*, dan zal ook tegelyk met denzelven de graad van de *Aſcenſio recta* der *Zon* aan den *Meridiaan* zyn, terwyl het getal graaden op den *Meridiaan* tuſſchen den *Equator* en *Ecliptica* de *Declinatie* der *Zon* zyn zal.

469. De oplosſing van het XLV PROBLEMA, is volmaakt dezelvde als wy die § 369 hebben opgegeeven.

470. XLVI PROBLEMA. *Den tyd te vinden van den doorgang eener Ster door den Meridiaan.* — Men brengt den graad der *Ecliptica*, in welken de *Zon* op den gegeeven Dag ſtaat, aan den *Meridiaan* der *Hemel-Globe*, zet den Uurwyzer op 12 uuren en brengt vervolgends de Ster aan den *Meridiaan*, dan zal ons de Uurwyzer den gevraagden tyd van den doorgang der gegeeven Ster door den *Meridiaan* aanwyzen; voorts kan men ook het gezegde, § 374, hier beproeven, en men zal de-

dezelvde uitkomsten ontwaaren, wanneer men maar in 't oog houd dat men op deze Globe, van de *Zon* ſprekende, altoos den graad der *Ecliptica* bedoelt, in welken de *Zon* op dien dag ſtaat.

471. Het zo even gezegde in acht nemende, zal men ook het volgende XLVII PROBLEMA, *om den tyd van den doorgang door den Meridiaan van het* 1e. *punt van Aries te vinden*, gemakkelyk kunnen oplosſen.

472. XLVIII PROBLEMA. *Te vinden hoe laat het is op zekere plaats, wanneer eene bekende Ster eene bepaalde hoogte bereikt heeft.* — Men ſtelt de *Hemel-Globe* op de Poolshoogte der plaats, brengt den graad der *Zon* voor den gegeeven dag aan den *Meridiaan*, zet den Uurwyzer op 12 uuren, ſchroeft den *Verticaal* in 't *Zenith* vast, en draait de Globe tot dat de gegeeven Ster aan den *Verticaal*, beoosten of bewesten den *Meridiaan*, den gevraagden graad van hoogte aanwyst.

473. Ten opzichte van het *vinden der Lengte eener plaats door Sterrekundige waarnemingen*, waarvan wy in het XLIX PROBLEMA ſpreken, kunnen wy hier niet meer byvoegen: het daar-

475. LII PROBLEMA. *Den afſtand te vinden tusſchen twee gegeeven plaatſen.* —— Het begin der § 387 geeft genoegzaam de oplosſing van dit *Problema*, op elke Globe, welke ook; voorts moet men de gemaakte aanmerking, § 388, ook hier in acht neemen.

476. Omtrent den *Angulus Poſitionis*, of het LIII PROBLEMA, hebben wy ook hier niets by te voegen.

477. LIV PROBLEMA. *De Rechte, Schuine en Paralelle Spheer door middel der Globen te vertoonen.* —— Wy zouden, van de Globen van ADAMS gebruik makende, by voorkeur tot de oplosſing van dit *Problema* de *Hemel-Globe* verkiezen; ſtelt men de beide Poolen van dezelve *in* den *Horiſon*, dan vertoont men by de omwenteling der Globe alle de verſchynſelen der *Rechte Spheer*; plaatst men die op eene zekere Poolshoogte, dan verkrygt men eene *Schuine Spheer*; en plaatst men eindelyk den As der Globe te lood, zoo dat de *Equator* met den *Horiſon* coincideere, dan zal men de verſchynzelen, die by eene *Paralelle Spheer* plaats hebben, gemakkelyk kunnen verklaaren: zie § 39 en volgende.

478. LV PROBLEMA. *Die twee dagen te vinden, op welken de Zon loodlynig zal zyn boven zekere Plaats, tusſchen de Keerkringen.* — Men zoeke eerst welke de *Breedte* zy der gegeeven plaats, voorts draaije men de Globe, tot dat de *Ecliptica*, die op de Globe getrokken is, dezen zelvden graad van *Breedte* op den algemeenen *Meridiaan* ſnyd, en zoekt eindelyk welke Dag in

den

den Almanak met den graad der *Ecliptica* overeenkomt. — Daar 'er nu altoos *twee* graaden der *Ecliptica* zyn zullen, welken denzelvden graad van *Breedte* ſnyden, zoo zullen 'er ook *twee* dagen des Jaars zyn, op welken de *Zon* loodlynig boven de plaats, tuſſchen de *Keerkringen* gelegen, ſtaan zal. — Voorts herleeze men hier het ſlot van § 397 en volgende.

479. LVI PROBLEMA. *Te vinden de Lengte van den kortſten en langſten Dag, op eene bepaalde Breedte.* — Daar de *langſte* dag voor alle Noordelyke Landen plaats heeft, op den 21 Juny, plaatst men de *Aard-Globe* zoo in haar' ſtoel, dat de 21 Juny van de verdeeling, welke op de achterzyde des *Meridiaans* gevonden wordt, den *Breeden rand* net ſnyde, brengt vervolgends den gegeeven graad, N. Breedte van den *eerſten Meridiaan*, welke geheel in graaden verdeeld is, aan de *Breeden rand*, ter linkerzyde des *Meridiaans*, en zet de Uurwyzer op 12 uuren, draait vervolgends de Globe tot dezelvde graad, aan de rechterhand des *Meridiaans*, den *Breeden rand* ſnyde, wanneer de Uurwyzer het Uur, 't welk de Lengte van den Dag uitdrukt, zal aanwyzen. — Vraagt men naar den *kortſten* dag voor eene gegeeven *N. Breedte*, dan moet de 21 December aan den *Breeden rand* gebragt worden; en wordt 'er van *Z. Breedte* geſproken, dan valt de *langſte* dag op den 21 December, en de *kortſte* op den 21 Juny.

480. LVII PROBLEMA. *Te vinden de Breedte van eene Plaats, alwaar de Langſte Dag van eene*

eene gegeeven lengte is; by voorbeeld van 18 uuren. — Is de plaats op eene *N. Breedte* gelegen, dan ſtelt men de Globe, dat de 21 Juny den *Breeden rand* ſnyde, brengt den *beweegbaaren Meridiaan* aan den *algemeenen Meridiaan*, zet de Uurwyzer op 12 uuren, en draait de Globe tot de Uurwyzer 9 uuren aanwyst, en ziet vervolgens welke graad van den *beweegbaaren Meridiaan* door den *Breeden rand* geſneden wordt, welke de gezochte graad van *Breedte* zyn zal.

481. LVIII PROBLEMA. *Die twee Dagen te vinden, op welken de Zon op een gegeeven Uur op eene zekere Plaats opgaat*; by voorb. te Parys ten 5 uuren. Breng *Parys* aan den *algemeenen Meridiaan*, zet den Uurwyzer op 12 uuren, en draai de Globe terug, tot dat de Uurwyzer 5 uuren voordenmiddag aanwyst; beweeg vervolgends de Globe in den ſtoel, tot dat *Parys* door den *Breeden rand* geſneden word, en dan zal de *Breede rand* juist die twee Dagen op den achterkant des *Meridiaans* ſnyden, op welken de *Zon* te *Parys* ten 5 uuren opgaat.

482. LIX PROBLEMA. *De Aſcenſio recta van 't midden des Hemels voor een' zekeren Dag en Uur te vinden.* — Hier toe behoort men eigenlyk de *Hemel-Globe* te gebruiken. — Men ſtelt de Globe op de Poolshoogte der Plaats, brengt den graad der *Ecliptica* aan den *Meridiaan*, in welken de *Zon* op dien Dag ſtaat, zet den Uurwyzer op 12 uuren, en draait de Globe, tot dat dezelve het gegeeven Uur aanwyst: dan zal ook te gelyk die graad des *Equators* aan den

Meridiaan zyn, welke voor dien tyd de *Ascenſio recta* van het midden des Hemels zyn zal.

483. LX PROBLEMA. *Te vinden hoe laat het is te Parys, wanneer men op den 9 September de hoogte der Zon aldaar voormiddag heeft waargenomen te zyn* 30 *graaden.* — Ook dit Problema behoort tot de *Hemel-Globe.* —— Men plaatst ten dien einde de Globe op de Poolshoogte van *Parys*, draait de Globe tot dat de graad der *Ecliptica*, in welke de *Zon* op den 9 September ſtaat, aan den *Meridiaan* is, zet den Uurwyzer op 12 Uuren, ſchroeft den *Verticaal* in 't *Zenith* vast, en draait de Globe terug tot dat de reeds gemelde graad der *Ecliptica* den 30e. graad op den *Verticaal* ſnyd, wanneer de Uurwyzer 9 uuren 15' voor het gezochte uur zal aanwyzen.

484. LXI PROBLEMA. *Den Tyd te vinden, dat de Zon een zeker Azimuth moet hebben, op een' gegeeven Dag en Plaats.* —— De Globe op de Poolshoogte der Plaats, en den Uurwyzer voor den gegeeven Dag geſteld hebbende, beweegt men de Globe en *Verticaal*, die in 't *Zenith* moet vastgeſchroefd zyn, tot dat, de graad der *Ecliptica*, in welken de *Zon* dien Dag ſtaat, den *Verticaal* ſnydende, deze laatſte op den *Breeden rand*, welke nu *Horiſon* is, den gegeeven graad van het *Azimuth* aanwyze.

485. LXII PROBLEMA. *De Declinatie der Zon gegeeven zynde te zyn* 15° *Noordelyk, te vinden de Lengte der Zon in de Ecliptica, en den Dag van 't Jaar.* — Men draait de Globe, tot dat de *Ecliptica* den 15e graad *N. Declinatie* op den

Me-

Meridiaan ſnyde, en de graad der *Ecliptica*, welke met denzelven overeenkomt, zal tegelyk aan den *Meridiaan* zyn, terwyl men den voor denzelven overeenkomſtigen Dag in den Almanak vindt, in 't oog houdende of de gegeeven Dag vóór of na den 21 Juny zyn moet.

486. Omtrent het LXIII PROBLEMA hebben wy niets nader aantemerken.

487. De oplosſing van het LXIV PROBLEMA is even dezelve als § 412.

488. De ſtand der *Ecliptica* boven onzen *Horiſon* wordt even op dezelvde wyze gevonden, als wy § 414, gezegd hebben, in 't oog houdende dat men hier den graad der *Ecliptica*, in denwelken de *Zon* op den gegeeven Dag ſtaat, aan den *Meridiaan* moet brengen om den Uurwyzer te regelen, en alzoo wordt het LXV PROBLEMA opgelost.

489. LXVI PROBLEMA. *Wanneer men 's avonds eene of andere heldere Ster aan den Sterrenhemel ziet ſchitteren, door middel der (Hemel) Globe te vinden, tot welk geſternte deze behoort.* — Men plaatst de Globe voor de Plaats, den Dag en het Uur, ſchroeft den *Verticaal* in het *Zenith* vast, ſtelt denzelven op 't *Azimuth* der Ster, en zoekt welke der op de Hemel-Globe afgeteekende Sterren met den gegeeven graad van *hoogte* overeenkomt.

490. Over het LXVII PROBLEMA hebben wy hier ook niets naders te zeggen; het geen wy daar van te voren gezegd hebben, § 417, voldoet ook hier; en wat het vinden van den tyd des

doorgangs der *Maan* door den *Meridiaan* betreft, dit is reeds uit het gezegde, § 454, duidelyk, terwyl uit het geen over het verſchil van Uurtelling, § 424 en volg., gezegd is, men het verſchil van tyd op deze Globe moet afleiden, dat de *Maan* te *Archangel* eerder door den *Meridiaan* gaat dan te *Amſteldam*.

491. LXVIII PROBLEMA. *Te toonen het groote nut, dat de Bewooners der Noorder-Poollanden van de Maan trekken kunnen.* —— Wanneer men de Hemel-Globe ſtelt op eene Poolshoogte van 70 a 75 graaden, en de Lengte der *Zon*, even als in § 420, veronderſtelt te zyn 9 Teekens, en dus het 1e. punt van *Capricornius* aan den *Meridiaan* brengt, 't welk in dit geval onder den *Horiſon* zal zyn, en, de Globe nu ſtil laatende ſtaan, acht geeft op den ſtand der *Ecliptica* boven den *Horiſon*, dan ziet men, dat dezelve op 40 graaden afſtands van het 1e. punt van *Capricornius* reeds aan den *Horiſon* komt; en, by het ronddraaijen der Globe, dat de *Maan*, eenen afſtand van 40 graaden van de *Zon* bereikt hebbende, reeds boven den *Horiſon* komt, en dus opgaat, wanneer zy 3 dagen oud is, op 90°



by 't rond draaijen der Globe in 't geheel niet onder den *Horiſon* daalen, en verkrygen dus dezelvde *Concluſie* als § 420.

492. LXIX PROBLEMA. *Uuren en Minuten tyds te brengen tot Graaden en Minuten van den Equator; of Graaden en Minuten van den Equator te brengen tot Uuren en Minuten tyds.* —— Dit kan men mede zeer gemakkelyk door middel dezer Globe doen, wyl de *Equator* derzelve, zoo wel de verdeeling in *Graaden* als in *Uuren* bevat, en dus de overbrenging zeer gemakkelyk en even dezelve is, als wy, § 421, getoond hebben; met dit al moet men hierby in 't oog houden, dat de verdeelingen in *graaden* en die in *uuren* op den *Equator* onzer nieuwe Aard-Globe niet van het zelve punt beginnen, en men dus de XII van de verdeeling der uuren aan den *Meridiaan* moet brengen, en op de 360° den Uurwyzer ſtellen; wil men dan *Uuren* in *Graaden* veranderen, dan heeft men maar het gegeeven *Uur* aan den *Meridiaan* te brengen, en de gezochte en daar mede overeenkomende *graad* zal door den Uurwyzer aangewezen worden; en moet men *Graaden* in *Uuren* veranderen, dan brenge men den gegeeven *Graad* onder den Uurwyzer, en het gezochte *Uur* zal aan den *Meridiaan* zyn.

III. HOOFDSTUK.

GEBRUIK DER SPHÆRA ARMILLARIS.

§ 493. De kennis van het Gebruik der *Sphæra Armillaris* rust veelal op het gebruik der Globe zelve; ondertusſchen daar de *Spheer* meestal ingericht is, om den betrekkelyken ſtand van de Cirkels, van dewelken men zich in de *Sterrekunde* bedient, te leeren kennen, en het in dezelve geplaatſte *Aard-Globetje* doorgaans klein is, kan dezelve niet van een zoo uitgeſtrekt gebruik als de Globe zyn; doorgaands gebruikt men dezelve om eenige *algemeene* Problemas met dezelve optelosſen, als daar zyn het *Op-* en *Ondergaan* der *Zon* en *Maan*, de *verwisſeling* der *Saiſoenen*, het *langen en korten der dagen*, enz.

494. Wy hebben, § 261—266, twee verſchillende ſoorten van Spheeren beſchreven, welken op Plaat XI, Fig. 46 en 47, worden afgebeeld: die, welke Fig. 46, is afgebeeld, is geſchikt om de *waare beweging der Aarde* aftebeelden, en die in Fig. 47, om de *ſchynbaare beweging des Hemels* ons te vertoonen; de in Fig. 46, afgebeelde Spheer, welke ingericht is naar de *waare* beweging, heeft dezelve inrichting als onze *nieuw geconſtrueerde Aard-Globe*, alleenlyk zyn de beide *Keerkringen* en *Poolcirkels* aan dezelve bygevoegd,

en

en de *Horiſon*, welke op onze *Aard-Globe* maar een *Cirkel* is, word hier door eene *vlakke koperen Plaat* verbeeld, welke het Aardbolletje omgeeft, em om hetzelve beweegbaar is; deze koperen Plaat verbeeld ons dus hoe het vlak van onzen *Horiſon* zich tot de vaste Sterren, of den voor ons zigtbaaren hollen kloot des Hemels, welke door de Cirkels der Spheer verbeeld wordt, uitſtrekt, by het ronddraaijen der Aarde verſchillende gedeelten van den Sterrenhemel ſnyd, en voor ons doet *zigtbaar* of *onzigtbaar* worden, (doet *opgaan* of *ondergaan*); draait men dus het Aardglobetje, door middel van het knopje G, om, dan ziet men dezen verwisſelenden ſtand des *Horiſons* zeer duidelyk.

495. Wil men den tyd van den *Op-* of *Ondergang* der *Zon*, by voorbeeld, door middel dezer Spheer zoeken, dan plaatst men den *Horiſon* op de *Breedte* der Plaats, 't geen men doet door middel van een' halven Cirkel, welke in graaden verdeeld, en aan den *Horiſon* vastgeklonken is; deze $\frac{1}{2}$ Cirkel verbeeld den *Meridiaan*, en wanneer men dus den graad van dezen *Meridiaan* aan de N. Pool brengt, welke gelyk is aan den graad van *Breedte* der Plaats, zoo komt die plaats in 't *Zenith* van den *Horiſon*, en de *Horiſon* is geſteld op de Poolshoogte der Plaats; dit gedaan hebbende, ſtelt men de *Artificieele Zon*, op den graad der *Ecliptica*, in welken de *Zon* dien dag ſtaat, draait de Globe tot dat de *Zon* aan den *Meridiaan* zy, dat is tot dat eene rechte lyn van

de *Artificieele Zon*, tot het middenpunt van het *Aard-Globetje* getrokken, den *Meridiaan* (de ½ Cirkel van welke wy zoo even ſpraken) ſnydt, plaatst den Uurwyzer op 12 uuren, en brengt vervolgends de *Zon* aan den *Ooster-Horiſon*, dat is, draait de *Aard-Globe* tot dat de *Artificieele Zon* het gedeelte des *Horiſons* ſnyde, alwaar *Oost* gegraveerd ſtaat; dan zal de Uurwyzer het uur van den *Opgang* der *Zon* aantoonen, even gelyk hy het uur van den *Ondergang* der *Zon* zal aanwyzen, wanneer men de *Zon* aan den *Wester Horiſon* brengt.

496. Om den *Op-* of *Ondergang* der *Maan* op deze *Spheer* te vinden, gaat men op dezelvde wyze te werk, ſtelt eerst den *Horiſon* op de Poolshoogte der Plaats, en den Uurwyzer gelyk met den dag, en brengt vervolgends het *Maantje*, 't welk eerst op den graad der *Ecliptica* geſteld moet worden, in denwelken de Maan dien dag is, aan den *Ooster* of *Wester Horiſon*, om den *Op-* of *Ondergang* der *Maan* te vinden.

497. Wil men deze *Spheer* als een *Tellurium* gebruiken, dan plaatſe men dezelve, gelyk wy § 445, gezegd hebben, op eene Tafel, in 't midden van dewelke men eene Kaars geſteld heeft, en bewege de *Spheer* rondom dezelve, zoo, dat de As F G der Aarde beſtendig naar het zelvde punt gericht blyft, en men zal op die wyze het zelvde nut als van de Globe 'er van kunnen trekken, terwyl men om de affcheiding van het verlichte en duistere gedeelte der Aarde naauw-

keu-

keuriger te bepaalen, zich van den *Horiſon* kan bedienen, wanneer men denzelven perpendiculair met den vinger vast houd, en de Globe by het knopje G in denzelven doet omdraaijen, alle de landen der Aarde beurtelings in het licht en in de ſchaduw doet treeden, en door middel des Uurwyzers het verſchil van de lengte der dagen, in 't algemeen kan aanwyzen; ten opzichte van de plaatzing des *Horiſons* in dit geval, moeten wy nog aanmerken, dat wanneer men denzelven in het vlak van den Cirkel AFCMA, welke de *Colure der Zonneſtanden* is, houdt, men den ſtand des *Breedte-Cirkels* voor de beide dagen der *Nachteveningen* vertoont, § 308, en dus gemakkelyk aantoonen kan dat Dag en Nacht op deze beide Dagen over de geheele Aarde even lang zyn; terwyl men, den *Horiſon* met het vlak van de *Colure der Zonneſtanden* in een rechten hoek plaatſende, den ſtand des *Breedte-Cirkels* voor de beide Dagen der *Zonneſtanden* heeft, § 444, en ziet hoe, de *Zon* geſteld zynde in ♋ te ſtaan, de N. Pool beſtendig Dag en de Zuid-Pool beſtendig Nacht heeft; gelyk men op deze wyze, het gezegde, § 300, in acht nemende, voor elken Dag de verlichting der *Aarde* door de *Zon* vertoonen kan.

498. De *Spheer*, welke geſchikt is voor de *ſchynbaare beweging des Hemels*, en welke Fig. 47, wordt afgebeeld, wordt op dezelvde wyze als de *Hemel-Globe* gebruikt; om dezelve dus op de Poolshoogte van eene zekere plaats te ſtellen, beweegt men die zoodanig in deszelfs ſtoel, PSR,

dat de graad van de *Breedte der Plaats* de *Horiſon* PSR in P ſnyde, en dus de boog OP gelyk zy aan de *Breedte der Plaats*; nu draaije men het *Aard-Globetje* dat de plaats juist boven kome, zoo dat eene lyn van het *Zenith* der *Spheer*, door derzelver *Centrum* getrokken, die plaats juist ſnyde, ſtelt den *Horiſon*, (de vlakke koperen Plaat,) die de Globe omringt volgens, § 495, mede op de Poolshoogte der plaats, en deze valt nu in 't zelfde vlak met den *Horiſon* PSR; en nu de *Spheer* omdraaijende, terwyl het *Aard-Globetje* met deszelfs *Horiſon* blyft ſtaan, geeft ons dit het duidelykſte denkbeeld van de Conſtructie der *Hemel-Globe*; de *Spheer zelve* verbeeld de *Hemel-Globe*, het *Aard-Globetje*, met deszelfs *Horiſon*, de binnen in de *Hemel-Globe* veronderſtelde *Aard-Globe*, en wy zien nu hoe de *Horiſon* PSR, die de *Spheer*, gelyk ook de *Hemel-Globe*, omringt, wezenlyk in 't zelvde vlak valt met den *Horiſon* der *Aard-Globe*, die men zich altoos moet voorſtellen binnen in denzelven geplaatst te zyn; gelyk ook de *algemeene Meridiaan*, ORQPO, in welken de *Spheer* zich beweegt, in 't zelvde vlak valt met den *beweegbaaren Meridiaan*, die de *Aard-Globe* onmiddelyk omringt, § 205.

499. Gebruiken wy nu beiden de *Spheeren*, om het zelvde Voorſtel optelosſen, dan zien wy hoe *ſchynbaare* en *waare* beweging, hoewel een verſchillende werking veronderſtellende, echter dezelvde uitkomst geeven, en het gebruik van eenen *beweegbaaren Horiſon*, die veel gemaks verſchaft,

zal

zal ons gemakkelyker en bevatbaarder worden, daar wy zien dat de uitkomſten door denzelven voortgebragt dezelvde zyn, als of wy een' vasten *Horiſon*, die altoos zynen waterpaſen ſtand behoud, gebruikten.

IV. HOOFDSTUK.

DE TOEPASSING VAN DE KLOOTSCHE DRIEHOEKSMETING OP DE STERREKUNDE GEMAKKELYK GEMAAKT, DOOR HET GEBRUIK DER GLOBEN.

§ 500. Zoo draſmen in het vak der Sterrekunde zyne oefeningen verder wil voortzetten, is men verpligt tot de berekeningen zyne toevlugt te nemen; van alle Sterrekundige Voorſtellen, welken men met eenigen graad van naauwkeurigheid wil oplosſen, moeten de uitkomſten door berekening gevonden worden, daar geene Globe naauwkeurig genoeg kan gerekend worden, om als dan voldoende te zyn: het is voornamelyk de *Klootſche Driehoeksmeting*, welke ons hiertoe de hand moet leenen; deze te kennen is dus noodzakelyk voor elk, die eenige verdere vorderingen in deze verheven wetenſchap maken wil; dan, dezelve kennende, moet men die ook op de *Sterrekunde* weeten toetepaſſen, dat is, men moet weeten welke *hoeken* en Cir-

Cirkels men gebruiken moet om het algemeene voorſtel der *klootſche driehoekmeting* op het meer byzondere *Sterrekundige voorſtel* toetepaſſen, door welke *Cirkels* dezelve gevormd wordt, enz.

501. Het is hierin dat ons de Globe van zeer veel nut kan zyn; want, inderdaad, alle de oplosſingen op de Globe zyn oplosſingen van *klootſche Driehoeken*, en wy willen dus in dit HOOFDSTUK, door de herhaling en ontwikkeling van eenige der te voren opgegeeven *Problema's*, eenige Handleiding geeven, hoe de *klootſche driehoekmeting* op de *Sterrekunde* toetepaſſen. Wy hebben, § 13 en volgende, reeds eenige algemeene denkbeelden van de *klootſche Driehoeken* gegeeven, welken te herleezen alhier van nut kan zyn. — Voorts onderſtellen wy nu, in dit *Hoofdſtuk*, dat men zoo veel kundigheid hebbe in het gebruik der Globen, naar welke wyze dan ook ingericht, dat men de ten voorbeelde optegeeven *Voorſtellen* op de Globe weete optelosſen, en dezelve daartoe weete te ſtellen.

I. VOORSTEL.

Den tyd te vinden van de Opgang en Ondergang van eenig Hemellicht, op eene gegeeven Breedte.

502. Wy maken met opzet dit Voorſtel zoo algemeen mogelyk om het op alle Hemelſche Ligchaamen te kunnen toepaſſen. — Wanneer men de Globe, volgends de § 294 of 433, op de Poolshoogte

hoogte der Plaats geſteld, en het Hemellicht aan den *Horiſon* gebragt heeft, ſchroeve men den *Verticaal* in 't *Zenith* vast, en brenge den *Declinatie-Cirkel* op de Ster, en den *Verticaal* mede op de Ster; dan maken deze beide met den *Meridiaan* een' driehoek P Z S, Fig. 48, welke de driehoek is, dien men voor dit geval moet oplosſen; de zyde Z S van denzelven is gelyk 90°, want de afſtand van een Hemellicht tot het *Zenith* is by derzelver *Op-* of *Ondergang* = 90°: dit behoeft geen betoog; de zyde P S is gelyk de afſtand van het Hemellicht tot de *Pool*, die boven den *Horiſon* verheven is; is de *Declinatie* van het Hemellicht *Noordelyk*, en de *Breedte* ook *Noordelyk*, dan is de zyde P S gelyk het *Compliment der Declinatie*, en dus *Scherp*; doch is de *Declinatie Zuidelyk*, en de *Breedte* der plaats *Noordelyk*, dan is de zyde P S gelyk 90° *plus* de *Declinatie*, en dus *Stomp*; en de zyde P Z is de afſtand van de *Pool* tot het *Zenith*, en dus gelyk aan 't *Compliment* der *Breedte*, derhalve altyd *Scherp*; wy hebben dus in den driehoek P Z S alle de drie zyde bekend, en moeten de hoegrootheid van den hoek S P Z zoeken; want, daar de *Declinatie-Cirkel* P S met den *Meridiaan* P Z coincideert als het Hemellicht S in den *Meridiaan* is, en de tyd van den *Opgang* van een Hemellicht afhangt van den tyd, welke 'er verloopt tusſchen deszelfs *Opgang* en doorgang door den *Meridiaan* zoo hangt deze dus af van de hoegrootheid van den hoek S P Z: hoe grooter deze hoek is, hoe verder het Hemellicht van den *Meridiaan* verwyderd

derd is, en deze hoek is altoos de grootſte wanneer het Hemellicht in den *Horiſon* ſtaat, omdat de zyde ZS beſtendig gelyk 90° is. — Deze hoek nu is *ſtomp*, wanneer de zyde PS *ſcherp* is, dat is, wanneer de *Declinatie Noordelyk* (voor onze Noordelyke gewesten) is; zy is *recht* als de zyde PS *recht* is, dat is, wanneer het Hemellicht geen *Declinatie* heeft, en *ſcherp* wanneer de zyde PS *ſtomp* is, dat is wanneer de *Declinatie Zuidelyk* is; deze hoek nu word werkelyk opgelost by het oplosſen van dit Problema op de Globe: kent men denzelven dan brengt men dien in tyd over, trekt hem van den tyd des *doorgangs door den Meridiaan* af, om den *Opgang*, of telt hem daarby op, om den *Ondergang* van een Hemellicht te vinden. — Deze hoek SPZ, wordt *Uurhoek* genaamt, en is gelyk aan de $\frac{1}{2}$ *Dagboog* van het Hemellicht, § 30.

II. VOORSTEL.

De Amplitudo van eenig Hemellicht te vinden.

503. Tot de oplosſing van dit *Problema* wordt



gelyk aan het *Complement* van dezen hoek; is deze hoek *recht*, dan is de *Amplitudo* 0, want dan gaat het Hemellicht net in 't *Oosten* op, of in 't *Westen* onder; is eindelyk deze hoek *ſtomp*, dan is de *Amplitudo* gelyk aan dezen hoek *minus* 90°, dat is, gelyk aan het *ſupplement* van dezen hoek.

III. VOORSTEL.

Te vinden *welke de Lengte zy eener plaats op eene gegeeven Breedte, op welke de Zon op eer' zekeren Dag te gelyk opgaat met eene andere plaats op eene gegeeven Lengte en Breedte gelegen.*

By voorbeeld: Op welke Lengte op de Paralel van 40° gaat de Zon op den 5 May te gelyk op als te *Amſteldam*?

504. Men ſtelt hier toe de Globe, even als voor het XIV Problema, in het Ie. en II. Hooſdſtuk van dit Boek, en brengt den Declinatie-Cirkel aan de *Artificieele Zon*, dat is, ſtelt denzelven op de *Aſcenſio recta der Zon*, indien de N. Pool buiten het verlichte gedeelte der Aarde gelegen is, of op de *Aſcenſio recta der Zon plus* 180° zo de Pool binnen het verlichte deel gelegen is, zo men namelyk van onze nieuwe Conſtructie der Globe gebruik maakt; dan, indien men van die van ADAMS gebruik maakt, is de *algemeene Meridiaan* in dit geval *Declinatie-Cirkel*, dan heeft

men

men twee Driehoeken: PBD, Fig. 49. welke gevormd wordt door den *Meridiaan* PD der plaats D op 40° *Breedte* gelegen, door BP of den *Declinatie-Cirkel* der *Zon* voor dien dag, en door de boog BD, welke de *Breedte-Cirkel is*; en de Driehoek BCP, gevormd door den *Meridiaan* van *Amſteldam* PC, (want P is de Noord-Pool,) door den *Declinatie-Cirkel* PB, en door den *Breedte-Cirkel* BC; — in den *eerſten* Driehoek is bekend de hoek PBD, welke recht is, de zyde PB, gelyk aan de *Declinatie der Zon*, en PD, gelyk aan 't *Compliment van de Breedte* der plaats D, in ons voorbeeld gelyk 50°, en de hoek, welke gegeeven is, is de hoek BPD, welken men weder op den *Equator* der Globe meten kan. — In den tweeden Driehoek is bekend BP, die aan beide de Driehoeken gemeen is, PC, gelyk aan 't *Compliment der Breedte* van *Amſteldam*, en de hoek PBC *recht*, de gegeeven hoek is de hoek BPC.— Hebbende nu den hoek BPD en den hoek BPC bekend, kan men den hoek CPD in den Driehoek CPD gemakkelyk vinden; want deze is gelyk aan den hoek BPD, *min* den hoek BPC, en het is juist deze hoek CPD, welken wy zoeken, het verſchil namelyk der *Lengte* van de beide plaatſen; voorts moet men hier opmerken, dat, zo de Pool P in het verlichte gedeelte der Aarde gelegen is, dat is, zo de *Declinatie der Zon Noordelyk* is, de Plaats D ten *Oosten* van de Plaats C gelegen is, doch zo de *Declinatie Zuidelyk* is, is de Plaats D ten *Westen* van de Plaats C gelegen. — De beſchouwing der Globe zelve zal dit duidelyker maaken.

IV. VOOR-

IV. VOORSTEL.

De Breedte der Plaats — de Declinatie der Zon — en de Hoogte der Zon gegeeven zynde — te vinden *het Uur van den Dag.*

505. Ten einde den driehoek te leeren kennen, welken men, om dit *Voorſtel* optelosſen, nodig heeft, ſtelt men de Globe even als voor het XXIII Problema, § 323 en volgende, doch brengt daarenboven ook den *Declinatie-Cirkel* op den graad der *Zon* voor den gegeeven Dag: dan heeft men den driehoek PZS, Fig. 48, welke gemaakt wordt door den *Meridiaan* der Plaats PZ, den *Declinatie-Cirkel* der *Zon* PS, en den *Verticaal* ZS; de zyde PZ is dus weder gelyk aan het *Compliment van de Breedte* der Plaats; PS is gelyk aan het *Compliment van de Declinatie* der *Zon* of aan den *afſtand der Zon van de Pool*, en de zyde ZS *gelyk aan 't Compliment van de hoogte der Zon* of *aan den afſtand der Zon van 't Zenith;* de zyde PS is *ſcherp*, wanneer de *Declinatie der Zon Noordelyk* is, en *ſtomp*, wanneer die *Declinatie Zuidelyk is*, en de zyde ZS is altyd *ſcherp;* de drie zyden van dezen driehoek zyn dus bekend; de hoek, welke hier gezocht moet worden, is de Uurhoek SPZ: deze kan nooit *ſtomp* zyn, wanneer de zyde PS *ſtomp* is, dat is wanneer de *Declinatie der Zon Zuidelyk* is, omdat de *Zon* dan nooit tuſſchen 't *Noorden* en *Oosten*, of tuſſchen 't *Noorden* en *Westen* ſtaan kan; doch wanneer de zyde PS

ſcherp is, kan de Uurhoek SPZ *ſcherp* of *ſtomp* zyn: men moet dit alsdan uit de omſtandigheden weeten optemaken, en zo al niet, dan moet men ook den hoek SZP berekenen; zal de hoek SPZ *ſtomp* zyn, dan moet de hoek SZP *ſcherp* zyn; deze kan ondertusſchen niet *ſcherp* zyn, wanneer de *Zon* eene groote hoogte bereikt heeft, wyl ze dan te naby den *Meridiaan* ſtaat; doch is de hoek SZP *ſtomp*, dan is ook de hoek SPZ zeer zeker *ſcherp*; heeft men dezen hoek gevonden, dan trekt men denzelven, zodra men de *graaden*, die dezelve bevat, in *uuren* veranderd heeft, van 12 uuren af, zo het *voordenmiddag* is, om het Uur van den Dag te vinden; is de hoogte der *Zon* nadenmiddag gemeten, dan geeft de hoegrootheid van dezen hoek het Uur zelven.

506. Voor de *vaste Sterren* kan dit *Voorſtel* mede dienen; alleen moet men dan maar het Uur van den *doorgang der Ster door den Meridiaan* zoeken, om den tyd daarnaar te kunnen berekenen, dat is, men moet de grootheid van den hoek SPZ, in tyd veranderd, by den tyd van den doorgang der Ster door den Meridiaan *bytellen*, indien die Ster reeds door den Meridiaan gegaan is, of van denzelven *aftrekken*, indien die Ster nog niet door den Meridiaan gegaan is.

V. VOORSTEL.

Gegeeven zynde: *De Breedte der Plaats* — *de Declinatie der Zon* — *en derzelver Azimuth* — te vinden *het Uur van den Dag.*

507. De oplosſing van dit Voorſtel rust op de oplosſing van denzelvden Driehoek, waarvan wy in het even voorgaande Voorſtel geſproken hebben; alleenlyk wordt nu de hoek PZS, welke de hoek van het Azimuth is, als bekend verondersteld, daar de zyde ZS onbekend is, en men moet denzelvden hoek SPZ als in het vorige *Voorſtel* zoeken; wy hebben dus hier niets meer by te voegen, daar het uit het te voren gezegde genoegzaam blykt, hoe men dezen Driehoek op de Globe vinden kan.

VI. VOORSTEL.

De Declinatie en Aſcenſio recta der Zon gegeeven zynde, *derzelver Lengte* te vinden.

508. Hiertoe heeft men den Driehoek ABC, Fig. 50, optelosſen: in denzelven is AB de *Equator*, gelyk aan den afſtand der *Zon* tot het naaste Nachteveningspunt; BC een *Declinatie-Cirkel*, gelyk de gegeeven *Declinatie*; de hoek ABC *recht*; en de zyde AC de *Ecliptica*, de gezochte zyde; deze zyde gevonden hebbende,

kent men den afſtand der *Zon* van het naaſte *Nachtevening ſpunt* op de *Ecliptica*, en dus derzelver *Lengte*. — Men kan ook op dezelvde wyze, wanneer men den graad des *Equators* kent, die in den *Meridiaan* ſtaat, den graad der *Ecliptica* vinden, die in den *Meridiaan* tegelyk met denzelven ſtaat; want in dat geval is BC de *Meridiaan*. — Was dit Voorſtel omgekeerd, de *Lengte* gegeeven en werd de *Declinatie* en *Aſcenſio recta* gezocht, dan moest men gebruik maaken van den hoek CAB, die gelyk $23\frac{1}{2}^{\circ}$ is, en men heeft dan weder drie bekende, één zyde AC, en twee hoeken CAB en CBA, welke laatſte altoos *recht* is.

VII. VOORSTEL.

Ten allen tyde den hoek te vinden, welken de Ecliptica met den Meridiaan maakt.

509. Hiertoe zoekt men eerst den graad des *Equators*, welke op het gegeeven tydſtip in den *Meridiaan* is, § 406, 482 (*), vervolgends den graad

(*) Wil men dezen graad door berekening vinden, dan gaa men op de volgende wyze te werk: Men zoekt de *Aſcenſio recta* der *Zon* voor den gegeeven dag, trekke dezelve af van 360°, verandere dit overſchot in tyd, 't welk het uur van den doorgang van het 1e. punt van *Aries* door den *Meridiaan* zal zyn; voorts trekke men dit uur af van het gegeeven uur, wanneer het gegeeven uur *laater* is, en dit overſchot wederom in graaden veranderd zynde, zal deze de graad zyn, die in den *Meridiaan* ſtaat; dan zo het gegeeven Uur *vroeger* is dan de *doorgang* van het 1e. punt van *Aries* door den *Meridiaan*, moet het

graad der *Ecliptica*, die met denzelven overeenkomt, §508, en lost daarna den Driehoek PZS, Fig. 48, op: in dezen Driehoek is P de Pool der *Waereld*, Z de Pool der *Ecliptica*, en S de graad der *Ecliptica*, die in den *Meridiaan* ſtaat; PZ is de *colure der Zonneſtanden*, en dus is PZ gelyk aan de afſtanden der beide Poolen, gelyk 23½°; PS is de *Meridiaan*, en dus gelyk aan den afſtand van den gevonden graad der *Ecliptica* van de Pool, gelyk het *Compliment der Declinatie*, zo die *Noordelyk* is, en dus in dit geval *ſcherp*; of gelyk aan 90° *plus* de *Declinatie*, zo die *Zuidelyk* is, en dus in dat geval *ſtomp*; terwyl ZS een *Breedte Cirkel* is, gelyk 90°; de hoek, welke gezocht moet worden, is den hoek ZSP, welke de *Breedte Cirkel* met den *Meridiaan* maakt; deze bekend hebbende, kent men ook den hoek, dien de *Ecliptica* met den *Meridiaan* maakt, want laat AB, Fig. 48, de *Ecliptica* zyn, dan is de hoek PSA, dien de *Ecliptica* met den *Meridiaan* maakt, gelyk de hoek ZSA *minus* den hoek ZSP; nu is de hoek ZSA *recht*, en dus is de hoek PSA gelyk het *Compliment* van de hoek ZSP; deze hoek nu, welken de *Ecliptica* met den *Meri-*

het gegeeven uur van den doorgang van *Aries* afgetrokken worden, en het overſchot in graaden veranderd worden, welke gevonden graad dan niet de *Aſcenſio recta* van het midden des Hemels zelven is, maar het *ſupplement* daarvan, (en men moet denzelven dus van 360° aftrekken;) wanneer men egter door deze berekening voor den doorgang van *Aries* meer dan 12 uuren in tyd verkrygt, moet men de *Aſcenſio recta* der *Zon* voor den voorgaanden Dag neemen, omdat hier uit blykt, dat het 1e. punt van *Aries* na middernacht door den *Meridiaan* ſtaat.)

Meridiaan maakt, is *ſcherp* aan de *Oostzyde* des *Meridiaans*, en *ſtomp* aan deszelfs *Westzyde*, wanneer een der *klimmende Teekens* in den *Meridiaan* is; doch *ſtomp* aan de *Oostzyde* en *ſcherp* aan de *Westzyde*, wanneer een der *daalende Teekens* aan den *Meridiaan* is; is de hoek, dien de *Ecliptica* met den *Meridiaan* maakt, *ſcherp*, dan is het de hoek PSA, dien men zoekt; doch is hy *ſtomp*, dan is het den hoek PSB, dien men eigenlyk zoekt.

VIII. VOORSTEL.

Gegeeven zynde: *De Breedte der Plaats, — de Declinatie en Ascenſio recta eener Ster* — te vinden, *welke graad van de Ecliptica tegelyk met dezelve aan den Horiſon is.*

510. Dit Voorſtel kan men niet door eenen enkelen Driehoek oplosſen: wy moeten hiertoe *eerst* weeten welke graad des *Equators* 'er aan den *Meridiaan* is, als de gegeeven Ster aan den *Horiſon* is, en dezen gevonden hebbende, vervolgende den graad der *Ecliptica* zoeken, welke 'er aan den *Horiſon* is, als de gevonden graad des *Equators* aan den *Meridiaan* is, het maakt hier egter een verſchil in ſommige gevallen of men vraagt naar den graad der *Ecliptica*, welke tegelyk met de Ster aan den *Oester* of *Wester Horiſon* is, dan of men vraagt naar den graad der *Ecliptica*, welke, wanneer de Ster aan den *Oester Horiſon* is, te gelyk aan den *Wester Horiſon* is, of omgekeerd; wy zullen dus van beiden een voorbeeld geeven.

511.

511. I. *Voorbeeld:* geſteld dat 'er gevraagd wordt naar den graad der *Ecliptica*, welke te gelyk met een zekere Ster aan den *Ooster* of *Wester Horiſon* is? Dan heeft men eerst in den Driehoek PZS, Fig. 48, PZ gelyk het *Compliment van de Breedte* der Plaats, PS gelyk de *affſtand der Ster van de* (boven den Horiſon verheven) *Pool*, en ZS gelyk 90°, waarvan men moet zoeken den hoek ZPS; dezen gevonden hebbende, en van de *Aſcenſio recta* der Ster afgetrokken zynde, verkrygt men den graad des *Equators* die aan den *Meridiaan* is, indien de Ster aan den *Ooster Horiſon* verondersteld wordt te ſtaan; of indien de Ster aan den *Wester Horiſon* ſtaat, moet de hoek ZPS by de *Aſcenſio recta* der Ster bygeteld worden, om den graad van den *Equator* te verkrygen, die in den *Meridiaan* ſtaat; deze gevonden zynde, heeft men weder zes verſchillende gevallen, welken acht verſchillende driehoeken ter oploſing geven.

1e. Kan het gebeuren, dat het naaste Nachteveningspunt, dat is het Nachteveningspunt, 't welk het naast aan de Ster ſtaat, het Nachteveningspunt van de *Lente* of het Nachteveningspunt van ♈ zy.

2e. Kan het zyn, dat het naaste Nachteveningspunt het Nachteveningspunt van de *Herfſt* of van ♎ zy.

Voor het eerſte geval is Fig. 53 en 54 geſchikt.

Voor het tweede geval is Fig. 51 en 52 geſchikt.

3e. Kan het zyn, dat, het Nachteveningspunt van ♈ het naaste zynde, dit Nachteveningspunt

aan dezelvde zyde des *Meridiaans* met de Ster zy, dat is ten *Oosten* van denzelven, wanneer de Ster aan den *Ooster Horiſon* ſtaat, wanneer men den Driehoek ABC, Fig. 54, of ten *Westen*, als de Ster aan den *Wester Horiſon* ſtaat, wanneer men den Driehoek AGH, Fig. 53, moet oplosſen.

4e. Kan het plaats hebben, dat het Nachteveningspunt van ♎ het naaste zynde, dit Nachteevenïngspunt aan dezelvde zyde des *Meridiaans* met de Ster zy, dat is ten *Oosten* van denzelven, wanneer de Ster aan den *Ooster Horiſon*, waar voor de Driehoek ABC, Fig. 51, of ten *Westen*, als de Ster aan den *Wester Horiſon* ſtaat, waar voor de Driehoek AGH, Fig. 52, geſchikt is.

5e. Kan het gebeuren, dat, het Nachteveningspunt van ♈ het naaste zynde, dit Nachteveningspunt aan de andere zyde des *Meridiaans* met de Ster zy, dat is ten *Oosten*, wanneer de Ster aan den *Wester Horiſon* ſtaat, of ten *Westen*, wanneer de Ster aan den *Ooster Horiſon* ſtaat; in welk geval de Driehoek AGH, Fig. 54, moet opgelost worden, als de Ster aan den *Wester* Horiſon ſtaat, en de Driehoek ABC, Fig. 53, als de Ster aan den *Ooster* Horiſon ſtaat.

6e. Kan het zyn, dat, het Nachteveningspunt van ♎ het naaste zynde, dit Nachteveningspunt aan de andere zyde des *Meridiaans* met de Ster zy, dat is ten *Oosten*, wanneer de Ster aan den *Wester Horiſon* ſtaat, of ten *Westen*, wanneer de Ster aan den *Ooster Horiſon* ſtaat, wanneer de Drie-

Driehoek AGH, Fig. 51, moet opgelost worden, als de Ster aan den *Wester* Horiſon ſtaat, en de Driehoek ABC, Fig. 52, als de Ster aan den *Oosten* Horiſon is.

In alle deze vier Figuuren is HAB de *Equator* — HBC de *Horiſon* — GAC de *Ecliptica* — DE de *Meridiaan* — B het *Oosten* en H het *Westen* en in alle de *acht* Driehoeken is de hoek CAB of HAG de hoek, dien de *Ecliptica* met den *Equator* maakt, welke bekend is; het verſchil is enkel in den hoek ABC, of GHA: deze is *ſcherp* in de Driehoeken ABC, Fig. 51 en 52, en HGA, Fig. 53 en 54, en dus gelyk aan den hoek, dien de *Equator* met den *Horiſon* maakt, en derhalve gelyk 't *Compliment van Breedte*; doch *ſtomp* in de Driehoeken AGH, Fig. 51 en 52, en ABC, Fig. 53 en 54; en dus gelyk 't *Supplement* van den hoek ABC, in Fig. 51 en 52, gelyk de *Breedte zelve plus* 90°; de zyde AB wordt in den Driehoek ABC, Fig. 51, aldus gevonden: FB is de boog des *Equators* van den *Meridiaan* tot den *Horiſon*, welke altoos gelyk 90° is; hier nu afgetrokken de boog FA, die gelyk is aan den afſtand van het *naaste Nachteveningspunt* van den *Meridiaan*, blyft AB over; laat ons veronderſtellen, dat de graad, welke op het gegeeven oogenblik in den *Meridiaan* ſtond, de 160e graad was, dan zou de boog FA 20° moeten zyn, (want het *Nachteveningspunt* van ♎ heeft 180° *Aſcenſio recta*;) en de zyde AB zou dus 70° moeten zyn; in den Driehoek ABC, Fig. 52, moet de boog

AF by den boog FB bygeteld worden, en dus, in dit geval onderſtellende dat de 200e graad aan den *Meridiaan* was, zou AF weder 90° zyn, en dus de zyde AB gelyk 110 graaden.; in de Driehoeken ABC, Fig. 54, en AGH, Fig. 52 en 53, wordt de zyde AB en AH even op op dezelvde wyze gevonden, als de zyde AB in den Driehoek ABC, Fig. 51, en in de Driehoeken AGH, Fig. 51 en 54, en ABC, Fig. 53, wordt de zyde AH en AB op dezelvde wyze gevonden, als de zyde AB in den Driehoek ABC, Fig. 52; de zyde AB is dus *ſcherp* in Fig. 51 en 54, doch *ſtomp* in Fig. 52 en 53; zoo is ook AH *ſcherp* in Fig. 52 en 53, doch *ſtomp* in Fig. 51 en 54; derhalve hebben wy in de Driehoeken ABC, Fig. 51, 52, 53 en 54, bekend de zyde AB, en de beide hoeken CAB en ABC, en moeten de zyde AC zoeken: deze gevonden hebbende, is het Voorſtel opgelost; want daar het punt A een der *Nachtevenings punten*, is kan men ook weldra de *lengte* van het punt C vinden; in Fig. 51, is A het *Nachtevenings punt* van ♎, en heeft dus 6 Teekens lengte, en is AC gelyk 56°, dan is de lengte van het punt C gelyk ♐ 26°; om dezelvde reden, hebben wy ook in den Driehoek AGH, Fig. 51, 52, 53 en 54, bekend de zyde AH en de beide hoeken GHA en GAH, en moeten de zyde AG zoeken.

512. II *Voorbeeld:* Wanneer 'er gevraagd wordt, welke graad van de *Ecliptica* 'er aan den *Ooster* Horiſon is, als 'er eene zekere gegeeven Ster aan

den

den *Wester* Horiſon is; of omgekeerd, welke graad van de *Ecliptica* 'er aan den *Wester* Horiſon is, als de gegeeven Ster aan den *Ooster* Horiſon is? verlengt men in den Driehoek ABC, Fig. 51 by voorb. (nadat men den graad der *Equator* gezocht heeft, welke 'er op het zelfde tydſtip aan den *Meridiaan* is,) de zyden BA tot in H, de zyde BC tot in G, en de zyde CA tot in G; en dan is de Driehoek GAH het *ſupplement* van den Driehoek BAC; de zyde GA is dus het *ſupplement* van de zyde CA; en de zyde AH het *ſupplement* van de zyde AB; en de zyde GH gelyk de zyde BC; de hoek GAH gelyk de hoek CAB, gelyk de *ſchuinsheid der Ecliptica*; en de hoek AHG, gelyk het *ſupplement* van den hoek ABC, dus in Fig. 51 en 52, gelyk de *Breedte der Plaats* plus 90°, en in Fig. 53 en 54, gelyk het *compliment van die Breedte*; de zyde AH kan weder gevonden worden, wanneer men flechts weet welke graad van den *Equator* 'er in F aan den *Meridiaan* is, en of het *Nachtevenings-punt* A dat van ♈ of ♎ zy, en of het zelve aan dezelvde zyde des *Meridiaans* met de in den *Horiſon* veronderſtelde Ster zy, waartoe men uit deze vier Fig. die moet nemen, welke op zyn geval toepaſſelyk is; ſtaat het naaste *Nachtevenings-punt* aan dezelvde zyde van den *Meridiaan*, dan is de zyde AH *ſtomp*; maar ſtaat het *Nachtevenings-punt* aan de andere zyde des *Meridiaans*, dan is de zyde HA *ſcherp*; zoo is ook in dezelvde gevallen de zyde AG, welke men

zoekt,

X VOORSTEL.

Gegeeven zynde: De Breedte der Plaats — de hoek, welken een zekere Verticaal met den Meridiaan maakt — en de Dag en het Uur — te vinden: de Ascenſio recta en Declinatie van alle Sterren, welken in dien Verticaal ſtaan.

515. Men zoekt eerst den graad des *Equators*, welke op het gegeven oogenblik in den *Meridiaan* ſtaat, § 509, en moet dan den Driehoek PZS, Fig. 48, oplosſen; in denzelven is PZ gelyk aan het *compliment van de Breedte der Plaats*, en de hoek PZS gelyk aan den gegeven hoek, dien de *Verticaal* met den *Meridiaan* maakt: deze beiden zyn ſtandvastig; al het overige in dezen Driehoek is veranderlyk; want zoekt men, by voorbeeld, de *Ascenſio recta* en *Declinatie* van eene Ster, die 10° *hoogte* heeft, dan is de zyde ZS gelyk 80°; is de hoogte der Ster 20°, dan is de zyde ZS gelyk 70° enz. Men bepaalt dus eerst welke *hoogte* de Ster heeft, wier *Ascenſio recta* en *Declinatie* men zoeken wil; deze geeft ons de grootte van de zyde ZS, die altoos *ſcherp* is, en men vindt daardoor de zyde PS, welke *ſtomp* of *ſcherp* zyn kan, als de hoek PZS *ſtomp* is, doch alleen *ſcherp* is, als de hoek PZS *ſcherp* is; is de zyde PS *ſcherp*, dan is de *Declinatie* der Ster gelyk 't *compliment* van de zyde PS (*Noordelyk*), en is de zyde PS *ſtomp*, dan is de *Declinatie* der Ster gelyk PS *minus* 90° (*Zuid-*

(*Zuidelyk*); heeft men PS gevonden, dan zoekt men ook den hoek SPZ; ſtaat nu de *Verticaal* ZS ten *Oosten* des *Meridiaans*, dan telt men den hoek SPZ by, by den graad des *Equators*, die in den *Meridiaan* ſtaat, en men bekomt de *Aſcenſio recta* der Ster; doch ſtaat die *Verticaal* ten *Westen* des *Meridiaans*, dan moet dezelve van den graad des *Equators*, die in den *Meridiaan* ſtaat, afgetrokken worden; zoekt men op deze wyze de *Declinatie* en *Aſcenſio recta* op elken graad van *hoogte*, zoo vindt men alle de Sterren, welken in dien *Verticaal* ſtaan.

XI. VOORSTEL.

Gegeeven zynde: *De Aſcenſio recta en Declinatie van twee Sterren, welken op het zelfde oogenblik in denzelfden Verticaal waargenomen zyn* — te vinden: *de Breedte der Plaats.*

516. Laat Z, Fig. 56, het *Zenith*, P de *Pool*, A de meest verheven en B de laagſte Ster zyn; dan is AP de afſtand van de eene Ster tot de Pool, BP de afſtand van de tweede Ster tot de Pool, en de hoek APB het verſchil van de *Aſcenſio recta* der beide Sterren; men zoekt nu in den Driehoek APB den hoek PBA; wanneer men, en dit wordt, tot de oplosſing van dit *Problema*, vereischt met de meest mogelyke naauwkeurigheid geſchied te zyn, den hoek PZA, of het *Azimuth* der beide Sterren, heeft waargenomen,

van de Pool, en zoekt nu den hoek ZPB: dezen gevonden hebbende, en denzelven by de *Ascenſio recta* der Ster B bytellende, indien de Ster ten Westen des *Meridiaans* ſtaat, verkrygt men den graad des *Equators*, die in den *Meridiaan* ſtaat; of den hoek ZPB van de *Ascenſio recta* der Ster B aftrekkende, indien die Ster ten *Oosten* des *Meridiaans* ſtaat, verkrygt men weder den graad des *Equators*, die in den *Meridiaan* is; en dezen gevonden hebbende, kan men zeer gemakkelyk het Uur hoe laat het is berekenen, gelyk wy in 't volgende voorbeeld zullen aantoonen.

XIII. VOORSTEL.

Ten allen tyde den graad des Equators, welke, in de Meridiaan ſtaat, door berekening te vinden, of deze gegeeven zynde het Uur hoe laat het is te vinden.

519. Wy hebben in de Noot bl. 372 reeds gezegd, hoe men den graad des *Equators*, welke in den *Meridiaan* ſtaat, ten allen tyde kan vinden, doch willen thans, om het menigvuldig gebruik van dit Voorſtel, door eenige voorbeelden hetzelve nog duidelyker trachten te maaken.

I. *Voorbeeld: Welke graad van den Equator ſtaat 'er op den* 12 *November, des avonds ten* 10 *uuren, in den Meridiaan?*

Men zoeke de *Ascenſio recta der Zon*, voor den 12 November, § 368, welke is . 228° 15'
en trekt deze af van . . 360
131° 45'

of 6 uuren 2' 's avonds voor den tyd wanneer de 235e graad aan den *Meridiaan* is;

of

	van	235°
trekt men af de *Ascenſio recta* der *Zon*		144 30'
	rest	90° 30'

welken, in tyd veranderd zynde, geven 6 uuren 2' voor den tyd dat de 235e graad op den 15 Aug. aan den *Meridiaan* ſtaat.

V. HOOFDSTUK.

GEBRUIK DER GLOBEN IN DE ZONNEWYZERSKUNDE.

520. De *Gnomons*, of *Zonnewyzers*, waren de oudſte Tydwyzers, welken men gebruikte; al vroeg bezigde men de Lengte van de Middagſchaduwe der Pyramiden om de hoogte der *Zon* te berekenen, en den tyd wanneer dit Hemellicht in den *Meridiaan* ſtond te beſtemmen; de berekening van de hoogte der *Zon*, uit de lengte der ſchaduwe van een' perpendiculair ſtaande ſtok, rust op eene eenvouwdige oplosſing van eenen rechtlynigen driehoek, waarvan de één hoek aan de baſis *recht* is, wiens baſis gelyk de lengte der ſchaduwe is, en de andere rechtshoekszyde gelyk de hoogte van den ſtok; de hoek, welken de *Hypotenuſa* met de *Baſis* maakt, en die eigenlyk gezocht moet worden, is gelyk aan de *hoogte der Zon*.

521.

521. Even zoo rust ook het maaken van allerlei ſoort van *Zonnewyzers*, op de *Klootſche Driehoeksmeeting*, en het wordt, na deze aanmerking, niet moeijelyk te begrypen, hoe men door middel der Globen allerlei ſoort van *Zonnewyzers* kan ſamenſtellen; het grondbeginſel, waarop derzelver zamenſtel rust, moet egter vooraf, voor wy overgaan om te beſchryven, hoe dezelve door middel der Globen beſchreven kunnen worden, wat nader ontwikkeld worden; hiertoe is onze nieuwe Conſtructie der Aard-Globe byzonder geſchikt.

522. Men plaatſe ten dien einde de Globe in eene donkere kamer, welke ſlechts door ééne kaars verlicht wordt, en welkers vlam zoo na mogelyk met het middenpunt der Globe moet overeenkomen; de *Artificieele Zon* wordt op den dag der *Maand* geplaatst, (welke ook, dit doet 'er niet toe,) de *Declinatie-Cirkel* aan de *Zon* gebragt, en de kaars zoo geſteld, dat eene lyn, van de kaars tot het middenpunt der Globe getrokken, de geteekende zyde des *Declinatie-Cirkel* ſnyd; natuurlyk werpt nu de *Declinatie-Cirkel* eene ſchaduwe op de Globe, en het is deze ſchaduwe, en inzonderheid die van de geteekende zyde des *Declinatie-Cirkels*, op welke wy ons oog moeten vestigen; deze ſchaduwe over de Globe gaande, ſnyd ook den *Equator* derzelve, en by het ronddraaijen der Globe verandert dus ook deze ſchaduwe van plaats, ſnyd eenen anderen graad van den *Equator*; plaatſen wy nu eens de Globe op 6 uuren voormiddag, dan zien wy deze ſchaduwe dien graad van den *Equator* ſnyden, welke op 90°

van den *Meridiaan* der plaats afligt; 5 uuren voor den middag, dat is des 7 uuren 's morgens, zal de ſchaduwe, 75° van den *Meridiaan* afgerekend den *Equator* ſnyden, ten 8 uuren de 60° enz. — dus zal ook weder ten 4 uuren namiddag, want dit ſtaat met 8 uuren voormiddag gelyk, de ſchaduwe den *Equator* op 60° afſtand van den *Meridiaan* ſnyde; — ten 5 uuren op 75° enz.

523. Wanneer wy nu ons verbeelden deze uuren op den *Equator* op de gevonden graaden aangeteekend te hebben, gelyk dezelven werkelyk op den den *Equator* onzer nieuwe Globe omringenden Cirkel geteekend zyn, de Globe op de Poolshoogte der plaats ſtellen (*), en dezelve in den *Zonneſchyn* brengende, zoo plaatſen, dat de Noordpool der Globe juist naar het Noorden gekeerd zy, dan zal de ſchaduwe des *Declinatie-Cirkels* ook het Uur des Dags aanwyzen, wanneer wy namelyk den *Declinatie-Cirkel* in een rechte lyn tuſſchen de Globe en de *Zon* in brengen, dat is zoo plaatſen dat het vlak des *Declinatie-Cirkels* door de *Zon* gaat; wy zullen gelyktydig deze ſchaduw van den *Declinatie-Cirkel* op den *Horiſon* zien ſchynen, en dus ook aldaar den graad der verſchillende uuren van den dag aanwyzen, waar men denzelven op den *Horiſon* zou moeten plaatſen; dan wy zouden, op deze wyze handelende, altoos den *Declinatie-Cirkel* de *Zon* moeten doen volgen, en denzelven geduurig ver-

(*) In dien zin namelyk als wy omtrent de Globe van Adams § 433 verklaard hebben.

verzetten om te kunnen weeten hoe laat het ware; deze manier dus om den tyd te vinden is *impracticabel*, maar geeft ons met dit alles de waare wyze aan de hand om den tyd door middel van de ſchaduwe der *Zon* te kunnen weeten.

524. Wy zagen zoo even, dat het vlak van den *Declinatie-Cirkel* door de *Zon* moet gaan, om het Uur op den *Equator* der Globe aan te wyzen, en dat wy den *Declinatie-Cirkel* de *Zon* moeten doen volgen, om ten allen tyde te kunnen weeten hoe laat het is; dus wyst ons dan de ſtand van het vlak van den *Declinatie-Cirkel der Zon* het Uur van den Dag aan; maar laat ons dan de helft der Globe wegnemen, tot op het vlak van den *Equator*, even gelyk de Globe, Fig. 57, verbeeld wordt, en op dit vlak alleen den As der Globe (door welke altoos het vlak des *Declinatie-Cirkels* heen gaat, § 24,) plaatſen, dan zal immers de ſchaduwe van dezen As op het vlak van den *Equator* het Uur aanwyzen, en zie hier eenvouwdig den *Zonnewyzer*; de Uuren, die deze ſchaduwe zal aanwyzen op dit vlak, zullen naauwkeurig overeenkomen met de bovengemelde graaden, en de hoek dus, welken de ſchaduwe der *Zon*, of liever de hoek, welken de gemeene ſneede van beide de vlakken (namentlyk van het vlak van den *Declinatie-Cirkel*, en het vlak van den *Zonnewyzer*,) met het vlak des *Meridiaans* maakt, geeft ons het punt, op hetwelk wy het begeerde Uur moeten plaatſen. — De 57 Fig. diene tot opheldering van dit ons gezegde: PNpZ verbeeld de Globe, van dewelke men het Noorder gedeelte

tot op het vlak van den *Equator* ZANB heeft weggenomen, zynde alleen de *Meridiaan* ZPN als een bloote Cirkel blyven ſtaan; CP verbeeld den As der Globe, rechthoekig op het vlak van den *Equator* ſtaande, S de Zon, welke dit vlak verlicht, en DPEp den *Declinatie-Cirkel der Zon*, welke door het 3e Uur namiddag gaat, terwyl de ſchaduwe van den As CP, welke hier de wyzer is, mede op dat uur valt; de gemeene ſneede DE der beide vlakken maakt dus een' hoek NCE met den *Meridiaan*, welke hoek het Uur aanwyst.

525. Deze ſchaduwe van den As der Aarde kan men zoo wel op elk ander vlak als op dat van den *Equator* vangen, en men onderſcheid hierna de Zonnewyzers in *Equinoctiaale* — *Horiſontaale* — *Verticaale* — *Meridiaan* en *Polaire* Zonnewyzers.

De *Equinoctiaale* Zonnewyzer is die welke op het vlak van den *Equator* beſchreven wordt.

Horiſontaale zyn zulken, welken op een *Horiſontaal* vlak beſchreven worden.

Verticaale zyn de zoodanigen, welken op elk ander vlak beſchreven worden; eigenlyk geſproken moet dit laatſte vlak *perpendiculair* op den *Horiſon* ſtaan; doch men begrypt ook onder dezelven allen die, welken op een achter overhangend of voor overhangend vlak beſchreven worden.

Meridiaan Zonnewyzers worden in het vlak van den *Meridiaan* geplaatst.

En *Polair* Zonnewyzers ſtaan rechthoekig op den *Equator* en *Meridiaan*.

526.

Een' Equinoctiaale Zonnewyzer te beſchryven.

526. Om dus een' *Equinoctiaale* Zonnewyzer te beſchryven, behoeft men, daar de *Declinatie-Cirkel* rechthoekig op het vlak van den *Equator* ſtaat, den Cirkel, welken men op de plank trekt, op dewelke men zyn' Zonnewyzer wil beſchryven, maar in 24 gelyke deelen te verdeelen, wyl alle de Uurhoeken even groot zyn, op dit vlak een' *perpendiculair* voor wyzer te plaatſen, en hetzelve juist de helling van den *Equator* met onze *Horiſon* te geeven; dat dit zoo is, dat op eenen *Equinoctiaalen* Zonnewyzer alle de Uurhoeken gelyk zyn, daarvan kan men zich lichtelyk overtuigen; 'er gaan immers, gelyk wy meermaalen, § 234, gezien hebben, alle uuren 15 graaden van den *Equator* des Hemels door het vlak van onzen *Meridiaan*, indien wy eene bewegende Aarde veronderſtellen; of 15° graaden van den *Equator* der Aarde door het vlak van elken *Declinatie-Cirkel*, als wy de Aarde ſtilſtaande beſchouwen; en derhalve moeten dus ook alle de Uurhoeken van 15° zyn, dat is die van I uur nademiddag of XI uur voormiddag van 15° — van II uur namiddag of X uur voormiddag 30° — van III uur namiddag of IX uur voormiddag 45° enz.; het vlak ANBZ, Fig. 57, verbeeld dus in dit geval het vlak van den Zonnewyzer, en een op hetzelve getrokken Cirkel, in 24 deelen gedeeld, geeft ons de plaats voor elk uur.

527. Dit zelfde grondbeginſel, hetwelk wy zoo even verklaarden, geld in allerlei ſoorten van *Zon-*

newyzers; de hoek, welken men te zoeken heeft, is altoos de hoek, welken de gemeene ſneede van het vlak, op hetwelk men den Zonnewyzer vervaardigt, (het zy hetzelve *Horiſontaal* of *Verticaal* of *hellende* is,) en het vlak van den *Declinatie-Cirkel* met den *Meridiaan* maakt; wat den *Horiſontaalen Zonnewyzer* betreft, zie men Fig. 58. PNpZ is wederom de Globe, van welke het bovenſte gedeelte tot op het vlak van den *Horiſon* ANBZ is weggenomen, S de Zon, welke dit vlak verlicht, DPEp het vlak van den *Declinatie-Cirkel der Zon*, DE de gemeene ſneede van het vlak van den *Declinatie-Cirkel* en *Horiſon*, en de hoek NCE de hoek, welken deze gemeene ſneede met *den Meridiaan* PNpZ maakt, welke het uur in E aanwyst, op hetwelk ook de ſchaduwe des wyzers CP valt.

528. Zoo ziet men ook, in Fig. 59, een' *Verticaale Zonnewyzer* afgebeeld, in denzelven is PNpZ wederom de Globe, van welke de eene helft tot op het vlak van den *Verticaal* ZBNA, op hetwelk men den *Zonnewyzer* beſchryven wil, is weggenomen, S de Zon, PEpD het vlak van den *Declinatie-Cirkel der Zon*, DCE de gemeene ſneede van dit vlak met het vlak van den *Verticaal* ZBNA, en de hoek ECN, de hoek, welken deze gemeene ſneede met het vlak van den *Meridiaan* PZOp maakt, welke het Uur in E aanwyst, op hetwelk dan ook de ſchaduwe des wyzers Cp valt; de wyzer is dus ook hier de As der Globe, in de natuur de As der Aarde, of anders eene paralelle lyn aan dezen As, doch in dit

ge-

geval het gedeelte van den As dat naar de Zuidpool p gaat, daar het in de vorige gevallen, en ook dan wanneer de Zonnewyzer naar het *Noorden* gekeerd is, het gedeelte van den As is, dat naar den Noordpool P gekeerd is.

Horisontaale Zonnewyzers te beschryven.

529. Om dus een' *Horisontaalen Zonnewyzer* te beschryven, trekt men op de plank, op welke men den Zonnewyzer teekenen wil, een' Cirkel, en verdeelt die in 360°, even als men zich den Cirkel A N B Z, Fig. 58, verdeeld moet voorstellen, trekt voorts één middenlyn Z N op dezelve, welke den *Meridiaan* verbeeld, en begint van dezen *Meridiaan* de telling der graaden tot dezelven op de 180° elkander ontmoeten; op dit begin der telling plaatst men in N, XII, men plaatst voorts den *Horison* der Globe op de Breedte der Plaats; dan nu merke men op dat de schaduwe des wyzers C P altoos den *Horison* aan de tegenovergestelde zyde van den *Declinatie-Cirkel* snyd; om dit duidelyker te bevatten, moet men in acht neemen, dat D P E de stand van den *Declinatie-Cirkel der Zon* voor het V^e^ uur nadenmiddag is, dat de schaduwe van dezen *Declinatie-Cirkel* ook werkelyk in D op den *Horison* zal vallen, doch dat de schaduwe van den As of Wyzer C P in E valt, en het dus de hoek N C E, welke door de boog N E gemeeten wordt, eigenlyk is dien men bekend moet hebben, om de plaats van het V^e^ uur te weeten, om deze reden

zou

BCP *recht* moet zyn, dat is, dat het vlak van den Wyzer niet naar de eene zyde meer moet overhelen, dan naar de andere.

Verticaale Zonnewyzers te beſchryven.

530. *Verticaale Zonnewyzers* kunnen *rechte Verticaale* en *hellende Verticaalen* zyn; beiden kunnen naar verſchillende ſtreeken des Hemels toegekeerd ſtaan; wat de eerſte betreft, tot het vervaardigen van *rechte Verticaale Zonnewyzers*, gebruikt men altoos den *Verticaal* der Globe; zet dus den *Horiſon* op de *Breedte* der Plaats, en ſchroeft den *Verticaal* in 't *Zenith* vast, voorts moet men weeten welken hoek het vlak des *Verticaals*, op 't welke men den Zonnewyzer beſchryven wil, met den *Meridiaan* maakt: maakt dit vlak een' rechte hoek met den *Meridiaan*, dan is het een Zonnewyzer welke recht tegen 't *Noorden* of *Zuiden* gekeerd ſtaat, gelyk de laatſte in Fig. 59 wordt afgebeeld; in beide gevallen, plaats men den *Verticaal* ZA, Fig. 59, net op 't *Oost-* of *Weſtpunt* van den *Horiſon*, brengt den *eerſten Meridiaan* op 15° van den *beweegbaaren Meridiaan*, en ziet welken graad dezelve van den *Verticaal* ſnyd, en brengt dezen graad op de volgende wyze over op de plank op welke men den Zonnewyzer beſchryven wil; men trekt op deze plank een' Cirkel, ZBNA, Fig. 59, verdeelt denzelven in 360°, en bepaalt welk punt men onder in N, Fig. 59, en welk punt boven in Z wil plaatſen; is het nu een *Zonnewyzer* tegen 't *Zuiden*, welken men moet maaken, dan be-

begint men de telling van 't punt N, en zoo het een tegen 't *Noorden* is, van 't punt Z; van dit punt nu, hetwelk het begin der telling bepaalt, telt men ook even veel graaden als de *Declinatie-Cirkel* op den *Verticaal* ſnyd, en plaatst aan de eene zyde der XII, welke altoos op 't begin der telling moet ſtaan, XI, en aan de andere zyde I; voorts brengt men den *eerſten Meridiaan* op 30° van den *beweegbaaren Meridiaan*, en plaatst nu op een gelyk getal graaden als de *eerſte Meridiaan* op den *Verticaal* ſnyd X en II, en zoo ook met de overige uuren; op den *Zonnewyzer tegen 't Zuiden* moeten de *voordemiddags* uuren ter rechterhand van de XII, en de namiddags uuren ter *linkerhand* van XII ſtaan, wanneer namentlyk de plank zoo voor ons ligt, dat het *centrum* van den op dezelve getrokken Cirkel naar ons toeligt, voor *Zonnewyzers tegen 't Noorden*; heeft juist het omgekeerde plaats; de Wyzer moet nu met het vlak des Zonnewyzers een' hoek pCN, gelyk aan het *Compliment van de Breedte* der Plaats, maaken, en voorts recht op het vlak ſtaan; hier geld weder de aanmerking, die wy § 520, reeds maakten: de ſchaduw ſnyd het vlak van onzen Zonnewyzer weder aan de tegenovergeſtelde zyde van het punt, waar de *eerſte Meridiaan* den *Verticaal* der Globe ſnyd; het is op de Globe eigenlyk de boog ZD, welken men voor het IVe uur, by voorbeeld: vindt, doch de hoeken NCE en DCZ zyn ſtriks hoeken, en dus gelyk; om deze reden komt het 'er niet op aan, dat onze *Verticaal* maar ½ Cirkel is.

Van

Van het Zuiden afwykende Verticaale Zonnewyzers te beſchryven.

531. Indien het vlak, op hetwelk men eenen *Zonnewyzer* beſchryven wil, wel *Verticaal* is, maar niet recht tegen 't *Zuiden* of *Noorden* ſtaat, moet men naauwkeurig den hoek kennen, welken hetzelve met den *Meridiaan* maakt, en op dezen gevonden hoek den *Verticaal* brengen; laat ons onderſtellen dat men een' *Zonnewyzer* tegen het *Zuid-Oosten* wil maaken, dan maakt dit vlak een' hoek van 45° met den *Meridiaan*, waarom men dus den *Verticaal* in 't *Zenith* geſchroefd hebbende, en den *Horiſon* op de Poolshoogte geſteld zynde, den *Verticaal* aan den *Horiſon* op 45° van den *Meridiaan* af, en dus in het Z. W. plaatst, net op 90° afſtands van het punt des *Horiſons*, tegen welken de *Zonnewyzer* moet te ſtaan komen; deze *Zonnewyzer* ondertusſchen zal niet den geheelen dag wyzen: hy zal wel alle de uuren van den voordemiddag, maar niet alle die van den nademiddag wyzen; om nu te weeten hoe lang deze Zonnewyzer na den middag zal wyzen, brengt men de 23° Zuider Declinatie van den *Declinatie-Cirkel* aan den *Verticaal*, en ziet hoe groot de *Uurhoek* is, (de hoek, dien de *Declinatie-Cirkel* met den *Meridiaan* van *Amſteldam* maakt;) deze zal in ons geval 49° zyn, welken, in uuren overgebragt zynde, 3 uuren 16′ geeven; even na 3 uuren na den Middag zal dus des Winters de *Zon* dit vlak verlaaten, en zy derhalve van 4 uuren

punt des *Horiſon* in A; brengt den *eerſten Meridiaan* op 15° aan de *Weſtzyde* des *beweegbaaren Meridiaans*; ziet welke graad van den *Verticaal* hy, van 't *Zenith* afgeteld, afſnyd, en teekent op gelyken afſtand in graaden, van N tot in I, I Uur; voorts den *eerſten Meridiaan* op 30° brengende om het II Uur te vinden, enz. — Om nu op zoodanig een' *Zonnewyzer* den Wyzer te plaatſen, moet men, wyl, het vlak van den *Meridiaan* nu met het vlak van den *Zonnewyzer* geen rechten hoek makende, ook de Wyzer op dezelve niet recht ſtaan kan, de lyn kennen, welke men de *ſubſtilaire* noemt, en boven welke de Wyzer te lood moet te ſtaan komen: om deze te vinden, brengt men den *eerſten Meridiaan* ten *Oosten* des *beweegbaaren Meridiaans*, dat hy den *Horiſon* op 45°, en dus in 't *Z. Oosten* ſnyd; (deze afſtand tuſſchen den *beweegbaaren Meridiaan* en het punt, in 't welk den *eerſten Meridiaan* den *Horiſon* ſnyd, moet altoos gelyk zyn aan den hoek, welken ons vlak met den *Meridiaan* maakt,) en ziet nu op welken afſtand van het *Zenith* de *Verticaal* door den *eerſten Meridiaan* geſneden wordt, waarvoor men vindt in ons geval den boog ZK, welke gelyk 29½° is; op dezen afſtand nu, van 29½ van N tot in L geteld, trekt men de lyn CL, welke de *ſubſtilaire* zyn zal; verder ziet men welke de graad is, op welken de *Verticaal* den *eerſten Meridiaan* ſnyd, 't welk in dit geval 26½ is, gelyk de boog PK, 't welk de hoek zyn zal, dien de As der Aarde met de *ſubſtilaire* lyn LC maakt; nu trekke men eene

lyn, AB, Fig. 61, even lang als CN, en eene andere AC, welke met de eerſte AB een' hoek van 26½° maakt, voorts de *perpendiculaire* BC; dan zal de driehoek ABC de Wyzer zyn, welke op dezen Zonnewyzer rechthoekig op CL moet geplaatst worden; moest deze Zonnewyzer tegen het *Noord Westen* ſtaan, dan zou alles omgekeerd zyn; hy zou dan beginne te wyzen als deze eindigt, en dus ſlechts van 's middags ten 3 uuren tot aan den *Ondergang der Zon*, doch de Wyzer zou dezelvde gedaante behouden.

Achter of voor overhellende Verticaale Zonnewyzers te beſchryven.

533. Ten einde een duidelyk denkbeeld te geeven, op wat wyze men ook *achter-* of *voor overhellende Verticaale Zonnewyzers*, en die tevens ook naar 't *Oosten* of *Westen* afwyken, moet maaken, moeten wy vooraf aanmerken. 1°. Dat wilde men dezelven direct door de Globe beſchryven, men, behalven de Cirkels, welken dezelve omringen, nog eenen losſen halven Cirkel zou moeten hebben, welken men op een willekeurig vlak zoude kunnen plaatſen; geſteld, men wilde een' *Zonnewyzer* maaken, die op eene *N. Breedte* van 60° tegen 't *Zuid-Oosten* ſtond, en 20° achter overhelde, dan zou men, zie de 61 Fig., op den *Horiſon* FBHE dezen halven Cirkel in D en B moeten vastmaaken, zoodat de gemeene ſneede DB van het vlak van den *Horiſon*, en *deze Cirkel* met den *Meridiaan* FH een' hoek BTH van 45° maakte, en denzelven zoo veel

veel naar de Noordpool P doen overhellen, dat de boog ZA op den *Verticaal* ZAE gelyk 20° was, wanneer men op de te voren omſchreven wyze de Uuren op dit vlak ABCD zou kunnen beſchryven; dan de byvoeging van zoodanig een ½ Cirkel by de Globe kan men miſſen, indien men het volgende in 't oog houdt (*). — 2°. Dat een *Verticaale* Zonnewyzer tegen 't *Zuiden* gelyk is aan een' *Horiſontaalen*, welke beſchreven wordt voor eene *Breedte*, welke 90° verſchilt met de *Breedte*, voor welke de *Verticaale* moet beſchreven worden: dus is een *Verticaale* tegen 't *Zuiden*, op eene *Breedte* van 60° *N. Breedte* beſchreven wordende, gelyk aan een' *Horiſontaalen* voor eene *Z. Breedte* van 30°; doch daar de Zonnewyzers voor eene gelyke *Breedte* dezelvden zyn, kan men zich dus vergenoegen, eenen *Verticaalen* voor eene *N. Breedte* van 60° willende beſchryven, eenen *Horiſontaalen*, voor eene *N. Breedte* van 30° te maaken; dat dit zoo is, blykt uit de 59 Fig.: neemt men daar het *Verticaale* vlak ZBNA aan voor *Horiſon* van eene zekere plaats O, dan zal het *Zenith* van deze plaats, juist in den *Horiſon* OQR van 't *Verticaale* vlak ZBNA vallen, en de boog OZ dus gelyk 90° zyn.

Ver-

(*) Daar zoodanige halve Cirkel ook voor het oplosſen van ſcheefhoekige klootſche Drichocken door middel der Globen kan te pas komen, kan men denzelven apart, voor Globen van verſchillende grooten by de Uitgeevers deezes bekomen.

Verticaale Zonnewyzers door Horiſontaalen *te beſchryven.*

534. Om diezelvde reden kan men ook *Verticaale* Wyzers, welken van het *Zuiden* naar het *Oosten* of *Westen* afwyken, door middel van *Horiſontaalen* beſchryven, het zy dan dat dezelven *perpendiculair* op den *Horiſon* ſtaan, of wel op denzelven voor- of achter overhellen; alleen wordt hier een verſchil in de Uurtelling, door het van het *Zuiden* afwyken van het vlak veroorzaakt, geboren, op 't welk men dus behoort acht te geeven. Wy zullen eerst aantoonen hoe men een' op den *Horiſon perpendiculairen*, doch van het *Zuiden* afwykende *Verticaal*, en vervolgends hoe men achter- of vooroverhellende Zonnewyzers door middel van *Horiſontaalen* beſchryven kan.

535. Wy onderſtellen, dat men eenen *Zonnewyzer* tegen het *Z. Oosten* ſtaande, op de *N. Breedte* van 60°, door middel van eenen *Horiſontaalen* beſchryven wil: zoo ſtelt men eerst de Globe voor de *Breedte* van 60°, en den *beweegbaaren Meridiaan* op 0° Lengte, ſchroeft den *Verticaal* in 't *Zenith* vast, en brengt denzelven aan den *Horiſon* in het *N. Oosten*; dan is deze *Verticaal* een quart boog van den *Horiſon* der Plaats, voor welke de *Horiſontaale* zou moeten dienen, en men moet dus de Pool van dezen *Horiſon* kennen, om de Lengte en Breedte der plaats te bepaalen, voor welke men den *Horiſontaalen* zal moeten maaken; om deze te vinden, moet men aanmerken, dat een boog, welke uit den *Horiſon* (van de Breedte van 60°)

45°

45° van het *Zuiden* naar het *Oosten* door het *Zenith* getrokken wordt, een *Verticaal* is van den *Horiſon* der te zoeken plaats, omdat deze boog rechthoekig ſtaat op den *Verticaal*, zoo als dezelve thans ſtaat. — 2°. Dat dit punt der Aarde, 't geen onder deze 45e graad gelegen is, ook overal even verre van den *Verticaal*, die de *Horiſon* der te zoeken plaats is, afſtaat, en dus de *Pool* van dezelve is. — Het punt der Globe, 't welk onder dat punt van den *Horiſon* gelegen is, 't welk met de gegeeven afwyking des *Zonnewyzers* overeenkomt, zal dus de Plaats zyn, voor welke men den *Horiſontaalen* beſchryven moet; en derhalve, daar wy bepaalden den Zonnewyzer tegen het *Zuid-Oosten* te willen maaken, zoo zal ook dat punt der Aarde, 't welk onder 't *Zuid-Oostpunt* des *Horiſons* gelegen is, het begeerde punt zyn; 't welk in ons geval ligt op de Lengte van 30°, en op de *Z. Breedte* van van 21°; om dit nog duidelyker te bevatten, beſchouwe men Fig. 60: de Cirkel ZBNA is de *Verticaal*, op welken men den Zonnewyzer beſchryven wil; deze ſtaat rechthoekig op den *Horiſon* DBE, en om deze reden ſtaat ook de *Horiſon* DBE rechthoekig op den *Verticaal* ZBNA, en de Pool des *Verticaals* ZBNA zal dus in 't vlak van dezen *Horiſon* DBE zyn moeten, § 24, dan van A tot in D zyn 45°, omdat de hoek ACD van 45° verouderſteld wordt; tellende nu van D tot in T mede 45°, zoo zal ADT 90° zyn, en 't punt T dus de Pool des *Verticaals* ZBNA, welke tegelyk de *Horiſon* der Plaats is, voor welke men den *Horiſontaalen* beſchryven moet,

die gelyk zal zyn aan den *Verticaalen* ZBNA; brengende nu op dit punt des *Horiſons* den *eerſten Meridiaan*, zoo zal men zien, dat dit punt 21° *Z. Breedte* heeft, en 50° in Lengte verſchilt met den *Meridiaan* PDp, dat is met den *beweegbaaren Meridiaan*.

536. Deze *Breedte* gevonden hebbende, ſtelt men de Globe voor 21° *N. Breedte*, even als dezelve Fig. 63 verbeeld wordt, dan zal PE gelyk 21° zyn, en het vlak AEBD het vlak op hetwelk de Zonnewyzer moet beſchreven worden; nu brengt men den *beweegbaaren Meridiaan*, welke in Fig. 63 door den Cirkel PZpN verbeeld wordt, 50° beoosten den *eerſten Meridiaan* PFp zoo, dat de boog FÆ van den *Equator* AQBÆ gelyk 50° zy; dan is de *beweegbaare Meridiaan* de *Meridiaan* der Plaats, voor welke men den *Horiſontaalen Zonnewyzer* beſchryven moet, en de *eerſte Meridiaan* de *Meridiaan* der Plaats, voor welke men den *Verticaalen* maaken wil; op het vlak DBEA des *Zonnewyzers* trekt men de lyn AB, en uit het centrum C derzelver den halven Cirkel AEB, en verdeelt denzelven in 180°, plaatſende in E, op 90° afſtand van van A en B, de XII voor het uur van den Middag; nu zie men op welken graad van den *Horiſon*, van het Noordpunt E deszelven afteilende, de *eerſte Meridiaan* in G den *Horiſon* ſnyd, 't welk in ons geval 24° is, en trekt de lyn CG, welke de *ſubſtilaire* zyn zal, omdat de hoek ECG de hoek is, welken de beide *Meridiaanen* in het vlak van den *Horiſon* met elkander maaken; om nu de voordemiddags uuren

uuren op dezen Zonnewyzer aantetekenen, moet men opmerken, dat, daar de *eerſte Meridiaan* thands 50° met den *beweegbaaren Meridiaan* in Lengte verſchilt, en nu voor het XI^e uur 15° meer *Oostwaards* op moet ſtaan, deze ook 15° nader aan den *beweegbaaren Meridiaan* moet gebragt worden: dus zal voor het XI^e uur, de *eerſte Meridiaan* in de richting PIp te ſtaan komen, wanneer dezelve den *Horiſon* ten *Noorden* in het punt K, op 9° van het punt G, of de *ſubſtilaire* zal ſnyden; even veele graaden nu telt men van E tot in XI, en teekent daar het XI^e uur aan; vervolgends brengt men den *eerſten Meridiaan* nog 15° meer na het *Oosten*, dat is op 20° afſtands van den *beweegbaaren Meridiaan*, ziet op hoe veele graaden van het punt G dezelve den *Horiſon* al weder ſnyd, telt hetzelvde getal van E tot in X, en teekent daar 10 uuren aan, en zoo voorts met alle de voormiddag uuren.

537. Om nu ook de *Namiddags* uuren op dezen Zonnewyzer overtebrengen, brengt men den *eerſten Meridiaan* weder in zyn' eerſten ſtand, op 50° afſtands van den *beweegbaaren Meridiaan*, en na denzelven 15° naar het *Westen* bewegende, dat is op 65° van den *beweegbaaren Meridiaan* plaatſende, zal dezelve den *Horiſon* ergens in L ſnyden; deze boog GL nu weder van E naar B geteld zynde, teekent men in I, I Uur aan; vervolgends plaatst men den *eerſten Meridiaan* op 80° afſtand van den *beweegbaaren Meridiaan*, ziet weder op hoe veel graaden van het punt G den *eerſten Meridiaan* den *Horiſon* ſnyd, en teekent

ook op het verſchil van Uurtelling acht geeven, en denzelven op de volgende wyze, welke met het in § 535 en 536 gezegde in verband ſtaat, beſchryven.

539. Willende by voorbeeld: op de *Breedte* van 60° een' Zonnewyzer beſchryven, welke tegen het Zuid-Oosten ſtaat, en 20° achter overhelt, zoo plaatst men de Globe op de Poolshoogte van 60°, en den *beweegbaaren Meridiaan*, zig Fig. 61, op 0 graaden Lengte, en den *Verticaal* in het *Z. Oosten* in de richting ZI; nu zoeke men de *Lengte* en *Breedte* van het punt der Aarde, 't welk met de 20e graad des *Verticaals*, zynde het punt G, overeenkomt, waarvoor men vindt $41\frac{1}{2}$° Lengte *Oostwaards* van den *eerſten Meridiaan* af, en 7° *Breedte*; dit puut G zal de Pool zyn van den Cirkel AßCD, welke, volgends § 533, het vlak is, op het welk deze Zonnewyzer moet beſchreven worden; hong de Zonnewyzer voor over dan zou dit punt wel in denzelfden *Verticaal*, maar onder den *Horiſon* moeten gezocht worden. —— Men plaatſe dan de Globe op de Poolshoogte van 7° *Breedte*, even als dezelve in de 64e Fig. wordt afgebeeld, en den *beweegbaaren Meridiaan* $41\frac{1}{2}$ *beoosten* den *eerſten Meridiaan*, omdat de gevonden plaats *beoosten* de plaats ligt, voor welke men den Zonnewyzer wil maaken, trekke op het vlak, op 't welk men den Zonnewyzer maaken wil, weder de lyn AB, en den halven Cirkel AEB, en verdeele denzelven als na gewoonte in graaden; nu zie men waar de *eerſte Meridiaan* PFpG den *Horiſon* ſnyd, en trekke uit dit punt G de lyn CG, wel-

ke de *ſubſtilaire* zyn zal; voorts gaat men op dezelvde wyze te werk als in het voorgaande geval, § 535 en 536, om de *voor-* en *namiddags* uuren op dit vlak aanteteekenen, en maakt ook eenen Wyzer waarvan de hoek gelyk moet zyn aan 7°, de gevonden *Breedte* van het punt G.

540. Voorts moet men, in het ſtellen van *voor-* of *achter* overhangende Zonnewyzers, nog aanmerken, dat het XII uur niet, gelyk in de *rechte Verticaalen* in de loodlyn te ſtaan komt, maar dat in achter overhangende Zonnewyzers, die tegen het *Oosten* gericht ſtaan, de loodlyn buiten de XII uuren na het *Oosten* valt, en, in die naar het *Westen* gericht ſtaan, naar het *Westen*; in *voor-overhangende* heeft net het omgekeerde plaats: om de hoegrootheid van dezen hoek te vinden, ſtelt men den *Horiſon* der Globe, AB, Fig. 65, dat dezelve met den *Equator* CD een' hoek CEA van 45° (gelyk aan de afwyking van het vlak van onzen Zonnewyzer van den *Meridiaan*) maake; de *Horiſon* AB verbeeld dan den *Verticaal* ZE, Fig. 61, en de *Equator* CD den *Meridiaan* ZPH, Fig. 61; nu ſchroeve men den *Verticaal* in het *Zenith* Z, Fig. 65, vast, en brenge denzelven in het punt I, 20° van de doorſneede des *Equators* en *Horiſons* E: deze *Verticaal* zal dan verbeelden de quart boog BPA, Fig. 61, van het vlak van onzen Zonnewyzer, en de driehoek IKE, Fig. 65, in alles gelyk zyn aan den driehoek ZAP, Fig. 61; dus ons nu de zyde IK, dat is het aantal graaden dat 'er op den *Verticaal* van de *Horiſon* I tot aan den *Equator* K gevonden wordt,

wordt, de afwyking van de loodlyn van het 12e uur zal aanwyzen, gemerkt de boog PA, Fig. 61, gelyk is aan den hoek ATP, welke de gemeene ſneede pTP van het vlak van den *Meridiaan*, en het vlak van den Zonnewyzer met de gemeene ſneede CTA van het vlak van een' op den Zonnewyzer rechthoekig ſtaande *Verticaal* ZGCN met het vlak van den Zonnewyzer maakt; en de boog AP, Fig. 61, gelyk is aan den boog IK, Fig. 65.

Om Meridiaan wyzers te maaken.

541. *Meridiaan wyzers*, zyn dezulken, welken op een *Verticaal* vlak, het geen in de richting van den *Meridiaan* ſtaat, geteekend worden: dezelven zyn dus altoos recht tegen 't *Oosten* of tegen 't *Westen* gericht; in beide gevallen is de wyze van derzelver beſchryving dezelvde, alleen wyst die tegen 't *Oosten* voordenmiddag van Zonnen Opgang tot XI uuren, en die tegen 't *Westen* van I uur namiddag tot Zonnen Ondergang; om dezelven te beſchryven, trekt men eene lyn AB, Fig. 66, paralel aan den *Horiſon*, en uit A een' Quartcirkel CD, denwelken men in 90° verdeeld; uit A door K trekt men de lyn AE, zoo dat de hoek EAB gelyk zy aan het *Compliment* van de *Breedte* der Plaats, dus de boog KC van $37\frac{1}{2}$ is; ingeval wy ons voorſtellen dezen Zonnewyzer voor de Noorder Breedte van $52\frac{1}{2}$° te beſchryven; uit het punt F trekt men nu de lyn FG *perpendicular* op AE, en uit G, als centrum, den halven

Cir-

wordt, de afwyking van de loodlyn van het 12e uur zal aanwyzen, gemerkt de boog PA, Fig. 61, gelyk is aan den hoek ATP, welke de gemeene ſneede pTP van het vlak van den *Meridiaan*, en het vlak van den Zonnewyzer met de gemeene ſneede CTA van het vlak van een' op den Zonnewyzer rechthoekig ſtaande *Verticaal* ZGCN met het vlak van den Zonnewyzer maakt; en de boog AP, Fig. 61, gelyk is aan den boog IK, Fig. 65.

Om Meridiaan wyzers te maaken.

541. *Meridiaan wyzers*, zyn dezulken, welken op een *Verticaal* vlak, het geen in de richting van den *Meridiaan* ſtaat, geteekend worden: dezelven zyn dus altoos recht tegen 't *Oosten* of tegen 't *Westen* gericht; in beide gevallen is de wyze van derzelver beſchryving dezelvde, alleen wyst die tegen 't *Oosten* voordenmiddag van Zonnen Opgang tot XI uuren, en die tegen 't *Westen* van I uur namiddag tot Zonnen Ondergang; om dezelven te beſchryven, trekt men eene lyn AB, Fig. 66, paralel aan den *Horiſon*, en uit A een' Quartcirkel CD, denwelken men in 90° verdeeld; uit A door K trekt men de lyn AE, zoo dat de hoek EAB gelyk zy aan het *Compliment* van de *Breedte* der Plaats, dus de boog KC van $37\frac{1}{2}$ is; ingeval wy ons voorſtellen dezen Zonnewyzer voor de Noorder Breedte van $52\frac{1}{2}$° te beſchryven; uit het punt F trekt men nu de lyn FG *perpendicolair* op AE, en uit G, als centrum, den halven

Cir-

Cirkel HFI; van dezen halven Cirkel verdeeld men den Quartcirkel HF in 6 gelyke deelen, en trekt door deze verdeeling de lynen G1, G2, G3, G4, G5, G6; vervolgends trekke men de lyn LM paralel aan de lyn AE, en eindelyk de Uurlynen 1, 1, 2, 2, 3, 3, enz. eindelyk plaatſe men in de beide punten met 6 geteekend, rechthoekig op het vlak van den Zonnewyzer, den Wyzer, welke in de 67e Fig. wordt afgebeeld, en die deze eigenſchap moet hebben, dat de beide beenen AB en CD gelyk moeten zyn aan den ſtraal van den $\frac{1}{2}$ Cirkel HFI, en het dwarsbalkje BC gelyk de tuſſchenwydte tuſſchen de beide lynen AE en LM; deze Zonnewyzer, zoo als wy denzelven nu beſchreven hebben, is geſchikt om naar het *Weſten* gekeerd te ſtaan; moest dezelve naar naar het *Oosten* gekeerd zyn, zyne inrichting zou dezelvde blyven, alleen zou dan de hoek A in B moeten vallen, de Zonnewyzer derhalve een tegengeſtelde richting verkrygen, en de voordemiddags uuren daarop aangeteekend worden.

Polaire Zonnewyzers te beſchryven.

542. *Een Polair Zonnewyzer* ſtaat recht tegen 't Zuiden gericht, en wordt beſchreven in een vlak, 't welk in de richting van den As der Aarde ligt, en dus met den *Horiſon* een' hoek maakt, die gelyk is aan de *Breedte* der plaats, of rechthoekig op den *Equator* ſtaat; om een' zoodanigen Zonnewyzer te maaken, trekt men op dit vlak de *Horiſontaale* lyn AB, in D op dezelve de *perpendi-*

diculaire DC, beſchryft uit C als centrum den ¼ Cirkel EDF, en verdeelt denzelven in 12 gelyke deelen; door deze verdeeling trekt men uit C de lynen C7, C8, C9, C10, C11, C12, C1, C2, enz. en door deze punten de dwarslynen, die men in de Figuur *perpendiculair* op AB getrokken ziet, en plaatst eindelyk in D *perpendiculair* op het vlak des Zonnewyzers een ſtyltje, 't welk de lengte van CD moet hebben.

Algemeene aanmerkingen omtrent het maaken van Zonnewyzers door middel der Globen.

543. Wy hebben in dit Hoofdſtuk altoos verondersteld, dat men zich in deze bewerkingen van eene naar onze nieuwe manier ingerichte Aard-Globe bediende; wil men zich echter van eene naar de manier van ADAMS gemonteerde Globe bedienen, dit kan men even goed doen, en wy zullen hierna aantoonen wat men daarby in 't oog te houden hebbe; wy willen thans alleen nog maar eenige regelen voorſchryven, die hoe zeer zy niets tot het weezen der zaak toe of afdoen, egter het gemak kunnen bevorderen.

544. Men zal dan wel doen in 't oog te houden, dat men, wanneer men door middel der Globen een' Zonnewyzer beſchryven wil, voorafden *beweeghaaren Meridiaan* op de Lengte van 0 graaden brengt, en dus op den *eerſten Meridiaan* ſtelt. 2° Dat men de Globe zoo plaatst, dat de *eerſte Meridiaan* onder den breeden koperen ring,

ring, anders de Colure der Zonneſtanden, te ſtaan komt, en aan dezen koperen ring een zeker teeken plaatst, 't welk ons van den onveranderlyken ſtand der Globe kan verzekeren; men verkrygt hierdoor dit gemak, dat deze koperen ring zelf Uurwyzer wordt, en dat men dus, den *beweegbaaren Meridiaan* op 15°, op 30° afſtands, enz. van den *eerſten Meridiaan* brengende, deze graaden niet behoeft te tellen, maar de Uuren gebruikt, welken, op den de Globe omringende, koperen *Equator* geſneden zyn; zoodat voor XI Uuren voordenmiddag het Ie Uur nadenmiddag onder den koperen ring te ſtaan komt, voor II Uur nadenmiddag het X Uur, even zoo gelyk dan ook voor I Uur nadenmiddag, het XI Uur, voor II Uuren het X Uur, enz. onder dezen zelvden ring komt; dat de Uuren hier omgekeerd worden, komt daarvan daan, dat men in het bewegen des *beweegbaaren Meridiaans* denzelven van het *Oosten* naar het *Westen* moet draaijen, terwyl de Globe ſtil ſtaan blyft, daar, men denzelven met de Globe draaijende, de eene met den ander' van het *Westen* naar het *Oosten* draait.

545. In het bezigen van de Globe van ADAMS tot het maaken van Zonnewyzers blyft alles hetzelvde, alleen is hier de *Algemeene Meridiaan* hetzelvde dat op de andere de *beweegbaare Meridiaan* was; en daar deze nu vast ſtaat, moet men de Globe zelf draaijen: deze *Algemeene Meridiaan* is dus ook de Uurwyzer, en de Uuren worden op dezelvde wyze onder denzelven gebragt, als in de vorige § gezegd is; het bewegen van de

de Globe in 't laatſte geval, en het laaten ſtilſtaan van dezelve in het eerſte is hier het eenige onderſcheid.

546. 'Er is maar één geval in het welke men zich niet van den, de Globe omringende, grooten Cirkel als Uurwyzer bedienen kan, te weeten dan, wanneer men door middel van eenen *Horiſontaalen* Zonnewyzer een' *Verticaalen*, die van 't Zuiden afwykt, beſchryven wil, § 534, 538; doch in dat geval kan men op de Globe van ADAMS, ter plaatſe daar de *eerſte Meridiaan*, van denwelken de Uurtelling begint, te ſtaan komt, den Uurwyzer plaatſen, en op onze nieuwe Globe plaatst men dien alsdan boven den *beweegbaaren Meridiaan*, en alles blyft hetzelvde.

EINDE.

CATALOGUS

VAN DE

600 VOORNAAMSTE

STERREN,

ZIGTBAAR TE PARYS,

BEREKEND VOOR DEN 1 JANUARY 1800, NAAR DE NIEUWSTE WAARNEMINGEN.

DOOR

MICHEL LEFRANÇAIS LALANDE.

CATALOGUS van de 600 voornaamſte STERREN, zigtbaar te Parys, berekend voor den 1 January 1800, naar de nieuwſte waarneemingen, door MICHEL LEFRANÇAIS LALANDE.

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Janu. 1800. U. M.	G. M. S.	Jaarlykſche VERANDERING. S. Tien.	middelb. DECLINAT. voor 1 Janu. 1800. G. M. S.	Jaarlykſche VERANDERING. S. Tien.
γ Pegasus . . 2	0. 3	0.44.12	46,6	14. 4.25. N	+ 20,3
ι Walvisch. . . 3	0. 9	2.18.44	45,9	9.55.54. Z	— 20,0
κ Caſiopea. . . 4	0. 22	5.26.12	49,5	51.49.35. N	+ 20,0
ζ idem. . . 4	0. 25	6.28.32	48,9	52.47.39. N	+ 19,9
ε Andromeda . 4	0. 27	7. 0. 1	47,3	28.13.40. N	+ 19,9
δ Andromeda . 3	0. 28	7. 9.53	45,5	29.45.57. N	+ 20,0
α Caſiopea . . 2	0. 29	7.18.36	49,7	55.26.18. N	+ 19,9
β Walvisch . . 2	0. 33	8.23. 6	45,1	19. 5. 7. Z	— 20,1
ζ Andromeda . 4	0. 37	9.11.26	47,4	23.10.43. N	+ 19,8
η Caſiopea . . 4	0. 37	9.16. 5	50,8	56.45. 6. N	+ 19,8
δ Viſſchen . . 4	0. 38	9.34.41	46,4	6.29.47. N	+ 19,8
35. ν Androm. 4	0. 39	9.42.28	48,8	39.59.16. N	+ 19,8
γ Caſiopea . . 3	0. 44	11.11.11	52,4	59.37.49. N	+ 19,7
37. μ Androm. 3	0. 45	11.25.22	49,0	37.24.46. N	+ 19,7
α Poolſter . 2. 3	0. 51	13. 6.50	197,5	88.14.25. N	+ 19,5
ε Viſſchen . . 4	0. 53	13. 8.33	46,5	6.48.42. N	+ 19,5
η Walvisch . 3. 4	0. 59	14.37.53	45,2	11.14.35. Z	— 19,4
β Andromeda 2	0. 59	14.38.41	49,6	34.33.30. N	+ 19,6
θ Caſiopea . . 4	0. 59	14.45. 1	53,0	54. 4.57. N	+ 19,4
ζ Viſſchen . . 4	1. 3	15.49.19	46,6	6.31. 4. N	+ 19,3
46 Androm. 4. 5	1. 11	17.39.24	51,9	44.28.37. N	+ 19,1
δ Caſiopea . . 3	1. 13	18.12.50	57,3	59.11.23. N	+ 19,1
θ Walvisch . . 3	1. 14	18.30.27	45,1	9.13. 4. Z	— 18,4
48 Andromeda 5	1. 16	18.56.16	52,3	44.22. 8. N	+ 19,0
49 ξ idem 5	1. 18	19.32.34	52,9	45.58.18. N	+ 18,9
η Viſſchen . . 4	1. 21	20.11.57	47,6	14.18.48. N	+ 18,8
π idem . . 4. 5	1. 27	21.37.43	47,2	11. 7. 7. N	+ 18,7
ν idem . . 4. 5	1. 31	22.45.29	46,7	4.28.24. N	+ 18,5
Φ Andromeda 4	1. 31	22.48. 2	55,1	49.40.32. N	+ 18,5
110. σ Viſſchen 4. 5	1. 35	23.42.41	47,2	8. 8.54. N	+ 18,5

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Janu. 1800. U. M.	G. M. S.	Jaarlykſche VERANDERING. S. Tien.	middelb. DECLINAT. voor 1 Janu. 1800. G. M. S.		Jaarlykſche VERANDERING. S. Tien.
34 τ Walvisch 3.4	1. 35	23.44.53*	43,0	10.59.39.	Z	— 10,4
ε Casſiopea . . 3	1. 40	25. 2.30	62,4	62.40.39.	N	+ 18,2
ζ Walvisch . . 3	1. 42	25.24.10	44,3	11.19.31.	Z	— 18,1
α Noord.Drieh.3.4	1. 42	25.25.43	50,8	28.36. 3.	N	+ 18,1
γ Ram . . 4	1. 43	25.38.37	48,9	18.18.41.	N	+ 18,1
β Ram . . 3	1. 44	25.54.11	49,1	19.49.35.	N	+ 18,1
50 f Casſiopea 4.5	1. 47	26.39.36	72,6	71.26.37.	N	+ 18,0
υ¹ Walvisch . . 4	1. 47	26.49.26	42,1	23.30.25.	Z	— 17,9
γ Andromeda . 2	1. 52	27.55.15	54,3	41.21.46.	N	+ 17,7
α Visſchen . . 3	1. 52	27.55.34	46,3	1.47.31.	N	+ 17,8
α RAM 3	1. 56	28.58.51	50,1	22.30.46.	N	+ 17,5
β Noord.Drieh. 4	1. 58	29.25.18	52,7	34. 2. 7.	N	+ 17,5
γ idem . . 4	2. 5	31.21.59	52,7	32.54.58.	N	+ 17,2
o Walvisch 2.10	2. 9	32.18.46	45,4	3.53.20.	Z	— 17,0
35 Casſiopea. 4	2. 13	33.11.53	71,0	66.29.34.	N	+ 16,8
ε Walvisch . . 4	2. 16	34. 4.21	43,4	13.11.42.	Z	— 16,6
ξ² idem . . 4	2. 18	34.23. 4	47,5	7.33.34.	N	+ 16,6
σ idem . . 4	2. 23	35.39. 8	42,6	16. 7.29.	Z	— 16,3
δ idem . . 3	2. 29	37.18.36	46,0	0.32.15.	Z	— 16,4
ε idem . . 3	2. 30	37.28.23	43,4	12.43.33.	Z	— 15,9
β Perſeus . . 4	2. 31	37.39.10	59,8	48.22.26.	N	+ 15,9
35 Lely . . 4	2. 32	37.56.13	52,2	26.50.58.	N	+ 15,8
γ Walvisch . 3	2. 33	38.14.15	46,6	2.23.16.	N	+ 15,8
μ idem . . 4	2. 34	38.32. 9	48,0	9.15.46.	N	+ 15,7
π idem . . 3	2. 35	38.39. 9	42,8	14.42.32.	Z	— 15,8
1 τ¹ Eridaan . 4	2. 36	38.54. 3	41,6	19.25.24.	Z	— 15,6
39 N. v. d. Lely 4	2. 36	39. 0.26	52,8	28.24.36.	N	+ 15,6
η Perſeus . 4	2. 36	39. 3. 9	64,0	55. 3.16.	N	+ 15,6
16 P¹ idem . . 4	2. 37	39.30. 3	55,6	37.29.15.	N	+ 15,5
41 d Z.v.d.Lely 4	2. 38	39.33.38	52,3	26.25.47.	N	+ 15,5
τ Perſeus . . 5	2. 40	40.2. 21	62,4	51.56.10.	N	+ 17,4
2 τ² Eridaan . 4	2. 42	40 29.29	40,8	21.49.51.	Z	— 15,3
21 Perſeus . 4 5	2. 45	41.17.53	54,0	31. 7.14.	N	+ 15,1

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Janu. 1800.		Jaarlykſche VERANDERING.	middelb. DECLINAT. voor 1 Janu. 1800.		Jaarlykſche VERANDERING.
	U. M.	G. M. S.	S. Tien.	G. M. S.		S. Tien
22 π Perſeus . 4	2. 46	41.30.19	56,7	38.51.14.	N	+ 15,3
η Eridaan . . 3	2. 47	41.39.56	43,8	9.41.57.	Z	— 15,0
λ Walvisch .. 4	2. 49	42.15.10	47,9	8. 6.16.	N	+ 14,5
γ Perſeus . . . 3	2. 50	42.36. 0	64,0	52.42.47.	N	+ 14,8
α WALVISCH . 2	2. 52	42.57.29	46,6	3.18. 5.	N	+ 15,1
25 ρ Perſeus . 4	2. 52	43. 6. 7	56,7	38. 3.23.	N	+ 14,7
11 Eridaan . 3.4	2. 54	43.23.35	39,8	24.26.29.	Z	— 14,5
10 ρ³ idem . . 4	2. 54	43.36.52	44,0	8.23.18.	Z	— 14,7
β Perſeus *ver.* 2.5	2. 55	43.48. 8	57,8	40.10.30.	N	+ 14,5
« idem . . 4.5	2. 57	44. 9.57	59,8	44. 5.24.	N	+ 14,5
ϑ Ram 4	3. 0	45. 3.10	50,9	18.57.45.	N	+ 14,2
α Fournuis . 3.4	3. 4	45.53.41	37,9	29.46.50.	Z	— 14,0
ζ Eridaan . . 3	3. 6	46.31.52	43,7	9.34. 6.	Z	— 13,8
ω Perſeus . . 2	3. 10	47.31.42	62,3	49. 8.21.	N	+ 13,8
16 Eridaan . . 4	3. 11	47.39.19	39,9	22.28.13.	Z	— 13,5
97 κ² Walvisch 4	3. 11	47.39.57	46,8	2.56.59.	N	+ 13,5
2 Giraffe . . 4	3. 13	48.14.47	71,0	59.13.44.	N	+ 13,4
3 idem . . 4	3. 14	48.30.46	70,1	58.10,30.*	N	+ 13,4
o Stier . . . 4	3. 14	48.30.58	48,4	8.19. 5.	N	+ 13,3
4 Giraffe . 4.5	3. 15	48.42.38	67,2	54.44 44.	N	+ 13,3
2 ξ Stier . . 4	3. 16	49. 5.12	48,7	9. 1.44.	N	+ 13,2
35 σ Perſeus . 5	3. 17	49. 8. 5	62,4	47.17.37.	N	+ 13,2
17 Eridaan . 4.5	3. 21	50.10.30	44,5	5.46. 1.	Z	— 12,9
37 ψ Perſeus . 5	3. 22	50.35. 7	62,9	47.30.54.	N	+ 12,8
s Eridaan . . 3	3. 24	50.53. 0	43,3	10. 8.24.	Z	— 12,7
19 Eridaan . . 4	3. 25	51.14.21	39,6	22.18.23	Z	— 12,6
10 Stier . . 4.5	3. 26	51.40. 9	46,0	0.14.10.	Z	— 12,5
ϑ Perſeus . . 3	3. 29	52.11.11	63,1	47. 8.12.	N	+ 12,5
41 τ idem . 4	3. 32	52.54.51	60,3	41.56. 3.	N	+ 12,1
δ Eridaan . 3	3. 34	53.25. 3	43,1	10.26.52.	Z	— 12,0
η Pleïaden . 3	3. 36	53.54.16	53,0	23.28.40.	N	+ 11,9
26 π Eridaan 4	3. 37	54.10.18	42,3	12.44. 1.	Z	— 11,8
27 idem . . 4	3. 38	54.33.61	38,8	23.49.47.*	Z	— 11,7

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Janu. 1800.			Jaarlykſche VERANDERING.	middelb. DECLINAT. voor 1 Janu. 1800.				Jaarlykſche VERANDERING.
	U.	M.	G. M. S.	S.Tien.	G.	M.	S.		S. Tien.
ζ Perſeus . . 3	3.	42	55.23.50	56,1	31.	16.	41.	N +	11,4
46 P. *Cas.* 1712. 4.5	3.	42	55.24.20	63,9	47.	16.	17.	N +	11,4
ε Eridaan . . 4	3.	42	55.29.37	33,7	36.	48.	26.	Z —	11,4
ε Perſeus . . . 3	3.	44	56. 7. 7	59,7	39.	25.	11.	N +	11,2
ι Eridaan . 4.5	3.	45	56.18. 5	38,3	25.	12.	49.	Z —	11,1
γ Eridaan . . 3	3.	49	57.10.31	41,9	14.	5.	3.	Z —	10,9
λ Stier . . 4	3.	50	57.24.12	49,6	11.	54.	56.	N +	10,9
36 *k* Eridaan . 4	3.	51	57.50.59	38,3	24.	35.	13.	Z —	10,7
47 *A* Perſeus . 4	3.	52	57.56. 7	66,1	49.	47.	21.	N +	10,7
38 ν Stier . 4	3.	53	58. 7.51	47,6	5.	25.	40.	N +	10,6
A² Stier . . 4.5	3.	54	58.13.20	52,8	21.	31.	33.	N +	10,6
51 μ Perſeus . 4	4.	0	60. 3.56	65,2	47.	53.	13.	N +	10,5
ο Eridaan . 4	4.	2	60.31.37	43,8	7.	21.	58.	Z —	9,9
49 μ Stier . 4	4.	5	61.10.16	48,6	8.	22.	57.	N +	9,7
γ Stier . . 3	4.	8	62. 6.21	50,8	15.	8.	3.	N +	9,4
41 Eridaan . 3.4	4.	10	62.35. 6*	33,9	34.	17.	39.*	Z —	9,3
δ^1 Stier . . 3.4	4.	11	62.51.14	51,5	17.	3.	47.	N +	9,2
δ^2 idem . 4.6	4.	13	63. 8.43	51,5	16.	58.	12.	N +	9,1
42 ξ Eridaan 3.4	4.	14	63.25.49	44,7	4.	12.	59.	Z —	9,0
43 *d* idem . 4	4.	17	64. 7.55*	33,6	34.	29.	31.*	Z —	8,8
ε Stier . . 3.4	4.	17	64.14.15	52,1	18.	43.	33.	N +	8,8
ALDÉBARAN . . 1	4.	24	66. 6.49	51,3	16.	5.	50.	N +	8,2
47 Eridaan . 4	4.	25	66. 8.45	43,2	8.	39.	35.	Z —	8,1
50 p^1 idem . 4	4.	26	66.23.44*	35,3	32.	10.	24.	Z	8.

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Janu. 1800.		Jaarlykſche VERANDERING.	middelb. DECLINAT. voor 1 Janu. 1800.		Jaarlykſche VERANDERING.	
	U. M.	G. M. S.	S. Tien.	G. M. S.		S. Tien	
α^1 Orion . . 4.5	4. 41	70.18.23	50,7	13.54.21.	N	+	6,8
8 z idem . . . 4	4. 44	70.57.30	46,7	2. 6.15.	N	+	6,6
3 ι Koetſier . . 4	4. 44	70.59.48	58,3	32.50. 9.	N	+	6,6
9α^2 Orion . . 4.5	4. 45	71.16.57	50,4	13.11.17.	N	+	6,5
10 Giraffe . . 4.5	4. 46	71.25.17	79,0	60. 7.46.	N	+	6,4
8 Koetſier . . . 4	4. 48	71.54.39	64,1	43.30.41.	N	+	6,3
10 Orion . . 4.5	4. 48	72. 2.46	46,5	1.23.50.	N	+	6,3
8 ζ Koetſier . 4	4. 49	72. 7.53	62,7	40.46. 7.	N	+	6,2
102 ι Stier . . 4	4. 51	72.47.14	53,5	21.17.30.	N	+	6,0
139 Giraffe . 4.5	4. 51	72.48.13	82,4	62.11.49.	N	+	6,0
10 ν Koetſier . 4	4. 53	73. 7.41	62,7	40.56.55.	N	+	5,9
2 Haas 4	4. 57	74.14.54	38,0	22.38.53.	Z	—	5,5
β Eridaan . . . 4	4. 58	74.30.24	44,3	5.21.14.	Z	—	5,9
69 λ idem . . 4	5. 0	74.53.44	43,0	9. 1. 7.	Z	—	5,8
CAPELLA . . . 1	5. 2	75.29. 2	66,1	45.46.41.	N	+	4,7
5 μ Haas . . 4	5. 4	75.59.11	40,3	16.26.52.	Z	—	4,9
RIGEL 1	5. 5	76.13.53	43,1	8.26.26.	Z	—	5,1
20 τ Orion . . 4	5. 8	76.58.24	43,6	7. 4.10.	Z	—	4,6
β STIER 2	5. 14	78.24.51	56,6	28.25.34.	N	+	4,2
γ Orion . . . 2	5. 14	78.36. 5	47,9	6. 9.26.	N	+	4,1
ι Orion 3	5. 14	78.36.22	45,2	2.35.25.	Z	—	4,0
β Haas . . . 3.4	5. 20	79.55. 7	38,6	20.55.39.	Z	—	3,5
δ Orion . . . 2	5. 22	80.26.51	45,7	0.27.29.	Z	—	3,3
36 υ idem . . 4	5. 22	80.33.51	43,4	7.27.28.	Z	—	3,2
α Haas 3	5. 24	80.58.44	39,7	17.53.26.	Z	—	3,2
39 λ Orion . . 4	5. 24	81. 1.50	49,4	9.47.23	N	+	3,2
8 Duif 4	5. 24	81. 1.59	31,8	35.37.20.	Z	—	3,2
43 θ_2 Orion . 6	5. 26	81.23.24	44,1	5.33.34.	Z	—	3,1
ι Orion . . . 3.4	5. 26	81.24.41	44,0	6. 2.58.	Z	—	3,0
ζ Stier 3	5. 26	81.25.26	53,6	21. 0.30.	N	+	3,0
κ Orion 4	5. 26	81.30.57	45,6	1.20.27.	Z	—	3,2
125 Stier . . . 5	5. 27	81.50.13	55,6	25.46.16.	N	+	2,9
48 σ Orion . . 4	5. 29	82.10.82	45,1	2.43.42.	Z	—	2,8

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Jan. 1800.		Jaarlykſche VERANDERING.	middelb. DECLINAT. voor 1 Jan. 1800.		Jaarlykſche VERANDERING.
	U. M.	G. M. S.	S.Tien.	G. M. S.		S. Tien
ζ Orion 2	5. 31	82.40. 5	45,4	2. 3.34.	Z —	2,6
κ Duif 2	5. 32	83. 6.16	32,5	34.11.12.	Z —	2,4
γ Haas . . . 3.4	5. 36	84. 2.28	37,8	22.31.17.	Z —	2,1
132 Stier . . . 4	5. 37	84.11.13	55,1	24.29.16.	N +	2,1
14 ζ Haas . . 4	5. 38	84.27.43	40,7	14.54.16.	Z —	2,0
κ Orion . . . 2.3	5. 38	84.34. 3	42,5	9.45. 4.	Z —	1,7
ϑ Haas . . . 3.4	5. 43	85.40.45	38,5	20.54.15.	Z —	1,5
δ Koetſier . . . 4	5. 43	85.45.51	73,8	54.15. 0.	N +	1,5
β Duif 3	5. 44	85.58.59	31,6	35 51.10.	Z —	1,4
α ORION . . . 1	5. 44	86. 5.10	49,0	7.21.33.	N +	1,3
β Koetſier . 2.3	5. 45	86.12.48	66,2	44.54.41.	N +	1,4
9 idem . . . 3.4	5. 46	86.31.18	61,3	37.11. 3.	N +	1,3
16 n Haas . . 4	5. 47	86.49.28	41,0	14.12.48.	Z —	1,1
γ Duif 4	5. 50	87.37. 2	31,8	35.18.11.	Z —	0,9
61 μ Orion . . 4	5. 51	87.50.39	49,2	9.38. 9.	N +	0,8
1 *H* Tweelingen 5	5. 52	87.59.26	54,7	23.15.44.	N +	0,8
ν Orion . . . 4.5	5. 56	89. 2.18	51,4	14.46.51.	N +	0,4
9 Haas 4	5. 57	89.16.30	40,7	14.55.29.	Z —	0,4
2 Lynx . . . 4	6. 2	90.29.25	79,5	59. 3.41.	N —	0,1
n Tweelingen 2.3	6. 3	90.42. 1	54,3	22.33. 9.	N —	0,2
μ Tweelingen 3	6. 11	92.42.51	54,4	22.36.13.	N —	0,9
ζ gr. Hond . 2.3	6. 13	93. 9.31	34,6	29.59. 1.	Z +	1,1
8 Eenhoorn . 4	6. 13	93.17.27	47,7	4.41.14.	N —	1,1
β gr. Hond . 2.3	6. 14	93.28.21	39,7	17.51.59.	Z +	1,2
δ Duif 4	6. 15	93.42. 5	32,9	33.20.40.	Z +	1,3
ν Tweelingen . 4	6. 17	94.16 12	53,4	20.19.34	N —	1,4
13 Eenhoorn . 4	6. 22	95.31.15	48,6	7.28. 7.	N —	1,9
γ Tweelingen 2.3	6. 26	96.32.16	52,0	16.33.26.	N —	2,1
42 Giraffe . 4.5	6. 30	97.30.20	94,7	67.45.54.	N —	2,6
15 Eenhoorn . 4	6. 30	97.29.17	49,6	10. 4.10.	N —	2,6
ξ Tweelingen . 4	6. 32	97.54.17	55,4	25.18.57.	N —	2,7
43 Giraffe . 4.5	6. 32	98. 0.57	98,0	69. 5.39.	N —	2,7
23 ξ Tweelingen 4.5	6. 34	98.30.54	50,6	13. 5.56.	N —	2,9
SIRIUS 1	6. 36	99. 4.59	39,7	16.27. 5.	Z +	4,5

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Janu. 1800. U. M.	G. M. S.	Jaarlykſche VERANDERING. S.Tien.	middelb. DECLINAT. voor 1 Janu. 1800. G. M. S.		Jaarlykſche VERANDERING. S. Tien.
13 Eenhoorn . 4	6. 37	99.21.21	46,9	2.37.23.	N —	3,2
34 θ Tweelingen 4	6. 40	99.53.48	59,4	34.11.13.	N —	3,3
κ² gr. Hond . 4	6. 42	100.35.35	33,6	32.17. 7.	Z +	3,6
18 μ idem . . 4	6. 47	101.44. 5	41,3	13.47.36.	Z +	4,0
20 ι idem . . 4	6. 47	101.48.14	40,1	16.48.13.	Z +	4,1
ε gr. Hond . . 3	6. 51	102.41.33	35,4	28.42.26.	Z +	4,4
ζ Tweelingen 3	6. 52	103. 3.30	53,5	20.51. 3.	N —	4,5
b gr. Hond . . 4	6. 54	103.26.18	35,9	27.39.31.	Z +	4,6
24 σ² idem . . 4	6. 55	103.40. 3	37,7	23.32.55.	Z +	4,7
γ idem . . . 2	6. 55	103.40.36	40,8	15.20.48.	Z +	4,7
δ gr. Hond . . 2	7. 0	105. 3.52	36,5	26. 4.58.	Z +	5,2
d Tweelingen . 3	7. 8	107. 2.28	53,9	22.20.16.	N —	5,8
ι idem 4	7. 13	108.19.18	56,2	28.10.58.	N —	6,2
η gr. Hond . . 2	7. 16	109. 2.45	35,6	28.55.12.	Z +	6,5
β kl. Hond . . 3	7. 16	109. 4.28	48,9	8.40.55.	N —	6,7
α CASTOR . . 1.2	7. 22	110.27.12	57,9	32.18.54.	N —	6,7
69 υ Tweeling. 4.5	7. 24	110.53.33	55,7	27.19.49.	N —	7,1
PROCYON . . 1.2	7. 29	112.12.17	47,2	5.43.39.	N —	8,7
26 Eenhoorn . 4	7. 32	112.53.21	43,2	9. 5.28.	Z +	7,8
κ Tweelingen 4	7. 32	113. 5.19	54,6	24.51.55.	N —	7,8
β POLLUX . . 2.3	7. 33	113.15.48	55,3	28.29.53.	N —	7,7
ξ Schip . . . 3.4	7. 41	115.13.19	37,9	24.21.55.	Z +	8,5
9 Schip 4	7. 43	115.37.36	41,7	13.22.28.	Z +	8,6
11 e idem . . 4	7. 48	117. 3.55	38,7	22.21.14.	Z +	9,1
13 idem . . . 4	7. 52	117.57.45	46,9	2.52.30.	N —	9,3
ζ Schip 4	7. 57	119. 8.26	31,6	39.26.38.	Z +	9,7
ψ² Kreeft . . 4	7. 58	119.35.45	54,6	26. 6.18.	N —	9,8
10 of ζ Schip 3.4	7. 59	119.45. 6	38,5	23.44. 4.	Z +	9,9
57 Giraffe . . 5	8. 2	120.26.17	80,3	63. 6.22.	N —	10,0
β Kreeft . . 3.4	8. 6	121.24.52	48,8	9.47.31.	N —	10,4
ι ο gr. Beer 4.5	8. 14	123.22.51	76,8	61.22.14.	N —	11,0
30 Eenhoorn . 4	8. 16	123.54.53	45,1	3.15.41.	Z +	11,1
ι δ Hydra . . 4	8. 27	126.45.45	47,2	6.23.31.	N —	12,3
γ Kreeft . . . 4	8. 32	127.55.20	52,5	22.10.49.	N —	12,3
7 η Hydra . . 4	8. 33	128.11.16	47,2	4. 6.41.	N —	12,4

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Janu. 1800. U. M.	G. M. S.	Jaarlykſche VERANDERING. S. Tien.	middelb. DECLINAT. voor 1 Janu. 1800. G. M. S.		Jaarlykſche VERANDERING. S. Tien.
δ Kreeft . . . 4	8. 33	128.19.28	51,4	18.52.54. N	—	12,4
31 Eenhoorn . 4	8. 34	128.27.52	44,2	6.31. 9. Z	+	12,4
Hydra 4	8. 36	129. 2.32	48,0	7. 8.43. N	—	12,4
ζ idem . . 4.5	8. 45	131.12. 8	47,9	6.42. 0. N	—	13,2
α_1 Kreeft . . . 4	8. 45	131.14.53	49,3	12.22.58. N	—	13,2
ι gr. Beer . . 3	8. 45	131.21.45	63,3	48.49. 1. N	—	13,2
α_2 Kreeft . . . 4	8. 48	131.53. 0	49,4	12.37.28. N	—	13,4
κ gr. Beer . 3.4	8. 50	132.28.32	62,6	47.56.15. N	—	13,5
17 idem . . . 4	8. 54	133.26.20	58,0	39.14.36. N	—	13,7
κ Kreeft . . . 4	8. 55	134.13.32	48,9	11.27.58. N	—	13,9
22 θ Hydra . . 4	9. 4	135.59. 6	46,8	3. 9. 7. N	—	14,4
38 Lynx . . . 4	9. 6	136.35. 9	56,7	37.38.27. N	—	14,5
40 idem . . . 4	9. 9	137.12.29	55,7	35.13.49. N	—	14,7
1 κ Leeuw . . 4	9. 13	138.14.36	52,8	27. 2.13. N	—	14,9
23 h gr. Beer 4	9. 16	138.53.59	73,1	63.55.30. N	—	15,1
24 d gr. Beer 4.5	9. 17	139. 7.53	83,6	70.41.33. N	—	15,1
α Hydra . . . 2	9. 18	139.26.15	44,0	7.47.47. Z	+	15,0
θ gr. Beer . 3.4	9. 19	139.50.57	61,1	52.34.55. N	—	15,8
λ Leeuw . . . 4	9. 20	140. 4.11	51,7	23.50.35. N	—	15,3
5 ξ idem . . 4	9. 21	140.17.11	48,8	12.10.45. N	—	15,4
ψ Schip 4	9. 23	140.42.43	35,5	39.35.37. Z	+	15,5
ι Hydra . . . 4	9. 30	142.24.13	46,0	0.14.57. Z	+	15,9
o Leeuw . . . 4	9. 30	142.36.52	48,4	10.47.48. N	—	15,9
s idem 4	9. 34	143.37. 5	51,5	24.41.21. N	—	16,1
29 υ gr. Beer 4	9. 37	144. 9.36	66,5	59.58.12. N	—	16,2
μ Leeuw . . . 3	9. 41	145.20.23	51,8	26.56.35. N	—	16,5
ν idem . . . 4.5	9. 47	146.51.37	48,7	10.23.36. N	—	16,7
π idem . . . 4	9. 50	147.24.25	47,7	8.59.35. N	—	16,9
n idem . . . 3	9. 56	149. 6. 7	49,3	17.44. 6. N	—	17,2
15 Sextant . . 4	9. 58	149.24.39	46,1	0.36. 6. N	—	17,2
REGULUS . . . 1	9. 58	149.25.30	48,3	12.56.24. N	—	16,9
γ Hydra . . . 4	10. 1	150.22.32	44,0	11.22. 3. Z	+	17,4
ι gr. Beer . 3.4	10. 5	151.14.38	55,4	43.51.33. N	—	17,5
ζ Leeuw . . . 3	10. 6	151.23. 1	50,0	24.24.36. N	—	17,6

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Janu. 1800.		Jaarlykſche VERANDERING.	middelb. DECLINAT. voor 1 Janu. 1800.			Jaarlykſche VERANDERING.
	U. M.	G. M. S.	S Tien	G. M. S.			S. Tien
γ^1 Schip . . . 4	10. 6	151. 34. 51	37-7	41. 8.15.	Z	+	17,6
γ Leeuw . . . 3	10. 9	152. 13.47	49,9	20.50.55.	N	—	17,7
μ gr. Beer . . 3	10. 10	152.35.27	54,5	42.30. 3.	N	—	17,8
42 μ Hydra . . 3	10. 16	152. 6.16	42,5	15.49. 5.	Z	+	18,0
2 ρ Leeuw . . 4	10. 22	155. 34. 3	47,5	10.20. 0.	N	—	18,2
37 kl. Leeuw 3	10. 27	156. 51.28	51,2	33. 0.42.	N	—	18,4
4 ν Hydra . . 4	10. 40	159.56.29	44,1	15. 8.59.	Z	+	18,3
54 Leeuw . 4-5	10. 45	161. 11.19	49,1	25.48.49.	N	—	18,9
β gr. Beer . . 2	10. 50	162. 21.55	55 3	57.27. 5.	N	—	19,1
α Hydra . . . 4	10. 50	162. 30.34	44,2	17.14. 7.	Z	+	19,1
ϵ gr. Beer . . 2	10. 51	162.48.46	57,8	62.49.40.	N	—	19,1
χ Leeuw . . 4-5	10. 55	163.42.22	46,8	8.24.59.	N	—	19,2
52 ψ gr. Beer 3-4	10. 58	164. 35.23	51,5	45.31.56.	N	—	19,3
β Hydra . . 3-4	11. 2	163. 27.26	44,0	21.44. 0.	Z	+	19,4
δ Leeuw . . 2-3	11. 2	165. 51.41	48,0	21.37. 8.	N	—	19.4
θ Leeuw . . . 3	11. 4	165.55.53	47,6	16.31.19.	N	—	19,4
74 Φ idem . . 4	11. 6	166. 37.23	45,8	2.33 32.	Z	+	19,5
53 ξ gr. Beer 4	11. 7	166. 52. 7	49,0	32.39.16.	N	—	19,5
54 ν idem . . 4	11. 8	166. 54.13	49,1	34.11. 5.	N	—	19,5
δ Hydra . . . 4	11. 9	167. 20. 7	41,9	13.41.45.	Z	+	19,5
σ Leeuw . . 4-5	11. 11	167. 42.11	46,5	7. 7.26.	N	—	19,5
ι idem . . . 4	11. 13	168. 22.16	46,8	11.37.49.	N	—	19,6
14 α Hydra . . 4	11. 15	168. 37.50	45,3	9.45.41.	Z	+	19,6
15 γ idem . . 4	11. 15	168.43.25	44,8	16.35. 4.	Z	+	19,7
τ Leeuw . . . 4	11. 18	169. 24.41	46,3	3.57.29.	N	—	19,7
λ Draak . . 3-4	11. 19	169. 50.28	56,2	70.25 55.	N	—	19,8
ϵ Leeuw . . 4-5	11. 20	170. 1.26	45,9	1.54. 4.	Z	+	19,7
ξ Hydra . . 3-4	11. 23	170. 74.53	44,2	30.44.56.	Z	+	19,8
21 θ idem . . 4	11. 27	171. 38. 7	45,6	8.41.43.	Z	+	19,8
91 υ Leeuw . 4	11. 27	171. 40.35	46,0	0.16.51.	N	—	19,8
27 ζ Hydra . 4	11. 35	173. 40.31	45,3	17.14.17.	Z	+	19,9
χ gr. Beer . . 4	11. 35	173. 51.30	48,5	48.53.23.	N	—	19,9
3 ν Maagd . . 4	11. 36	173. 53.50	46,3	7.39. 7.	N	—	19,9
93 Leeuw . . 4	11. 38	174. 24.44	46,8	21.19.46.	N	—	20,0

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Janu. 1800.		Jaarlykſche VERANDERING.	middelb. DECLINAT. voor 1 Janu. 1800.		Jaarlykſche VERANDERING.
	U. M.	G. M. S.	S.Tien	G. M. S.		S.Tien
β LEEUW . . 2	11. 39	174. 42. 37	45.9	51. 41. 26.	N	— 20,0
β MAAGD . . 3	11. 40	175. 4. 6	46,8	2. 53. 39.	N	— 20,1
β Hydra . . . 4	11. 43	175. 42. 15	45,0	32. 47. 40.	Z	+ 20,0
γ gr. Beer . . 2	11. 43	175. 48. 31	48,1	54. 48. 25.	N	— 20,0
30 ν Hydra . . 4	11. 46	176. 27. 32	45,6	10. 2. 9.	Z	+ 20,0
α Raaf 4	11. 58	179. 31. 47	46,0	23. 36. 40.	Z	+ 20,2
ε idem . . . 3.4	12. 0	179. 57. 53	45,7	21. 30. 17.	Z	+ 20,2
δ gr. Beer . . 3	12. 5	181. 21. 47	45,5	58. 8. 40.	N	— 20,0
γ Raaf 3	12. 6	181. 23. 2	46,2	16. 25. 43.	Z	+ 20,0
η Maagd . . 3.4	12. 10	182. 25. 7	46,0	0. 26. 49.	N	— 20,0
δ Raaf . . . 3.4	12. 20	184. 53. 2	46,6	15. 23. 54.	Z	+ 20,2
β idem 3	12. 24	185. 58. 33	46,9	22. 17. 14.	Z	+ 19,9
K hair v. Beren. 4	12. 25	186. 13. 3	45,1	23. 44. 3.	N	— 20,0
κ Draak . . . 3	12. 25	186. 12. 55	39,5	70. 53. 25.	N	— 19,9
γ Maagd . . . 3	12. 31	187. 52. 58	46,0	0. 20. 58.	Z	+ 19,9
ε gr. Beer . . 2	12. 45	191. 17. 45	41,0	57. 2. 53.	N	— 19,7
δ Maagd . . . 3	12. 46	191. 22. 57	45,7	4. 29. 22.	N	— 19,7
12 't hart v. Kaarl 3	12. 47	191. 39. 35	42,8	39. 24. 8.	N	— 19,6
ε Maagd . . . 3	12. 52	193. 3. 13	45,0	12. 2. 20.	N	— 19,5
ζ idem . . . 3.4	13. 00	194. 53. 59	46,4	4. 27. 55.	Z	+ 19,4
53 Maagd . . 4.5	13. 1	195. 21. 29	47,1	15. 6. 44.	Z	+ 19,3
61 idem . . 4.5	13. 8	196. 59. 27	47,8	17. 11. 24.	Z	+ 19,2
γ Hydra . . . 3	13. 8	197. 1. 9	48,5	22. 6. 33.	Z	+ 19,2
ι Centaurus . . 3	13. 9	197. 20. 44	50,3	35. 39. 3.	Z	+ 19,1
α MAAGD . . . 1	13. 15	198. 40. 2	47,0	10. 6. 43.	Z	+ 19,9
ζ gr. Beer . . 2	13. 16	198. 57. 35	37,0	55. 58. 26.	N	— 19,7
i Maagd . . . 4	13. 16	199. 2. 31	47,3	11. 39. 43.	Z	+ 19,0
ζ idem 3	13. 25	201. 7. 38	46,0	0. 26. 5.	N	— 18,7
ν Centaurus . 4	13. 33	204. 23. 39	53,1	40. 41. 4.	Z	+ 18,3
π Osſenweider 4	13. 38	204. 26. 16	43,3	18. 27. 36.	N	— 18,3
G Centaurus . 4	13. 38	204. 28. 35	51,6	33. 26. 30.	Z	+ 18,3
η gr. Beer . . 2	13. 40	204. 54. 40	36,0	50. 19. 1.	N	— 18,3
30 υ Osſenweider 4	13. 40	204. 57. 38	43,5	16. 47. 52.	N	— 18,2
υ idem . . . 3	13. 45	206. 17. 24	47,0	19. 24. 33.	N	— 18,0

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Jan. 1800. U. M.	G. M. S.	Jaarlykſche VERANDERING. S. Tien	middelb. DECLINAT. voor 1 Jan. 1800. G. M. S.		Jaarlykſche VERANDERING. S. Tien
5 b Centaurus 2-3	13. 55	208.44.25	52,8	35.22.50.	Z	+ 17,6
κ Draak . . . 3	13. 59	209.44.39	24,4	65 20. 8.	N	— 17,4
κ Maagd . . . 4	14. 2	210.33.34	47,7	9.20. 2.	Z	+ 17,3
99 ε idem . . . 4	14. 6	211.23. 2	46,9	5. 1.56.	Z	+ 17,2
κ Osſenweider 4	14. 6	211.34.34	32,2	52.43.59.	N	— 17,1
Arcturus . . 1	14. 6	211.38. 3	40,8	20.13.55.	N	— 18,9
λ Maagd . . . 4	14. 8	212. 4.31	48,3	12.26.23.	Z	+ 17,0
λ Osſenweider 1	14. 9	212.11.34	34,6	47. 0.44.	N	— 17,0
ι idem . . . 4	14. 9	212.16. 7	32,2	52.17.44.	N	— 17,0
φ Maagd . . . 4	14. 18	214.28.33	46,3	1.19.18.	Z	+ 16,6
9 Osſenweider 4	14. 18	214.35.46	31,0	52.46.55.	N	— 16,5
ξ idem . . . 4	14. 23	215.48. 2	38,9	31.15.25.	N	— 16,3
γ idem . . . 3	14. 24	216. 0.17	36,5	39.11 25.	N	— 16,2
5 a kl. Beer . 4	14. 28	217. 1.47	— 4,6	76.35. 8.	N	— 16,0
29 π Osſenw. 3-4	14. 31	217.49.52	42,2	17.17. 5.	N	— 16,0
ζ Osſenweider 3	14. 32	217.54. 1	42,9	14.35.44.	N	— 15,9
107 μ Maagd 4	14. 33	218. 7.53	47,0	4.46.41.	Z	+ 15,8
109 V. BergMen. 4	14. 36	219. 2. 7	45,4	2.44.47.	N	— 15,6
ε Osſenweider 3	14. 36	219. 3.46	39,4	27.55.35.	N	— 15,6
α² Weegsch. 2-3	14. 40	219.57.30	49,5	15.11.58.	Z	+ 15,1
37 ξ Osſenweid. 4	14. 42	220.32.19	41,5	19.56.21.	N	— 15,3
δ Weegſchaal 4	14. 50	222.34.26	47,8	7.42.46.	Z	+ 14,8
β kl. Beer . . 3	14. 51	222.51.54	— 4,9	74.58.22.	N	— 14,6
γ Schorpioen 3-4	14. 52	223. 5.50	52,2	24.19. 1.	Z	+ 14,7
β Osſenweider 3	14. 54	223.36. 7	34,0	41.11.16.	N	— 14,5
α Weegſchaal . 4	15. 1	225.12.33	50,9	19. 1.16.	Z	+ 14,2
β idem . . .2-3	15. 6	226.33.53	47,4	8.27.59.	Z	+ 13,8
δ Osſenweider 3	15. 7	226.51.33	36,2	34. 4.13.	N	— 13,7
δ Wolf . . . 4	15. 8	227. 1.31	58,2	39.54.37.	Z	+ 13,7
ε Weegſchaal . 3	15. 13	228.20.31	48,5	9.35 27.	Z	+ 13,4
51 μ Osſenweid. 4	15. 17	229.13.55	34,1	38. 5.13.	N	— 13,1
11 γ¹ kl. Beer 4	15. 17	229.20.20	— 2,4	72.32.58.	N	— 13,1
β Kroon . . . 4	15. 20	229.53.44	37,2	29.48.13.	N	— 13,0
ε Draak . . . 3-4	15. 20	230. 7.30	19,8	59.40.13.	N	— 12,9

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Janu. 1800.			Jaarlykſche VERANDERING.	middelb. DECLINAT. voor 1 Janu. 1800.			Jaarlykſche VERANDERING.
	U.	M.	G. M. S.	S. Tien	G.	M.	S.	S. Tien
ϑ Ophiucus . . 3	16.	4	240.58.7	47.1	3.	9.57.	Z +	9,8
18 Scorpioen . 4	16.	5	241.11.22	48,4	7	49.30.	Z +	9.7
ε Ophiucus . . 3	16.	8	241.56.15	47,4	4.	11.29.	Z +	9,5
σ Scorpioen . 3.4	16.	9	242.15.47	54,4	25.	5.47.	Z +	9,4
γ Hercules . . 3	16.	13	243.16.28	39,7	19.	38. 0.	N —	9,1
τ Hercules . . 4	16.	14	243.25.50	26,9	46.	47.55.	N —	9,0
ANTARES . . . 1	16.	17	244.17.25	54,7	25.	58.23.	Z +	8,6
Φ Ophiucus . 4	16.	20	244.55.38	51,3	16.	9.38.	Z +	8,5
20 A idem . . 4	16.	21	245.12.25	45,2	2.	26. 5.	N —	8,5
η Draak . . 3.4	16.	21	245.19.40	11,9	61.	58.14.	N —	8,4
ζ Hercules . . 3	16.	22	245.24.23	38,8	21.	56.10.	N —	8,3
29 h idem . . 4	16.	23	245.48.45	42,2	11.	55.48.	N —	8,3
τ Scorpioen. 3.4	16.	23	245.51.42	55,6	27.	47. 3.	Z +	8,3
ζ Ophiucus . 2.3	16.	26	246.32.19	49,4	10.	8.51.	Z +	8,0
σ Hercules . . 4	16.	28	246.54.53	28,9	42.	51.30.	N —	8,0
15 A Draak . . 4	16.	28	247. 6.30	— 2,6	69.	11.59.	N —	7,8
ζ Hercules . 3.4	16.	34	248.26.21	34,5	31.	58.25.	N —	7,4
η idem . . 3.4	16.	36	249. 0.37	30,8	39.	18.44.	N —	7,2
ε Scorpioen . . 3	16.	37	249.18.25	57,8	33.	54.41.	Z +	7,1
μ^1 idem . . . 3	16.	38	249.35. 3	60,5	37.	41.15.	Z +	7,1
μ^2 Scorpioen . 4	16.	39	249.42.12	60,5	37.	39.20.	Z +	7,0
25 i Ophiucus . 4	16.	45	251. 8.23	42,5	10.	30.28.	N —	6,5
27 κ idem . . 4	16.	48	252. 3.14	42,8	9.	41.53.	N —	6,2
ε Hercules . . 3	16.	53	253. 9.40	34,5	31.	13.52.	N —	5,8
η Ophiucus . . 3	16.	59	254.43.41	51,5	15.	27.45.	Z +	5,0
21 μ Draak . 4.5	17.	1	255.18. 2	18,6	54.	44 24.	N —	5,1
α HERCULES, . 3	17.	6	256.22.56	40,9	14.	37.50.	N —	4,6
δ idem . . . 3	17.	7	256.42.17	37,0	25.	5.14.	N —	4,6
ε kl. Beer. . . 4	17.	7	256.44. 0	— 99,0	82.	20.27.	N —	4,6
π Hercules . 3.4	17.	8	257. 1.18	31,3	37.	2.41.	N —	4,5
22 ζ Draak . . 2	17.	8	257. 3.24	+ 2,9	66.	57.40.	N —	4,5
ρ Ophiucus . . 4	17.	9	257.15.16	53,5	20.	52.48.	Z +	4,5
53 ν Slang . . 4	17.	10	257.23.36	50,4	12.	37.38.	Z +	4,4
θ Ophiucus . . 4	17.	10	257.26. 1	55,1	24.	46.57.	Z +	4,4

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Janu. 1800.		Jaarlykſche VERANDERING.	middelb. DECLINAT. voor 1 Janu. 1800.		Jaarlykſche VERANDERING.
	U. M.	G. M. S.	S Tien	G. M. S.		S. Tien
∫ Sagittarius . 3	18. 8	272. 2.42	57.5	29.53.46.	Z —	0,7
20 ε idem . 2.3	18. 11	272. 43.21	59,7	34.27.36.	Z —	0,9
ν Slang . . . 3.4	18. 11	272.44.27	46,4	2.56. 8.	Z —	0,9
109 Hercules . 4	18. 15	273.47.39	38,1	21.41.31.	N +	1,2
λ Sagittarius . 3	18. 16	273.54.16	55,7	25.30.54.	Z —	1,3
ι m Arend . . 4	18. 24	276. 4.48	49,0	8.22.14.	Z —	2,1
44 χ Draak . . 4	18. 25	276. 9.12	— 17,8	72.38.32.	N +	2,1
α Lyra 1	18. 30	277. 32.28	30,4	38.36.25.	N +	3,1
Φ Sagittarius 3.4	18. 33	278. 17.18	56,3	27.10.54.	Z —	2,8
l Arend 4	18. 37	279. 8.20	47,7	4.56.48.	Z —	3,2
23 ∂ kl. Beer . 4	18. 36	279.10.32	- 283,0	86.33.41.	N +	3,2
111 Hercules . 4	18. 38	279.32.50	39,6	17.58.26.	N +	3,3
β Lier . . . 2.3	18. 43	280.40.24	33,0	33. 8.25.	N +	3,7
σ Sagittarius 2.3	18. 43	280.42.44	55,8	26.31.43.	Z —	3,7
θ² Slang . . 3.4	18. 46	281. 34. 4	44,8	3.57.23.	N +	4,0
∂² Lier . . . 3	18. 47	281.52.42	31,5	36.39.14.	N +	4,1
o Draak . . . 4	18. 48	282. 3.34	13,2	59. 8.50.	N +	4,2
ζ Sagittarius . 3	18. 50	282.28.13	57,5	30. 8.54.	Z —	4,3
ε Arend . . 3.4	18. 51	282.38.12	40,9	14.48.32.	N +	4,3
12 i idem . . 4	18. 51	282.44.65	48,1	6. 0.23.	Z —	4,1
γ Lier 3	18. 51	282.51.55	33,7	32.25.29.	N +	4,4
ο Sagittarius . 4	18. 53	283.10.17	53,9	22. 1. 4.	Z —	4,5
50 Draak . . 4.5	18. 53	283. 11. 5	— 27,8	75.11.24.	N +	4,6
τ Sagittarius . 4	18. 54	283.36 34	56,4	27.56.40.	Z —	4,7
λ Antinoüs . 3.4	18. 56	283.54.31	47,9	5.10. 9.	Z —	4,8
ζ Arend . . 3.4	18. 56	284. 3.15	41,4	13.34 42.	N +	4,9
52 υ Draak . 4.5	18. 57	284.11.50	— 10,4	71. 1.38.	N +	4,9
π Sagittarius . 3	18. 58	284.27.49	53,6	21.19.29.	Z —	4,9
∫ Draak . . . 3	19. 12	288. 6.59	0,6	67.18.35.	N +	6,2
κ Zwaan . . . 4	19. 12	288. 7. 5	20,7	53. 0.22.	N +	6,2
∂ Arend . . . 3	19. 15	288. 51. 6	45,2	2.43.45.	N +	6,4
50 τ Draak 4.5	19. 19	289.49.36	— 15,5	72.58.48.	N +	6,8
π idem . . . 4	19. 20	289. 54.12	5,0	65.19.51.	N +	6,8
ζ Vos 4	19. 20	290. 5.43	37,5	24.16.19.	N +	6,9

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Janu. 1800.			Jaarlykſche VERANDERING.	middelb. DECLINAT. voor 1 Janu. 1800.			Jaarlykſche VERANDERING
	U. M.	G. M. S.		S. Tien.	G. M. S.			S. Tien
β Zwaan. . . 3	19. 23	290.39.53		36,3	27.32.58.	N	+	7,1
μ Arend. . . . 4	19. 24	291. 4.42		43,7	6.58. 5.	N	+	7,1
κ idem . . 3.4	19. 26	291.31.54		48,5	7.27.32.	Z	—	7,3
ι Antonoüs . 3.4	19. 26	291.35.31		46,3	1.42.59.	Z	+	7,3
θ Zwaan . . . 4	19. 31	292.46.16		24,1	49.45.52.	N	+	7,7
α Pyl . . . 4	19. 31	292.47.25		40,3	17.33.55.	N	+	7,7
β idem . . 4	19. 32	293. 0.56		40,3	17. 1.31.	N	+	7,8
61 σ Draak. 4.5	19. 33	293.10.29		— 2,9	69.19.32.	N	+	7,9
γ AREND . . 3	19. 37	294.11. 8		42,5	10. 8.18.	N	+	8,4
δ Zwaan . . 3	19. 39	294.40.46		28,1	44.38.59.	N	+	8,3
α AREND . 1.2.	19. 41	295.15.15		43,8	8.21.13.	N	+	9,2
η Antinoüs . . 3	19. 42	295.34.13		46,0	0.30.19.	N	+	8,6
β AREND . . 3	19. 45	296.22.15		44,1	5.55.15.	N	+	8,5
γ Pyl . . . 4	19. 50	297.27.50		39,9	18.57.40.	N	+	9,2
δ Antinoüs . 3.4	20. 1	300.14.41		46,5	1.24.11.	Z	—	10,1
α¹ CAPRICORN. 3.4	20. 7	301.38.12		49,9	13. 6.47.	Z	—	10,6
α² idem . . 3	20. 7	301.44. 7		50,0	13. 9. 3.	Z	—	10,8
30 c_1 Zwaan . 3	20. 7	301.45.10		28,2	46.13. 6.	N	+	10,5
β Capricorn. 3	20. 10	302.26.19		50,7	15.23.58.	Z	—	10,9
γ Zwaan . . 3	20. 15	303.45.45		32 3	39.37.27.	N	+	11,1
μ ¹ Zwaan . 4	20. 21	305.18.18		36,7	29.42.40.	N	+	11,5
ε Dolphyn . 4	20. 24	305.54.47		43,1	10.38. 4.	N	+	11,7
ζ idem . . 4	20. 26	306.29.20		42,1	13.59.42.	N	+	11,9
71 Arend . . 4	20. 28	307. 0. 1		46,5	1.47.30.	Z	—	12,0
β Dolphyn . . 3	20. 28	307. 2.29		42,2	13.54.35.	N	+	12,0
α Dolphyn . 3	20. 30	307.35.11		41,8	15.13. 0.	N	+	12,2
δ idem . . 3.4	20. 34	308.31.47		42,1	14.22. 1.	N	+	12,5
α ZWAAN . . 2	20. 35	308.39.10		30 5	44.34.21.	N	+	12,6
ε Waterman . 4	20. 37	309.12.30		48,6	10.13. 0.	Z	—	12,6
γ Dolphyn . 3.4	20. 37	309.20.40		41,8	15.24.50.	N	+	12.7
ι Zwaan . . . 3	20. 38	309.31.45		36,0	33.13.41.	N	+	13,2
54 λ idem . 4	20. 40	309.54.13		34,9	35.45.45.	N	+	12,8
η Cepheus . 4	20. 41	310.17.49		18,4	61. 2.46.	N	+	12,9

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Janu. 1800.		Jaarlykſche VERANDERING.	middelb. DECLINAT. voor 1 Janu. 1800.		Jaarlykſche VERANDERING.
	U. M.	G. M. S.	S.Tien	G. M. S.		S.Tien
μ Waterman . . 4	20. 42	310.27.47	48.6	9.43.20.	Z —	13,9
58 ν Zwaan . . 4	20. 50	312.25.45	33,4	40.24.45.	N +	13,5
62 ξ idem . . 4	20. 58	314.24.51	32,6	43. 8.10.	N +	14,0
γ kl. Paard . 4	21. 1	315. 9. 6	43,7	9.20.10.	N +	14,2
ζ Zwaan . . . 4	21. 4	316. 6.17	38,3	29.24.52.	N +	14,4
δ kl. Paard . . 4	21. 5	316.11. 1	43,8	9.12.29.	N +	14,4
α idem . . . 3.4	21. 6	316.27.10	45,1	4.25.52.	N +	14,5
τ Zwaan . . . 4	21. 7	316.42. 9	35,6	37.11.56.	N +	14,5
57 σ idem . . 4	21. 10	317.23.27	35,2	38.33.51.	N +	14,7
ε Pegaſus . . . 4	21. 13	318.12.26	41,5	18.57.27.	N +	14,9
β kl. Paard . . 4	21. 13	318.14.20	44,7	5.57.59.	N +	14,9
α Cepheus . . 3	21. 14	318.26.56	21,4	61.44.31.	N +	15,0
ζ Capricorn. . 4	21. 15	318.48.15	51,7	23.15.53.	Z —	15,1
3 Waterman . 3	21. 21	320.15.13	47,3	6.26.28.	Z —	15,4
ι Capricorn. . 4	21. 26	321.27.47	50,7	20.21. 0.	Z —	15,7
3 Cepheus . . 4	21. 26	321.30.27	12,5	69.41. 1.	N +	15,7
ξ Zwaan . . . 4	21. 26	321.37. 0	33,7	44.42.52.	N +	15,7
γ Capricorn. . 3	21. 29	322.14.46	49,9	17.33.19.	Z —	15,8
ν of μ Z. Vis 4	21. 33	323.14.44	54,1	33.55.31.	Z —	16,0
ι Pegaſus . . . 3	21. 34	323.35.19	44,2	8.57.57.	N +	16,1
π¹ Zwaan . . 4	21. 35	323.44.55	31,7	50.17. 4.	N +	16,1
ω idem . . 3.4	21. 35	323.48 0	29,8	27.50.48.	N +	16,2
κ Pegaſus . . 4	21. 36	325.53.16	40.6	24.44. 2.	N +	16,2
10 θ Zuid. Vis 4	21. 36	323.59.40	53,4	31.48.54.	Z —	16,2
δ Capricorn. . 3	21. 36	323.59.40	49,7	17. 1.28.	Z —	16,2
γ Kraan Vogel 3	21. 42	325.26.24	55,0	38.17.50.	Z —	16,5
α WATERMAN. 3	21. 55	328.52.26	46,0	1.16.58.	Z —	17,0
ι idem 4	21. 56	328.54.14	48,8	14.49.52.	Z —	17,1
14 μ of ιZ. Vis 4	21. 57	329. 9.58	53,0	33.57.14.	Z —	17,2
24 ι Pegaſus . .4	21. 58	329.25.31	41,4	24.22.30.	N +	17,2
10 θ Pegaſus . 4	22. 0	330. 1.35	45,1	5.13.22.	N +	17,4
21 ζ Cepheus 4.5	22. 4	330.58.54	30,9	57.13.22.	N +	17,5
θ Waterman . 4	22. 6	331. 33.58	47,5	8.46.18.	Z —	17,6

NAAMEN en GROOTE der Sterren.	middelbaare ASCENS. RECTA voor 1 Janu. 1800.			Jaarlykſche VERANDERING.	middelb. DECLINAT. voor 1 Janu. 1800.			Jaarlykſche VERANDERING.
	U.	M.	G. M. S.	S. Tien.	G.	M.	S.	S. Tien
γ Waterman . 3	22.	0	331.55.10	32,0	56.	3.20.	N	+ 17,6
ι Cepheus . . . 4	22.	11	332.49.44	46,1	2.23.16.	Z	—	17,8
π Waterman 4.5	22.	15	333.45.45	46,0	0.22.12.	N	+	18,0
ζ idem . . . 4	22.	19	334.37.52	46,2	1. 2.11.	Z	—	18,1
β Zuid. Vis . . 3	22.	20	335. 1.17	51,6	33.21.41.	Z	—	18,1
5 Lézard . . 4.5	22.	21	335.18.13	37,1	46.41.11.	N	+	18 2
27 δ Cepheus 4.5	22.	22	335.26.15	32,9	57.23.36.	N	+	18,2
7 Lézard . . . 4	22.	23	335.45.55	36,5	49.15.34.	N	+	18,3
π Waterman . 4	22.	25	336.16. 4	46,2	1. 8.31.	Z	—	18,3
γ of ε Zuid. Vis 4	22.	30	337.23.23	51,5	28. 4.38.	Z	—	18,5
ζ Pegaſus . . . 3	22.	32	337.52.16	44,8	9.47.36.	N	+	18,6
ν idem 3	22.	34	338.24.59	43,1	29.10.49.	N	+	18,7
λ idem 4	22.	37	339.13.35	47,1	22.29.15.	N	+	18,9
μ idem . . . 4	22.	40	340. 5.19	42,0	23.33. 2.	N	+	18,8
λ Waterman . 4	22.	42	340.32.31	47,0	8.38.18.	Z	—	18,9
ι Cepheus . . . 4	22.	43	340.38.42	31,6	65. 9. 9.	N	+	18,9
δ Waterman . 3	22.	44	341. 0.15	48,6	16.52.41.	Z	—	18,9
Fomalhaut . . 1	22.	47	341.38.24	50,2	30.40.39.	Z	—	18,8
ο Androm. . 3.4	22.	53	343.11.11	41,0	41.15.21.	N	+	19,2
β Visſchen . . 4	22.	54	343.25.25	45,7	2.44.58.	N	+	19,2
β Pegaſus . . . 2	22.	54	343.31.21	43,0	27. 0. 8.	N	+	19,2
π idem . . . 2	22.	55	343.42. 0	44,5	14. 8. 3.	N	+	19,4
88 c2 Waterm. 4	22.	59	344.41.20	48,2	22.15. 6.	Z	—	19,3
ρ idem . . 4.5	23.	4	345 59.18	46,7	7. 7.19.	Z	—	19,5
γ Visſchen . . 4	23.	7	346.41.53	45,8	2.11.40.	N	+	19,5
16 λ Androm. 4	23.	28	351.57.10	43,1	45.22.31.	N	+	19,8
17 ι idem . . . 4	23.	28	352. 5.24	43,5	42. 9.48.	N	+	19,9
19 κ idem . . 4	23.	30	352.38 51	43,6	43.13.41.	N	+	19,9
γ Cepheus . 3.4	23.	31	352.48.43	35,5	76.30.57.	N	+	19,9
29 Visſchen . . 5	23.	52	357.53.33	46,1	4. 8.23.	Z	—	20,0
33 Visſchen . 4	23.	55	358.46.22	46,1	6.49.29.	Z	—	20,0
α Androm. 2.3	23.	58	359.31. 5	45,0	27.59.27.	N	+	20,6
β Caſſiopea . 2.3	23.	59	359.38.41	46,7	58. 2.47.	N	+	20,0

BLADWYZER

DER ZAAKEN, IN DIT WERK BEGREPEN.

Waarby men nog gevoegd heeft de Uitlegging van verſcheiden Kunstwoorden, wier Verklaring in hetzelve niet gevonden wordt.

NB. *De aangehaalde getallen wyzen de §§, en niet de bladzyden aan.*

A.

AANTREKKINGSKRACHT noemt men de kracht met welke alle Ligchaamen naar de Aarde daalen; men noemt dezelve ook wel *gewigt*, *zwaarte*; zy is de uitwerking van eene algemeene kracht, die in de gantſche Natuur verſpreid is, en in alle ligchaamen zowel als in de kloot der Aarde berust: zy is te gelyk met de *middenpuntvliedende kracht*, de oorzaak van de beweging der Planeeten om de Zon. Aantrekkingskracht der Aarde op de Maan, §135. der Maan op de Wateren der Zee, 195.

AARDE is de derde Planeet van de Zon af; haar afſtand en omloopstyd, 66. grootte en middenlyn, 67, 68. Sattelliet, zie MAAN. Algemeene beginſelen van derzelver beweging, 6,-132. het vlak van haar' loopkring, 70. jaarlykſche beweging, 70—86. dagelykſche beweging, 87. helling van haar' As, 92. blyft altoos Paralel aan zichzelve, 92.

AARD-GLOBE, Cirkels die op dezelve gevonden worden, 45. nieuwe Conſtructie, 69—132. oude Conſtructie, 202. vergelyking der beide Conſtructiën, 201—207. derzelver gebruik, 267—421, 424—433, 436—447, 449, 453, 460—465, 475, 477—481, als een *Tellurium* te gebruiken, 308—314, 443—445.

AARDRYKSKUNDE, Aardrykskundige Meridiaan, 118. verband tusſchen Aardryks- en Sterrekunde, 354. en volg.

ACRONISCHE *Op-* en *Ondergang*, 167, 347, 458.

AFKLIMMING (ſchuinſche), is de afſtand tusſchen het Nachtevening-punt, en het punt van den *Equator*, dat met een Hemellicht tegelyk ondergaat; het is de ſom of het verſchil van de rechte klimming en het *Ascenſionaal* verſchil, 386, 474.

AFMETINGEN der Planeeten, 68. van de Aarde, 68.

AFSTANDEN, afſtand van het *Zenith*, 42. Afſtand der Nachtevening van de Zon is geenzins de afſtand der Zon van de Nachtevening, 375. Hoe men de afſtanden der Planeeten van de Zon meet, 254, 256. Afſtanden van alle de Planeeten van de Zon, 66. Afſtanden der Hemellichten van de Aarde, hoe

hoe zeer onderſcheiden, ſchynen egter dezelvde te zyn, wanneer wy ons de Sterren als in eene holle kloot geplaatst voorſtellen, 80. Afſtanden der Satellieten, worden op Pl. V gevonden. Afſtanden van de Maan tot de Sterren geeven de Lengte op Zee, 382. den Afſtand te vinden tusſchen twee plaatſen, 387.

APWYKING van een' Zonnewyzer, 531.

ALMANAK, 149—167. verdeeling der jaaren, 149. Maanden, Weeken en Dagen, 160—162. *Juliaanſche* Almanak, 151. *Gregoriaanſche* Almanak, 150. Eeuwigdurende Almanak, *bladz.* 102. Tab. III—VI.

ALMUCANTARAT noemt men eenen Paralel aan den *Horiſon* getrokken Cirkel, 32.

AMPHISCII, zie TWEEZYDISCHADUWIGEN.

AMPLITUDO (de) der Zon of Sterren te vinden, 384, 474, 503.

AMPLITUDO *ortiva* et *occidua*, zie *Azimuth*.

ANGULUS POSITIONIS (de) te vinden, 390.

ANNOMALIE, waare 61. middelbaare, 61.

ANTARCTICUS zie ARCTICUS.

ANTICHONES zie TEGENVOETERS.

ANTÆCII noemt men die bewoners der Aarde, welken onder denzelvden *Meridiaan* woonen, en dezelvde *Breedte* hebben, doch de eene ten *Noorden* en de andere ten *Zuiden* van den *Equator* woonen; zy tellen hunnen middag en de andere uuren van den dag op hetzelvde oogenblik, doch de Winter van den eenen heeft plaats als de andere Zomer heeft, gelyk het voor den eenen Lente is als het voor den anderen Herfst is; de Sterren, welken de eenen altoos zien, vertoonen zich nooit voor de anderen, enz.

APHELIUM, 58, beweging van het *Aphelium*, 58.

APOGEUM der *Zon* (lengte van het) is de Plaats der *Ecliptica*, in welke de Aarde op het verst van de Zon af is. Der *Maan*. 138, 200. beweging van hetzelve, 200.

APSIDEN, 58. lyn der *Apſiden*, 58.

AQARIUS, zie WATERMAN.

ARCTICUS, de *Polus Arcticus* is de Noordpool, en de *Polus Antarcticus* is de Zuidpool der waereld.

ARGUMENT van Breedte, 191.

ARIES, zie RAM.

ARMILLARIS, zie SPHEER.

As, lyn rondom welke eene beweging geſchied, 6, 88. As van een' Cirkel, 4. As der Aarde, 83, 89. De As der Aarde altoos evenwydig met zichzelven, 90—92.

ASCENSIONAAL VERSCHIL, zie VERSCHIL.

ASCENSIO OBLIQUA, zie SCHUINE KLIMMING.

ASCENSIO RECTA, zie RECHTE KLIMMING.

ASCH, zie SCHADUWLOOZEN.

ASPECT, ſtand eener Planeet, ten opzichte van eene andere, zoodanigen zyn de *quadratuuren* en de koppelingen.

AURORA of DAGERAAD, zie SCHEMERLICHT.

AVONDSTER, 410. is dezelvde als de MORGENSTER, 410.

AZIMUTH, 113. het Azimuth eener Ster aan den Hemel te meten, 229. hetzelve op den Horiſon der Globe te vinden, 230, 327, 450. Den tyd te vinden, dat de Zon een zeker *Azimuth* moet hebben op een' gegeeven Dag, 408, 484.

B.

BEER, gr. Beer, 228. kl. Beer, 101.

BEGINSELEN (algemeene) der Sfeheer. 1—45. van den loop der Planeeten, 46—68. van de beweging der Aarde 69—132. van den loop der Maan, 133—142. van de ſchynbaare beweging des Hemels, 208—258.

BLADWYZER.

BENEDEN *Planeeten*, 85.

BEWEGING (dagelykſche) is het eerſte van alle verſchynſelen, die zich ter waarneming opdoen, 222, 231. Jaarlykſche beweging der Zon, 244. is ſchynbaar en wordt veroorzaakt door de beweging der Aarde, 249. Uurbeweging der Maan, 136. beweging der knoopen van de Maan, 140. der *Apſiden*, 200. beweging van de knoopen der Planeeten, 64. van derzelver *Apſiden*, 58. van den As der Aarde, 90—92. ſchynbaare beweging des Hemels, 209. algemeene beſchouwing van dezelve, 208—260.

BOL of Spheer wordt door de beweging van een' Cirkel om zyn' As geboren, 4. zyn middenlyn, 5. Poolen en As, 6. *radius* of ſtraal, 5.

BOOGEN (halve Dagboogen) 30. de Uurhoek van een Hemellicht is by deszelfs *Op-* en *Ondergang* gelyk aan den *Halven Dagboog*, 502.

BOVEN *Planeeten*, 85.

BREEDTEN (*Geographiſche*) 120. zie *Hoogte van den Pool*. Breedten der Hemellichten, 105. Breedte-Cirkel, 82. zyn gebruik, 298. om den *Op-* en *Ondergang* der Zon en de Lengte van Dag en Nacht te vinden, 300—322. hoe het gebrek eens *Breedte-Cirkels* op de Globe van ADAMS te vergoeden, 436. *Geocentriſche* en *Heliocentriſche* Breedte, 81. Breedte der Maan, 191. te vinden alle plaatſen, die op dezelvde Breedte gelegen zyn, 366, 467. de Breedte van eene plaats te vinden, alwaar de langſte Dag van eene gegeeven Lengte is, 404, 480. de Breedte eener plaats, door middel van de Declinatie der Sterren te vinden, 369. door middel van twee Sterren, welken op 't zelvde oogenblik in denzelvden Verticaal ſtaan, 516.

BYSCHADUWE, 181.

C.

CANCER, zie KREEFT.

CAPRICORNIUS, zie STEENBOK.

CIRKEL, zyne verdeeling in graaden, 13. Pool van een' Cirkel, 22. As van een' Cirkel, 11, 15. Groote en kleine Cirkels, 8, 29—33. de groote Cirkels gaan door het middenpunt der Kloot, 9. deelen elkander altoos in twee gelyke deelen, 9. hunne verdere eigenſchappen, 11, 12, 13, 24, 25. van de kleine Cirkels worde in de Drieboeksmeting geen gebruik gemaakt, 13. voornaamſte Cirkels der Spheer, zie *Horiſon*, *Equator*, *Meridiaan*, *Ecliptica*, *Coluri*, *Tropici*, *Parallele-Cirkels*, *Pool-Cirkels*, *Uur-Cirkel*, *Declinatie-Cirkels*, *Breedte Cirkels*, 27. Cirkel van *Meton*, 137. 144. Maan-Cirkel en Guldegetal, 137, 144. Zonne Cirkel, 145. Cirkel van *Indictie*, 147. Cirkels, die op de *Hemel-Globe* gevonden worden, 44. Cirkels van de *Aard-Globe*, 45.

COLURI, zie JAARGETYDENEDEN.

COMMUTATIE is de hoek in het middelpunt der *Zon* gevormd, tuſſchen de plaats der *Aarde*, en de plaats van eene Planeet, tot de *Ecliptica* overgebragt.

COMPLEMENT en SUPPLEMENT, 17, 18 Men noemt ook ſomtyds *Supplement*, hetgeen aan een' boog ontbreekt om 360° uit te maaken; in dien zin noemt men het *Supplement van den Knoop der Maan*, 188.

CONJUNCTIE der Planeeten, 84. bovenſte en benedenſte Conjunctie, 85. der Maan of nieuwe Maan, 136. Conjunctiën der Maan door middel der *Epaëlis* te berekenen, 159. handelwyze om dezelve nauwkeuriger door de *Sterrekundige Epaëlis* te berekenen, 185.

CORRESPONDENTEN, wat die zyn, 354.

71, 75, 191. nadere beſchryving der Ecliptica, 72, 76—79. Twaalf Teekens der Ecliptica, 73. worden door de talletters O, I, 2, 3. enz. onderſcheiden 74. den ſtand der Ecliptica boven den Horiſon te vinden, 413, 483.
EENZYDSSCHADUWIGEN, bewooners der gemaatigde Luchtſtreek, 100.
EERSTEN *Meridiaan*, 119. (verſchil in de plaatſing, van den) 119.
EEUWIGDUURENDE ALMANAK, *bladz.* 102 Tab. III—VI.
ELLIPS; de loopkring der Planeeten zyn Ellipſen, 47. ook die der Aarde, 70. en der Maan, 134.
ELONGATIE, is de hoek, onder welken wy den afſtand eener Planeet van de *Zon* zien, wanneer deze hoek tot het vlak van de *Ecliptica* wordt overgebragt.
EMBOLISMISCHE Maaneſchynen, zie *Toegevoegde* Maaneſchynen.
EPACTEN van den Almanak, 152. Sterrekundige Epacten, 184. Tafelen der Epacten, *bladz.* 102, 134. de Epacta van een Jaar te vinden, 159. gebrek in de Epacten, 183. Epacten van Maanden, 184.
EQUANT, een woord van de oude Sterrekunde. Het is een Cirkel, die zoodanig geplaatst is, dat de beweging eener Planeet rondom het middenpunt van dien Cirkel eenpaarig zy.
EQUATOR, zyne bepaaling, 93. zyne Poolen zyn de Poolen der Aarde, 101. zyne *Paralellen*, 30. Equator der Aarde, 95. vlak van den Equator der Aarde, 101. dient om van dezelve de Breedte te tellen, 120. gelyk ook de Declinatie, 102. Equator der nieuwe Globe, 95. Equatoriaale Zonnewyzer, 526.
EQUINOCTIAALE lyn, 93. Equinoctiaale Zonnewyzer, 526.
EVENAAR, zie EQUATOR.
EVENWYDIGHEID van den As der Aarde, 90—92. Evenwydigheid der gezichtsſtraalen, zie *Paralaxis* der vaste Sterren.

F.

FEESTEN (beweegbyke) 142. Paaschfeest, 156. den Tyd van het Paaschfeest te vinden, 159.

G.

GEBRUIK *der Globen*, 267—546.
GEOCENTRISCHE Lengte en Breedte der Planeeten, is haare Lengte en Breedte uit de Aarde gezien, 77, 81.
GEOGRAPHIA, zie AARDRYKSKUNDE.
GESTERNTEN, zie Sterrebeelden.
GEVOLGEN uit de beſchouwing van de Cirkels der Spheer afgeleid, 35.
GLOBEN, algemeene bepaaling, 1. Nieuwe Conſtructie der Aard-Globe vereenigd als 't waare in zich beide de *Hemel-* en *Aard-Globe*, 2. Beſchryving van deze nieuwe Conſtructie, 69—132. gebruik dezer Globe, 267—421. gebruik der *Hemel-* en *Aard-Globe* van ADAMS, 422—492. gebruik der Globe in de klootſche Driehoeksmeting, 500—519. gebruik der Globe in de Zonnewyzerskunde, 520—546.
GNOMONICA, zie *Zonnewyzerskunde*.
GRAAD is het 360ste gedeelte van een' Cirkel, 13. Graaden der Aarde, 119, 120. Graaden van Lengte zyn niet even groot, 388. haare grootte in Mylen, *bladz.* 296. den graad des Equators die in den Meridiaan ſtaat te vinden, 406, 482, 519.
GREGORIUS (verbeteringen in den Almanak, door Paus) 150.
GROOTHEDEN der Planeeten, 66.

BLADWYZER

I.

JAAR (burgerlyk) 149. Zonne- of Keerkringjaar, 149.
INDICTIE, 147.
JAARGETYDEN, zie *Saifoenen.*
JAARGETYD-SNEDEN der Nachtevenlingen, 96. en Zonneſtanden, 98.
JAARTELLING (GEMEENE) 149, 150.
JUPITER, de vyfde Planeet van de *Zon* af; zyn afſtand en omloopstyd, 66, 67. middenlyn en grootte, 68. Satellieten, zie Pl. V.

K.

KEERKRINGEN, 99.
KLEINE CIRKELS, zie *Cirkels.*
KLIMMEND. Klimmende teekens, zyn die, welken de Zon gedurende den Winter en de Lente doorloopt, door zich alle dagen meer en meer te verheffen, 97.
KNOOPEN der Planeeten, 63, 64, 81. Beweging der Knoopen, 64. Knoopen der Maan, 139. wien noemt die Drakenhoofd. Drakenſtaart, 139. hunne omloop, 140.
KRACHT (middelpuntige) zie *Aantrekkingskracht.*

L.

LENGTEN der Zon, 74. de Lengte der Zon gegeeven zynde, derzelver rechte klimming te vinden, 508. der Planeeten, 74, 77. Geocentriſche en Heliocentriſche Lengte, 77. tot de Ecliptica overgebragte Lengte, 83. dezelve op de Globe aan te wyzen, 329, 451 Aardſche of *Geographiſche* Lengten, 119. van waar zy gerekend worden, 119. zy worden door de Uurhoeken gevonden, 281. en door de Zon Eclipſen en afſtanden van de Maan en Sterren berekend, 379—383. dezelven op de Globe te vinden, 293, 432. Lengte der Sterren, 105.
LETTEREN (Zondags) 146. Handelwyze om dezelven te vinden, 146.
LOOPKRING is de Cirkel of de kromme lyn, die eene Planeet beſchryft, 57. vallen niet in hetzelvde vlak met den loopkring der Aarde, 81.
LUCHT Dampkring, zyne uitwerking op de *Réfractie*, 116.
LUCHTSTREEK, ruimte op de oppervlakte der Spheer tuſſchen twee evenwydige Cirkels begrepen, 99, 100.

M.

MAAN (Beginſelen van den Loop der Maan) 133—142. haar omloopstyd, 136. haar afſtand, 136, 138. *Synodiſche* en *Periodiſche* omloop, 136. Maanjaar, 137. haar Apogeum en Perigeum, 138, 200. ſchynbaare grootheid der Maan, 138. weezenlyke grootheid der Maan, 68. haare helling, 139. haare Breedte, 191. haare Uurbeweging, 136. haare Knoopen, 139, 140, 188. haare Phaſen, 141. haare Eclipſen. 181. Handelwyze om de Conjunctie der Maan door middel der Epacten te vinden, 159, 185. haare *Lengte* en *Breedte* te vinden, 187, 191, 193. Gebruik van de beweging der Maan om de Lengte op Zee te vinden, 382, 389.

MAAN-CIRKEL, 137, 144.
MAAND (Synodiſche) of Maaneſchyn, 136. Periodiſche Maand, 137. Romeinſche Maanden, 160.
MAANESCHYN, *Synodiſche* omloop van de Maan, 136.
MAAT der boeken, 14.
MARS, de vierde Planeet in afſtand van de *Zon*; haar afſtand van de *Zon* en omloopstyd, 66, 67. middenlyn en grootte, 68.
MERCURIUS, de naaste Planeet aan de *Zon*; haar afſtand van de *Zon* en omloopstyd, 66, 67. middenlyn en grootte, 68.
MERIDIAAN (algemeene beſpeaking van den) 117, 224, 225. Aardryskundige Meridiaan, 118. Eerſte Meridiaan, 119. Oorſprong van het woord, 120, 222. De Meridianen in de Aardryskunde beſpaalen de Lengte, 119, 120. De Meridiaan in een Sterrekundigen zin is het vlak van een' der Meridianen van de Aard-Globe, en dus het vlak van den Aardryskundigen Meridiaan, 121. de Meridiaan is eigenlyk maar een halve Cirkel, 122. doch wierdt begin en einde eenigzins anders beſpaald wordt, 122. het vlak van den *Meridiaan* deelt de Aarde in twee gelyke deelen, 123. ſommige Sterren komen maar *één*, anderen *tweemaal* in den Meridiaan, 125. *bewegbaare Meridiaan* onzer nieuwe Aard-Globe, 126—128. gebruik des *bewegbaaren Meridiaans*, 270. *bewegbaare Meridiaan* van de Globe van ADAMS, 423. zyn gebruik, 460. *algemeene Meridiaan* der *Hemel* en *Aard-Globen*, 268, 424. wordt ſoms ook voor den *Declinatie-Cirkel* van eene of andere Ster genomen, 461. de doorgang van een Ster door den *Meridiaan* te vinden, 378, 470. doorgang van het re punt van *Aries* door den *Meridiaan*, 375.
MERKTEEKENS, welken de Teekens van den Zodiak aanduiden, 73.
MÉTEMPTOSE of Zon Equatie, 153.
METRE, 365.
MIDDAG, 120.
MIDDAGLYN (een') te trekken, 229.
MIDDELBAAR. Middelbaare tyd, 284. Middelbaare beweging der Zon, 287. der Planeeten, 61. der Maan, 136.
MIDDENLYN van een' Cirkel, 4, 5. wordt ook middenlyn van een' Bol of Sphoer genaamd, wanneer die Cirkel rondom denzelven bewogen wordt, 4. deze middenlyn is de *as* des Bols, 6. alle middenlynen eens Bols zyn even groot, 6.
MIDDEN DES HEMELS (de *Aſcenſio recta* van het) te vinden, 406, 482, 519.
MYLEN, Duitſche Mylen, 387. Franſche Mylen of *Lieues*, 387.

N.

NAAMLYST der vaste Sterren, zie dezelve achter dit werk.
NACHTEVENING, gelykheid der Dagen en Nachten op den dag der Nachteveningen, 91, 96. *Colurus* der Nachteveningen, 103. Afſtand der Nachtevening van de Zon, of doorgang van het eerſte punt des *Rams* door den *Meridiaan*, 375.
NACHTEVENINGS-CIRKEL, zie *Equator der Aarde*.
NADIR of voetpunt, dat recht tegen over het *Zenith* ſtaat zie *Zenith*.
NEOMENIA, zie nieuwe Maan.
NONAGESIMUS noemt men het punt der *Ecliptica*, dat 90 graaden verwyderd is van de beide doorſnydingen van den *Horiſon* en de *Ecliptica*.
NOORDELYK, zie *Pool*, *Breedte*, *Declinatie*, *Hemisphoer*.
NOORDEN, een der vier Hoofdpunten des Hemels, 211.

O.

BLADWYZER.

O.

OMLOOPEN der Planeeten, 66. Omloopen der Maan, 136, 137. hoe de omloopstyden der Planeeten te vinden, 255.

ONBESCHADUWDEN, bewoners der verzengde Luchtſtreek, 99.

ONDERGANG der Hemellichten, door middel der nieuwe Aard-Globe te vinden, 295, 331, 337, 342. door middel der Globe van ADAMS, 434, 456. der Sphæra armillaris, 495. door berekening, 502.

OOSTEN, een der vier Hoofdpunten des Hemels, 211.

OPGANG der Hemellichten door middel der nieuwe Aard-Globe te vinden, 295, 331, 337, 342. door middel der Globen van ADAMS, 434, 456. der Sphæra armillaris, 495. door berekening, 502.

OPPOSITIE eener Planeet, 84. Oppoſitie der Maan of volle Maan, 141.

ORDINAATEN, 7.

P.

PAASCHEN, Pasch-Maan, 150, 156.

PARALLAXIS, (*Horiſontaale*) 210. *Parallaxis van hoogte*, 111. — Horiſontaale Parallaxis der vaste Sterren is oneindig klein, waarom derzelver gezigtsſtralen als evenwydig beſchouwd worden, 110.

PARALLELEN, kleine Cirkelen evenwydig aan den Equator, 30, 120. *Parallellen* aan de *Ecliptica*, 31. *Parallellen* aan den Horiſon noemt men *Almicantarath*, 32.

PENUMBRA, zie *Byſchaduw*.

PERIÆCI noemt men die bewoners der Aarde, welken op dezelvde Paralel woonen, en dus dezelvde *Breedte* hebben, doch wier *Lengte* 180° verſchilt: de eene telt dus *middag* als de andere *middernacht* telt; zy hebben dezelvde ſaiſoenen op denzelfden tyd, en zien dezelfde Sterren boven hunnen *Horiſon*.

PERIODEN (*Juliaanſche*), 148

PERISCII, zie *Rondomſchaduwigen*.

PHASES der Maan, 141.

PLAATS van eene Planeet op de Globe aantewyzen, 329.

PLANEETEN, algemeene beginſelen van haaren loop, 46—68. Verſchil der Planeeten en vaste Sterren, 47. Volbrengen haaren loop om de Zon, 47. de *Aarde* behoort onder derzelver rang, 48. de vlakken haarer loopkringen gaan allen door de *Zon*, 49. haare loopkringen zyn Ellipſen, 57. *Apſiden* der Planeeten, 58. *waare* en *middelbaare* Anomalie der Planeeten, 59. doorloopen geen gelyke boogen in gelyke tyden, 59, 60. *middelbaare* en *waare* Planeet, 61. de *inhouden zyn evenredig aan de tyden*, 62. haare loopkringen hellen op het *vlak der Ecliptica*, 62, 64. haare *knoopen*, 64. de *vierkanten haarer omloopstyden zyn als de Teerlingen der afſtanden*, 65. haare afſtanden van de *Zon* en omloopstyden, 66. afſtanden van de *Aarde*, 67. eenvouwdige getallen om zich de afſtanden der Planeeten te verbeelden, 67. haare middenlynen en grootten, 68.

PLANETARIUM, is een werktuig door middel van hetwelk men de afſtanden en omloopstyden der Planeeten kan leeren kennen.

POOL, wat die in 't algemeen is, 6, 22. Poolen der wereld of van den *Equator*, 34. De Noord-Pool (*Polus borealis vel arcticus*) is de Pool, die wy zien; handelwyze om die te leeren kennen, 227, 228. haare hoogte waar te neemen, 228. Pool der *Ecliptica*, 34. Pool des *Horiſons*, 22, 34, 108.

POOLSHOOGTE, wat die is, 36, 108. de Globe na dezelvete ſtellen, 433.

POOL-STER is eene der eerſte Sterren, welken men nodig heeft te kennen, 101.
PRIMUM MOBILE, is de dagelykſche beweging, met alles wat daarvan afhangt; *de tweede* beweging bevat de loopkringen der Planeeten.
PROBLEMA's (*algemeene* en byzondere) 268.
PROEMTOSE of Maan equatie, 153.

Q.

QUADRANT, beſchryving van hetzelve, 212, 214. deszelfs gebruik in het meten der hoogten, 213.
QUADRATUUR der Maan, of Quartier-Maan, 141. Quadratuuren der Planeeten, 84.

R.

RADIUS, zie *Straal*.
RADIUS VECTOR, zie *Voerſtraal*.
RECHTE KLIMMING, 102. de Rechte klimming der Zon waar te nemen, 245. de Rechte klimming der Sterren door middel der Hemel-Globe te vinden, 455. de Rechte klimming der Zon door middel der Globe te vinden 367, 468. de Rechte klimming der Zon gegeeven zynde, derzelver Lengte te vinden, 508.
REDENS van den inhoud met de tyden, 62. Van de afſtanden der Planeeten met haare omloopen, 65.
REDUCTIE tot de *Ecliptica*, 83.
REFRACTIE, 116.
REGEL (Algemeene) voor de Watergetyden, 198.
RONDOMSCHADUWIGEN, bewoners der bevroozen Luchtſtreek, 100.

S.

SAGITTARIUS, zie *Schutter*.
SAIZOENEN, oorzaak der Saizoenen, 299. Verklaaring van de afwisſeling der Saizoenen door middel onzer nieuwe Aard-Globe, 308—314. door middel der Globen van ADAMS, 443—445. door middel der *Sphæra Armillaris*, 497.
SATELLIETEN, der Planeeten, haare omloopstyden, haare afſtanden, zie Pl. V.
SATURNUS de zesde Planeet van de Zon af: haar omlooptyd en afſtand 65, 67. middenlyn en groote, 68 Satellieten, zie Pl. V.
SCHADUWE is in de verzengde Luchtſtreek op den middag dan naar het *Noorden*, en dan naar het *Zuiden* gekeerd, 99. verdwynt op den middag van dien dag, dat de Zon in het *Zenith* ſtaat, 99. is in de gematigde Luchtſtreek op den middag altoos naar het *Zuiden* gekeerd, 100. gaat in de bevroozen Luchtſtreek het Compas rond, 100
SCHADUWLOOZEN, zyn de bewoners der verzengde Luchtſtreek, 99.
SCHEMERLICHT, begin en einde der Schemering door de Globe aan te toonen, 325, 449. duurt niet altoos even lang, 326.
SCHUINE KLIMMING, 386, 474.
SCHUINE NEDERDAALING, zie *Afklimming*.
SCHUINSHEID van de *Ecliptica*, of hoek van de *Ecliptica* met den *Equator*, 94.
SCHUTTER, 73.
SCHYNBAAR, ſchynbaare tyd of wan-

BLADWYZER.

waare Tyd, zie Tyd. Schynbaare beweging der Planeeten, is haare beweging uit onze Aarde gezien, 80.
Snelheid (Gemeene) van twee vlakken, 64.
Snelheid der Planeeten, zie Pl. V.
Solstitia, zie *Zonneſtand.*
Spheer, beteekent eigenlyk niets anders dan eene kloot, en men gebruikt het woord *Spheer* dikwyls in die beteekenis, 4. In de Sterrekunde is zy de verzameling of nabootzing der hemelſche Cirkelen, 28. grondbeginſelen der Spheer, 1—42. Sphæra Armillaris, 261—266. Spheer geſchikt naar de waare beweging, 264. naar de ſchynbaare beweging, 266. haar gebruik, 493—499. *Rechte* Spheer, 39, 393, 477. *Schuine* Spheer, 40, 394, 477. *Parallelle* of *Evenwydige* Spheer, 41, 395, 477.
Steenbok, 73.
Stelzel der Waereld, 247. Stelzel van *Ptolemeus*, *Tycho Brahé* en *Copernicus*, 247. bewyzen voor de waarheid van het ſtelzel van *Copernicus*, 248—256.
Sterrebeelden, 231. hunne ſtand leert ons de gelegendheid van de verſchillende landen onzer Aarde kennen, 357.
Sterren, wyze om haaren ſtand aan den hemel of op eene Globe te bepaalen, 102, 239—234. worden onderſcheiden in *vaste Sterren* en *Dwaalſterren*, 47. haare plaats op de nieuwe Globe aantewyzen, 339. de Sterren, die op eene gegeeven plaats niet opgaan, te vinden, 343, 457. de Sterren, die op eene zekere plaats nooit ondergaan, te vinden, 345, 457. doorgang der Sterren door den Meridiaan, 372. 470.
Stier, 73.
Straal (de) is de ½ middenlyn eens bols of Cirkels, 5.
Straalbuiging, zie *Refractie.*
Systema mundi, zie *Stelzel der Waereld.*

T.

Tafel der Epacten, Guldengetal, Zonnecirkel en Zondagsletter, *bladz.* 102. der Sterrekundige Epacten, *bladz.* 132. der Tydmerken van de middelbaare Lengte en beweging van den knoop der Maan, *bladz.* 132. van het verſchil van tyd, dat het hoogſte water vroeger of laater voorvalt, enz. *bladz.* 139. van het Uur van het hoogſte water voor onderſcheiden havens, *bladz.* 140—142. van de hoegrootheid der graaden van *Lengte* op elken graad van *Breedte*, *bladz.* 296.
Tegenvoeters, 128. de Tegenvoeters van eene zekere plaats te vinden, 412.
Teekens van den Zodiak; deze zyn de twaalf deelen van de *Ecliptica*, en worden van het Nachteveningspunt van de Lente afgerekend, hunne naamen, en merkteekens, 73. worden van de Geſternteus onderſcheiden, 74. Klimmende Teekens, 97. Daalende Teekens, 97.
Tellurium, de Aard-Globe als een *Tellurium* te gebruiken, 308—314, 443—445.
Teruggang der Nachteveningen, 74, 96.
Toegevorgde Maaneſchynen, 144.
Trigonometria, zie *Driehoeksmeting*
Tweelingen, 73.
Tweezydsschaduwigen, zyn de bewoners der verzengde Luchtſtreek, 99.
Tyd, (Sterrekundige, burgerlyke) 164. middelbaare Tyd, 284. waare Tyd, 284. verandering van den Tyd in graaden, 421, 492. en der graaden in Tyd, 421, 492. de omwenteling der Aarde is de maat van den Tyd, 149. vereffening des Tyds, 283. oorzaaken van het verſchil der waare en middelbaare tyd, 285, 286.

ſtaat te meten, 114. om den afſtand tuſſchen twee plaatſen te meeten, 387. Verticaale beweging van het Quadrant, 215. Verticaalen Zonnewyzer, 590. te vinden, welke Sterren 'er in een' zekeren Verticaal ſtaan, 361, 466.

VERTICAALE LYN, (de) is de loodlyn. Hoek van den Verticaal met den Simal der Aarde, *zie* HOEK.

VISSCHEN, 73.

VLAK, wanneer men van de Cirkelen der Sphaer ſpreekt, verſtaat men dikwils het vlak van die Cirkelen, veeleer dan hunne overtrekken, 80. Bepaaling van een vlak, 91. wat men 'er door verſtaat, als men zegt dat een Hemellicht in den *Equator*, in den *Horiſon*, enz. is, 54. Hoeken der vlakken, 64. Maat van de helling der vlakken, 64. de loopkringen der Planeeten zyn vlakken, 67.

VLOED of hooge Zee, 194. en volgende.

VORRETRAAL, noemt men de lyn, uit het middenpunt der Zon tot het middenpunt eener *Planeet* getrokken.

W.

WAGEN, (groote) 228.

WATERGETYDEN, zie Vloed en Ebbe der Zee.

WATERMAN, 73.

WEEG CHAAL, 73.

WEEKEN, 162.

WESTEN, een der vier hoofdpunten des Hemels, 211. Verſchil van dagrekening of men naar het Westen dan naar het Oosten de waereld omreist, 412.

WETTEN van de beweging der Planeeten, 62, 65.

Z.

ZEE, Vloed en Ebbe der Zee, 194—200.

ZENITH, een Arabisch woord, dat het punt des hemels beteekent, maar 't welk zich de loodlyn richt: in 't Latyn wordt hetzelve *Vertex* genoemd; het ſtaat tegen over het NADIR, 34. Afſtand van het *Zenith* tot de Pool, is gelyk aan het *Complement* der *Breedte*, 42. De lyn van het *Zenith* ſtaat loodrecht op de oppervlakte der Aarde, 108. te vinden de plaats in welker *Zenith* de Zon ſtaat, 335, 453, 397, 478. de plaats te vinden in welker *Zenith* eene zekere Ster ſtaat, 353, 460. te vinden hoe laat het is als eene Ster in 't *Zenith* van eene zekere plaats ſtaat, 358, 464. te vinden welke Ster 'er in 't *Zenith* van eene zekere plaats ſtaat, 359, 465. alle plaatſen te vinden, welken dezelvde Ster in haar *Zenith* hebben, 366, 467.

ZODIAK, hemelſche ruimte of *Zona* van omtrent 17 graaden breed, die rondom den Hemel gaat, waarvan de *Ecliptica* het midden is, en welke bevat alle de punten des Hemels, waarin de Planeeten kunnen verſchynen, 31, 264. Teekens van den Zodiak, 73.

ZON, haar afſtand van onze Aarde, 66, 67, van de overige Planeeten, 66, 67. haare grootte, 68. haaren loop door den Sterrenhemel waar te neemen, 237—244. haare Declinatie en afſtand van eene zekere Ster op verſchillende Dagen des Jaars, 242.

ZONA, zie *Luchtſtreek*.

ZONDAGSLETTER, 146. Tafel der Zondagsletter, *bladz.* 102.

ZONNECIRKELS, 145. Tafel des Zonnecirkels, *bladz.* 102.

ZONNESTANDEN, 98.

ZONNEWYZERS, grondbeginſelen waarop derzelver ſamenſtel rust, 522.

522. handelwyze om dezelven te maaken, 526—546. *Equinoctiaale* Zonnewyzers te beſchryven, 526. *Horiſontaale* Zonnewyzers door middel eenes Globe te maaken, 529. *Verticaale* te maaken, 530. Verticaale afwykende van het Zuiden te maaken, 531. achter- of voorooverhangende Verticaale Zonnewyzers te maaken, 533. *Verticaale* door middel van *Horiſontaale* te beſchryven, 534. agter- of vooroverhangende Verticaale Zonnewyzers, door Horiſontaale te beſchryven, 538. Meridiaan-wyzers te maaken, 541. Polaire Zonnewyzers te maaken, 542. algemeene aanmerkingen, 541—546.

ZONNEWYZERSKUNDE, (gebruik der Globe in de) 520—546.

ZUIDELYK, zie *Pool*, Breedte, Declinatie, Hemisphaer.

ZUIDEN, een der vier Hoofdpunten des Hemels, 811.

DRUK-

Fig. 59.



Fig. 61.



Fig. 63.



DRUKFEILEN EN VERBETERINGEN.

bldz. 228 r. 9 en 12 van onderen *staat Ascentio; lees Ascenſio.*
—— 234 r. 11 van boven *'t Koningt; lees Koningryk.*
—— 241 r. 4 van boven *staat* de vooren; *lees* de te vooren.
—— 244 r. 9 —— *staat voor welken de Zon; lees op welken de Zon.*
—— 257 r. 12 —— *staat* koop; *lees* knoop.
—— 260 r. 6 van onderen *staat* 29°-40'; *lees* 29° 13'
—— 267 r. 13 —— *staat* Zuidelykſte; *lees* Noordelykſte.
—— 271 r. 14 van boven *staat Slangendrage; lees Slangendrager.*
—— 320 r. 13 van onderen *achter* Aard-Globe *intevoegen:* naar de Conſtructie van Adams.
—— 321 r. 2 van boven *achter* aanzien *intevoegen:* doch welke ook ſomtyds voor den *Declinatie-Cirkel* der Zon of van eenige Ster kan gebruikt worden.
—— 328 r. 8 —— *staat* § 351 en 312; *lees* § 351 en 352.
—— —— r. 28 —— denzelven beide; *lees* dezelven beiden.
—— 387 r. 20 van onderen *staat* 360'. *lees* 360°.
—— 400 r. 11 van boven *staat* geſchroef; *lees* geſchroefd.

IN DE CATALOGUS VAN STERREN.

bldz. 10 r. 3 van onderen *staat* γ Hydra; *lees* λ Hydra.
—— 11 r. 4 van boven *staat* in de colom van de Asc. recl. 152.6.16; *lees* 154.6.16
—— 13 r. 4 —— *staat* in de Jaarl. verand. van Declin. + 7,3; *lees* — 7,3.

BERICHT AAN DEN BINDER.

Bb. I—VI. te plaatſen tegen over bladz. 102
Bb. VII en VIII. —— bladz. 132

De plaaten moeten alle achteraan naar de rechterhand uitſlaande, geplaatst worden.



Fig. 66.



Fig. 67.

Fig. 64.



Fig. 68.